






EE
VIII
6



ARMAMENTARIUM
CHIRURGICUM
IOH. SCULTETI

VENETIIS
Typis Combi & La Nou

IN REGIA NAZI
ROMA
VITTORELLI



X E I P O H A O O H K H
S E V

D. IOANNIS SCVLTEI,
Phyfici & Chirurgi apud Vlnenses olim felicissimi
ARMAMENTARIVM
CHIRVRGICVM

XLIII. Tabulis Æri elegantissimè incisfis, nec ante hac visis, exornatum.

OPVS POSTHVMMVM,

*Medicina pariter ac Chirurgia Studioſis perutile
& neceſſarium.*

In quo tot, tam Veterum ac Recentiorum instrumenta ab Authore correctæ, quàm nouiter ab ipso inuenta, quor ferè hodiè ad vfitatas operationes manuales feliciter peragendas requiruntur, depicta reperiuntur, cum annexa breui Tabularum descriptione, & fequentibus cautionibus ac curationibus Chirurgico Medicis per omnes ferè corpora humani partes externas obferuatis.

*Cum triplici Instrumentorum, Curationum, rerumque
memorabilium Indice.*

Editio Quinta.



VENETIIS, M.DC.LXV.

Typis Combi, & LaNouè.

SVPERIORVM PERMISSV, AC PRIVILEGIO.

E. C. J. : M. B. B. B.



12 19 N 44



PRÆCLARISSIMO,

atque Excellentissimo

VIRO,

D. IVLIO MALVICINO

MEDICO, PHYSICO,

CHIRVRGOQVE

Eximio, Percelebri, Peritissimo.



VRE quidem in vniuersa
Deorum turba, quibus tam
impensè vetustas obsecuta
est, Vir Excellentissime, no-
bile Tutelaris Numinis co-
gnomentum sibi eum com-
parasse legimus, qui dùm
viueret, al-quam siue artem, siue scientiam ex-
cogitauit, coluit, perfecit, posterisque ad com-
modum reliquit. Siq omnino Apollinem, Æs-
culapium, ceterosq. reparandæ vitæ auctores,

*

3

ob

ob artium, quibus de genere humano benemeriti sunt, excellentiam, ex hominibus in cælum tulit Antiquitas, & mox è cælo ascitos in patronos tandem elegit. Quibus autem de mortalibus optimè iam tu non mereris, Vir Præstantissime, qui & physicam, & medicam, & chirurgicam artem adeo scitè calles, & communi salutis exerceas, ut alijs dum paras medicamina, immortalitatis pharmacum tibi conficias? Et has quidem artes hereditario iure à Parentibus accepisti, nam Iulius Placentinus, olim tuus ex Matre Auus, Anatomen Paduæ summâ cum gloriâ coluit, Paterq. tuus (quem eximie recordationis Virum honoris gratia nomino) in Medica, & Chirurgica quoscumq. peritissimos non ægrè antecelluit. Sed quod egregio Viro dignum est, non de aliorum radijs te pulchrum facis, nec maiorum lucem tanti æstimas, ut illi renuas addere nouam; cum quidquid in te aliunde transfusum est, maioris doctrinæ iubare augeas, & exornes. Et reuera quis iam præ cæteris non te videt solertem in detegendis morborum generibus? peritum in depellendis? acutum in profligandis? ut non sit amplius inuidendum Apollini, qui arcu, & sagitta obarmatus Pythonica monstra vulneribus conficiebat. Hinc puto non inepto cognomine MALVICINVM te indigitari, usque adeo morborum
lues,

lues, cum prope ad sis, aliò emigrare cogis, & ne
 redeant amplius, Phæbeo telo, seu manu medi-
 ca, chirurgicaq. confodis. Inde fit, Vir Præcla-
 rissime, vt mihi Tutelare sis Numen, & artium,
 quas tu mirificè calles, in Patronum eligaris;
 dummodo humillimæ deuotionis obsequia,
 tuis meritis debita non dedigneris. Hoc itaq.
 Armamentarium Solerti Sapientum industria
 fabrefactum obsequentissime tibi dico, vt con-
 tra morbos, qui ad humanam sese obarman-
 perniciem, discat, si tuum fuerit, vel pugnare; vel
 arma sufficere ad pugnandum. Chirurgicu n
 opus est, gaudetq. tuas in manus deferri, cum
 satis nouerit, quàm bene chirurgicam tractes.
 Penù instrumentorum est, adeoque tuum, qui
 arcendæ mortis falci tot medicæ artis instru-
 menta opponis. Denique mei cultus, obser-
 uantiæ, venerationis argumentum est, voluit-
 que sub chirurgici operis titulo ad te deferri, vt
 ea cum arte, quæ cor etiam perscrutatur, me tibi
 ostenderet ex corde intimo deuotissimum. Igi-
 tur ad immortale huius rei authoramentum,

Domin. tuæ Excellentissimæ

Obsequentissimus addicor

Ioan: La Nou.

* 4



PRÆFATIO A V T H O R I S.



SVMMO à Numine, parentes nostros primos corporis perfectione insignes, æqualitate temperamentorum beatos, oleaginosi humidi purissimaque vitæ flammula impregnatos, ossium robore decoratos, atq; omnibus numeris absolutos, conditos & creatos fuisse, vel infallibili hoc argumentum præcè proponit, quoniam in Statu innocentie, illis licuisset, hanc sui corporis molem, sine ullo mortis periculo gubernare, & calore consumptum humidum illud radicale, eadem bonitate, eademq; copia restaurare, imò ad immortalitatem perducere, nisi Serpentis astutia decepti, de vetita gustassent arbore, & ita, & ipsi morti obnoxii, & posteros sibi similes progenerassent.

Verum & hi, ante diluvium, ortui suo propinquiore, vitæ sanctimonia, & esculentorum è vegetabilibus petitorum innocentia simplicitateq; alij eorum ad millesimum ferme annum; alij ad secula aliquot præfixum vitæ terminum (respectu secundarum causarum, quibus Deus cursum suum relinquit, mutatq; prout ipsi visum fuerit,) protraxerunt, & dissulerunt. Subsequentibus atque tamen temporibus, cum mortales gulæ incontinentia ad

ad varia ferculorum genera inuitaret, illicitusq; veneris
 vsus illorum pedetentim corpora debilitaret, exhausti-
 retq; miro modo virę periodus abbreviata, & dies cen-
 tum & viginti annorum fuerunt. Vt enim densa nubes
 solares radios excipit & obicurat: ita vitiosa corporis
 dispositio vitę nostrę lucernam tanquam corporis lu-
 men, obnubilat. Hęc ergo quotidiana necessitas, The-
 rapeuticę Medicinę initium prębuit, & Euporista sa-
 nıtatis, atque domestica, auxilia, sibi suisque circum-
 spectos patres familias comparare coegit, vt lethi festi-
 nam inclementiam retardarent.

Quantum vis autem solius naturę robore, & sex rerum
 non naturalium conuenienti obseruatione, vel alteran-
 tium atq; purgantium medicamentorum debita admi-
 nistratiōe, tanquam per duo humana salutis pręsidia,
 plures morbi expugnentur: dantur tamen alij, qui hęc
 spernentes nullo alio modo, nullaq; ratione, corrigi &
 emendari possunt, nisi manuali aut chirurgica operatio-
 ne (continuum videlicet diuidendo, disjunctum vnien-
 do, & p.n. superfluum extirpando, iuxta verissimum no-
 stri Senis effatum, sec. 8 aph. 6. *Quęcunq; non sanant me-
 dicame- ta, ea ferrum sanat: quę ferrum non sanat, ea ignis
 sanat; quę ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.*

In quibus Chirurgicis operationibus, & olim & nunc,
 passim verę infiniti & industrij Medicinę cultores, Aę-
 gypti, Gręci, Arabes, Latini cum Italis, Galli, & om-
 nium fermę nationum, ob inuitabilem necessitatem &
 generis humani commodum, per integrum vitę iux-
 cursum, ita sedulō sudarunt, vt nihil non intentatum re-
 liquerint, vsque dum & huic Medicinę parti maiorem
 perfectiōem adiecerint, eandemq; scriptis, aureisque
 lucubrationibus, posteritati sacrarint. Pręsentes igitur
 XLIII. Tabulę chirurgicę, ob accuratam instrumento-
 rum, (& formę & magnitudinis ratione) delineationem,
 demonstratum operandi modum fidelem, & super-
 additas vtilēs obseruationes, luce fortassis publica non
 indi-

indignæ. in publicum mortalium commodum (in ijs enim traduntur meis aut manibus aut oculis crebro feliciter experta & comprobata) à me congestæ sunt, ut & ego pro tenuitate ingenij & modulo à Patre luminum accepti talenti studiosæ posteritati in lectione præsertim Hieronymi Fabricij (cuius verba hic, & vestigia secutus sum in praxi,) inseruirem, & alij, succedentibus an tîs, magis ardua aggredierentur, deficientia supplerent, hisque perfectiora in lucem ederent: procul enim à me cum absit omnis invidiæ stimulus, patefactam & liberam arenam omnibus ingenuis lubens relinquo, & animatus precor, ut vel elaboratiora tradere, vel feliciter his interim frui dignentur.




I.

In Armamentarium Chirurgicum

D. IOANNIS SCVLTELI

Reip. Vlmensis Med. Ordin. Collegæ
sui honorandi.


 On aliter quam si Zeuxes, noua symbola pingens,
 Crassa quidem primum lineamenta facit,
 Et sensim gnauo studio nascentia fingit,
 Quo vulgi culpes lima sinistra nihil,
 Et quo naturam dubia vel promocet arte,
 Vel fallat sensus ingeniosa manus:
 Gracis sic Arabesque simul ratione probata
 Primum struxerunt artis opus Medica;
 Addidit inuentis horum vigilante labore
 Italia Medicans, orbe stupente, chorus,
 Qui clavis operas manuales dotibus auxit,
 Fato digna loquens experimenta cedro.
 Sic Collega meus non inferiora secutus
 Ornauit Sparram, quam bene nactus erat,
 Id quod scripta docent iam primum publica facta,
 Et quorum laudes viuida fama canit.

L. M. Q. apposuit

 Ioannes Georgius Gockelius, Phil.
 & Med. D. Phys. Ord.

II. Tu,

Epigrammata.

II.

TV, quodd ab interitu immunes, SCVLTETE, tabellas,
Cognati à blattis à tineisque cupis,
Quas Tibi quas grates aget ac se ret ordo Medentum,
Quam statuet laudis digna trophæa tuz?
Hoc ipsum imprimis laudem meruisse putatur,
Iusta quo referat præmia quisque cliens.
Quin Tibi pro meritis princeps Heliconidos ymbræ
Cingit Apollo Tuas Delide fronde Comas:
Atque æterna tui viuunt monimenta laboris.
Tum tua laus pariter, tum patruique senis.

*Excellentissimo Viro, Medico Experimentissimo
& Chirurgo Excellentissimo verâ
amicitiâ ergo L. m. adposuit*

*Ioan. Georg. Volckamer, Reip.
Norimbergenfis Medicus*

III.

EGREGIIS LABORIBVS

Excellentissimæ Viri

D. IOANNIS SCVLTETI,

qui obseruationes Chirurgicas, publicæ salutis se destinatas in lucem
emittere satagebat, at morte heu! improuisa præuentus, Cognato
suo desideratissimo, Viro præclarissimo D. IOANNI SCVLTETO, Me-
dico exercitatissimo, curam istam gloriosam reliquit.

Honorisficæ memoriæ ergo ponebat

LVCAS Ochroft; D.

ES sapientis opus liber hic, quem conspicias Hospes,
Et superis gratum, terrigenisque simul.
Hic varia & scia, & methodo comprehensa decenti
Plurima perurgili parta labore nitent:
Authorem hinc operis sua gloria digna manebis,
Posteritas famam & tollet ad æstra suam.

Nam

Epigrammata.

*Nam Medicis etiam multis Chirurgiarum
Ipsius Genum cepit & Ingenium,
Is dum nec lectu, visu quoque nota nec ulli
Instrumenta suis multa videnda dedit.
Ergo dum studio statui exulta frequenti,
Florida Sculteti & fama perennis erit.*

IV.

Vlrica terra tibi, nuncum Decus inter Olores,
A teneris HEINSI, vulcis origo fuit.
HORSTIADEM scriptis eadem te prädicat Vlma,
Plautus THONERONobilis Vlma Sene,
Plures Vlma dedit, Medica qui laude canendi,
Quos tamen obcuras fama nec uetca tenet.
Ambos his iungit SCVLTELOS Vlma Melampis,
Ambos perpetuo charta loquetur anus.

Bona acclam. ergo scripsit

*Ernestus Gockelius, Vlm.
ICr.*

V.

AD LECTOREM DE LIBRO.

ARMACUPIS, Danaos Podaliri atque Machaon
Quis iunere suos? En! tibi Lector habes.
Non hac tantum: sed plurima precipuerim,
Tollere qui morbos nos docere manu.
Qua correctae leges partim; partimque vides
Ingenium Medici prorsus olere nuncum.
SCVLTEVAL dico, qui rectes doceresus,
Effectusque observans, quos habere, noiat.
Ile sua vixus Patriam olim sedulus arse
dedit; nunc alios mortuus, huiusce iuvat.

*In honorem Dni. Authoris p. m.
apposuit*

Ioan. Pfautz, Phil: & Med: Dr

VI. Quam

Non petit sanus Medici iuvamen ;
 Nec bibit sanctum medicamen eius
 Temperatus mas; ait IPSE , nostra
 Vita , Saluſque :
 Ergo non- sanus ; dubique preſus
 Imperu morbi , Medicum vocabat ,
 Tumque , opem ferret ſibi , præmiante
 Voce rogabat ;
 Temporis ſed nunc neque ſanus ullus
 Conſulit planè , neque ſanitatìs
 Indigus noſtros Medicos , vt ipſi
 Sæpe queruntur .
 Imperitos nam vocat hoc aduſus
 Quilibet raſor , ciniflo , coquentes
 Vnguen , obliti fidei in medendi
 Arte miniſtri .
 Hinc anus muſſans , grani cors ſacerdos ,
 Martha naſutans , monachiſque triftis ,
 Hiſtrio , Iudas , idiota , miles
 Phy ! medicantur .
 Vnici reſtant Iatrum vocantes
 Eruditum , qui temerante turbà
 Cognitâ ſerò ſapiunt in ima
 Mortis agone :
 Hi Sacerdoti patrio remiſſi
 Atque Prætori , (det vt hic ſepulchrum ,)
 Execrantur Phy medicos auares
 Per- que- ſeroces :
 Execrantur ſed quoque Præitorem
 Cinium , ſic & Parochum ſupinum !
 Paſtor & Prætor bonus eſtne , vbi tot
 Phy medici ſunt ?
 Iuſtus verùm generis querelæ
 Execrandæ ne pariant ſurorem ,
 Turba nec multo- medicans tuinam
 Augcat Orbis

Epigrammata.

VI.

Quam præstans fuerit Patruus tuus arte medendi
Hic, SCVLTETE, liber monstrat abunde satis.
Cui tu nunc par es, rumpanitur ut Ilia Momo,
Consilijs nec non dextertate manus.
Non opus ergo Senem procul huc arcescere Coum,
Istud enim per te Susuia Nomen habet.

Ereis vera amicitia ergo

Tebias VVagner, Med. D.

VII.

Armorum formas varias fabricare modosque,
Mortis ut effigies sic quoque mille vias.
Id iam grande, tenet quos publica cura salutis
Quo fruimur Pacis tempore, crimen habet.
Armorum verò pingendo docere figuras,
Membra quibus nostri corporis arte vident;
Artificis solius opus iugis que laboris,
Non nisi condigna nomina laudis habet.
Ergo SCVLLETFM, qui talia grauius ausus,
Fama vel æternum post sua sua manet.

Observant. affect. monum pos.

Vitus Riedlin, Vlm. M. D.

Epigrammat.

Ecce SCVLTE TV SVir Apollinaris
Efficax arte, experientiaque,
Inter Vlmānos, specimen dietitæ
Exhibet auctum;
Quale sincerus exhibere debet
DOCTOR ægrotis, ratione rectâ
Trutinans vtrum levis aut acutus
Morbis onustet;
Pharmacum non vult dare, si dietam
Ritè correxisse sat est, & vrit
Neminem solo medicamine vnquam
Restituendum.
Alterum si quod Medici probati
Expetis signum, repe ris legendo:
Arma Chirurgum Bona, Quanta, Quando,
Qui que ferantur.
Prætor huc ergo veniens requirens,
Cui potestatem dare sit necessum,
Urbe in Urbana, medicationem
Perficiendi:
Pastor hic a dñis, onium querelas
Morbidarum qui reputare gestis,
Disce noscas carnifices, amulos
Circu itores;
Aduolate omnes refici volentes
Tempori vsuri Sapiente Iatro,
Atque SCVLTE TO Medico absolute
Plaudite cuncti.

Incipias Te xpo & A as iuxta dñi

Iustus Ioh. Quittembaum;

Brunsvigis, D.

Epigrammata.

IX.

Qua praeclara petunt circumdata mania valle
 Hostiles technas, & flocci pendere ruitus;
 Quaeque petunt saluam sub tectis degere vitam,
 Armorum flagrans ornatus splendet eorum,
 Sique modo cupiant Martis prosterne turbam
 Possunt sic validè pacem servare beatam.
 Sic qui mundicola mortis vitæ pericla
 Optant, qui cupiunt luxata reducere in artus,
 Aut qui desudant curabile pellere vulnus,
 Auxilium hic quarant, licet hinc decerpere fructus,
 Quaque fugens morbos, liber hic monstrabit apertus,
 Invenies facili studio medicamina salua:
 Laudem cantabis numerosam Teutona proles
 SCVLTEI, dum Sol radijs illuminas auras.

*Debita observantia erga
 accinere voluit*

Eberhardus Gockelius, M. C.

INDEX

I N D E X INSTRVMENTORVM.

A.

- A** *Κατακόλον* Pauli, Tab. 1. Fig. 1.
Acus pro. *auriendo* setaceo, Tab. 7. Fig. 4.
Acus, quibus deponuntur *cataraeta*, Tab. 8. Fig. 2. & 4.
Acus, quibus perforatur *hydropicorum* *scrotum* atque *abdomen*,
 Tab. 12. Fig. 17. & 20.
Acuum *Manubrium*, Tab. 3. Fig. 1.
Annulus *aeneus* ad *confirmandum oculum*, Tab. 8. Fig. 5.
Acus, qua *transi*citur *mamma*, Tab. 12. Fig. 8.
Acus, qua *castratores* perforant *scrotum*, & *aperiuntur* *sinus* *decli-*
niores, Tab. 14. Fig. 5.
Ambi Hippocr. Tab. 21. Fig. 1.

B.

- Brachetium* *adultis* *adhibendum*, Tab. 39. Fig. 6.
Brachetium *pueris* *applicandum*, Tab. 39. Fig. 7.

C.

- Cannula* ad *fonticulos* in *artibus* *conficiendos*, Tab. 1. Fig. 1.
Cannula ad *fonticulos* *sutura* *coronali* *inurendos*, Tab. 1. Fig. 3.
Cannula *varia* *navibus* *immittenda*, Tab. 9. Fig. 3. 4. & 5.
Cannula *saucibus* *immittenda*, Tab. 10. Fig. 2.
Cannula *alata* in *vulneribus* *thoracis* & *paracentesi* *abdominis* *uti-*
lissima, Tab. 12. Fig. 12. 13. 14. & 15.
Cannula ad *curandas* *haemorrhoides*, & *exsiccanda* *ani* *ulcera*, Tab.
 10. Fig. 1. 2. & 3.
Canalis ad *extrahendam* *empyematis* *materiam*, Tabul. 12. Fig. 9.
 & 10.
Canalis, in qua *reponitur* *pes* *senilis* *vel* *luxatus*, Tab. 21. Fig. 6.
Cannula ad *mitigandum* *urina* *ardorem*, Tab. 12. Fig. 16.
Capsula *Iulij* *Casseri* *Placentini*, Tab. 1. Fig. 7. & c. Tab. *ultima*,
 lit. G.
Candela *cerea* ad *caryunculas* in *manu* *urinaria* *enatas*, Tabul. 13.
 Fig. 9. & 10.

Cri-

Index Instrumentorum.

10

- Crinale*, Tab. 8. fig. 1.
Catheter, Tab. 14. fig. 5.
Culter rasorius, Tab. 2. fig. 2.
Culter falcatus, quo inciditur caro ante amputationem membri,
 Tab. 20. fig. 3.
Cataphracta Galeni, Tab. ultima. Litt. S.
Cauteria ad inurendum occipitium, Tab. 7. fig. 6. 7. 8. & 9.
Cauteria ad alias partes fabrefacta, Tab. 19.
Cochlear vuula vel axata admonendum, Tab. 9. fig. 8.
Cochlear, quo eximitur calculus de meatu urinario, Tab. 14. fig. 8.
Circuli uterini, Tab. 17. fig. 6. 7. & c.

D.

- Dilatorius oris*, Tab. 9. fig. 9.
Decussorium, Tab. 2. fig. 10.
Dentiscalpium, Tab. 10. fig. 10.
Dioptra ani, Tab. 17. fig. 3.
Dioptra matricis, Tab. 17. fig. 4.

E.

- Enterenchyta*, Tab. 13. fig. 5.

F.

- Fascia umbilicalis*, Tab. 38. fig. 8.
Fascia cancer, Tab. 31. fig. 9.
Fascia ad fonticulos in sutura coronali inusos, Tab. 33. fig. 6.
Fascia, Sostrati vineulum dicta, Tab. 38. fig. 6.
Fascia, cataphracta nominata, Tab. ult. S.
Fascia uicri, Tab. 41. fig. 3.
Fascia ad membra fracta & luxata, Tab. 29. Litt. E. F. G.
Fascia funda, Tab. ult. A.
Fascia ad deligenda membra mutilata, Tab. 27. fig. 14.
Fascia ani, Tab. 41. fig. 7.
Ferula, Tab. 29. Litt. K.
Ferramentum solidum, quo candefacto paratur fonticulus in bregmate, Tab. 1. fig. 2.
Forceps cum rostro pistaceo, Tab. 4. fig. 2. Tab. 11. fig. 1.
Forceps ad inurendum fetaceum in nucha, Tab. 7. fig. 1. 2. & 3.
Forceps ad secandum fetaceum, Tab. 7. fig. 10.

* * 2 For-

Index Instrumentorum;

R.

- Rostrum gruinum, in angulum obtusum directum, Tab. 9. fig. 10.*
Rostrum gruinum rectum, Tab. 11. fig. 6.
Rostrum Coruinum, Tab. 10. fig. 4. Tab. 11. fig. 2.
Rostrum Psittaceum, Tab. 11. fig. 1. Tab. 4. fig. 2.
Rostrum anserinum, Tab. 15. fig. 19.
Remora Hildani, Tab. 12. fig. 3.

S.

- Spatha Celsi, Tab. 2. fig. 1.*
Scalpellus rectus, Tab. 2. fig. 2.
Scodaghino Itatorum, Tab. 2. fig. 2.
Serrula versatilis, Tab. 5. fig. 1.
Serrula recta, Tab. 6. fig. 1. & 2.
Scalpra rasoria, Tab. 6. fig. 3. & c.
Specillum latum, Tab. 8. fig. 6.
Specillum rotundum Tab. 8. fig. 6.
Specillum cochleatum Tab. 8. fig. 7.
Scalpellus falcatus ad separandas à se inuicem palpebras, Tab. 8. fig. 8.
Stylus cannulis narium im mittendus, Tab. 9. fig. 6.
Stylus cannulis ani accommodatus, Tab. 16. fig. 4.
Sclopomacharia, Tab. 12. fig. 1. 2. 3. & 5.
Syringotomi, quibus incidantur fistulae, Tab. 14. fig. 1. 2. & 3.
Scalpellus falcatus, quem Itali gamma appellant, Tab. 2. fig. 4.
Scalpellus, quo dilatantur vulnera abdominis angusta, Tab. 14. fig. 4.
Scalpellus, quo peragitur paracentesis in abdomine & thorace, Tab. 12. fig. 1.
Scalpellus, quo dilatantur vulnera thoracis, Tab. 12. fig. 1.
ScalPELLI aut pites, formam foliorum myrti referentes. Tab. 12. fig. 6. & 7.
Scalpellus annulo inclusus, cuius maximus usus est in suppuratis mulierum mammis aperiendis, Tab. 12. fig. 11. Modus eo operandi videtur Tab. 37. fig. 5. in thorace.
Sipho communis Tab. 13. fig. 1.
Sipho auricularis Tab. 13. fig. 4.
Sipho intestinalis Tab. 13. fig. 5.
Sperulum ani, Tab. 17. fig. 2. & 3.
Scalpellus, quo setaceum nucha inciditur, Tab. 18. fig. 6.
Scalper, quo amputantur digiti, vel manus extrema corrupta, Tab. 20. fig. 4.

Scala,

Index Instrumentorum.

Scala, Tab. 21. fig. 3.
Scamnum Hippocratis, Tab. 22. fig. 4.
Softrasi vinculum, Tab. 33. fig. 6.

12

T.

Trypanum Hier Fabr. Tab. 2. fig. 6.
Terebra triformis, Tab. 3. fig. 1.
Terebra triploidis, Tab. 3. fig. 3. A.
Terebellum acutissimum, quo educuntur affixi sclopatorum globuli, Tab. 15. fig. 7.
Truncus ligneus, in quo collocantur membra scalpri auferenda, Tab. 20. fig. 6.

V.

Vitibulum modiolorum, Tab. 2. fig. 6.
Vestis debilissimus, Tab. 2. fig. 7.
Vestis validior, Tab. 3. fig. 2.
Vestis instrumenti triploidis, Tab. 3. fig. 3. B.
Vestis Parai, Tab. 3. fig. 4.
Volsella recta Celsi, Tab. 4. fig. 1.
Vasculum oculare Aquap. Tab. 8. fig. 10.
Volsella in semicirculum recurvata, Tab. 10. fig. 1.
Vestes trifidis, Tab. 10. fig. 8. & 9.
Vitrum, quo extrahuntur papilla occulata, Tab. 16. fig. 5.
Vetus, quo extrahitur fœtus mortuus, Tab. 17. fig. 1.

Z.

Zonula Hildani, Tab. 22. fig. 1.

N O T A.

Figuræ huius Editionis ad dimidiam proportionem Vlmensis exactè diminutæ sunt: quare duplum earum sumendo, habebis ipsam magnitudinem ab Authore primùm depictam.

I N-

INDICE DA OSSERVARSI DAI LEGATORI
Per inserir le Figure.

Tauola	XXIX	a fo. 90
————	XXX	a fo. 91
————	XXXI	a fo. 94
————	XXXII	a fo. 95
————	XXXIII	a fo. 110
————	XXXIV	a fo. 115
————	XXXV	a fo. 121
————	XXXVI	a fo. 126
————	XXXVII	a fo. 129
————	XXXVIII	a fo. 137
————	XXXIX	a fo. 139
————	XL	a fo. 149
————	XLI	a fo. 153
————	XLII	a fo. 155
————	XLIII	a fo. 161
————	XLIV	a fo. 316

NOI REFORMATORI DELLO STUDIO
di Paola.

Huendo veduto per Fede del Padre Inquisitore nel Libro intitolato, *D. Ioan. Sculteti Armamentarium Chirurgicum*, impresso *Huga Comitum ex Officina Adriani Vlacq.* non esservi cosa alcuna contro la Santa Fede Catholica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concedemo licenza, che possi esser ristampato osservandosi gli ordini &c.

Dat. 4. Feb. 1664.

{ Andrea Pisani Proc. Ref.
{ Battista Nani Cau. Proc. Ref.

Angelo Nicolosi Segretario



D. IOANNIS SCVLTEI, &c.

TABVLARVM ARMAMENTARII CHIRVRGICI EXPOSITIO.

TABVLA PRIMA.

*De cannulis, ferramentis solidis & incidentibus, quibus
inuruntur fonticuli.*



IG. I. est instrumentum ferreum, quod Hieron. Fabritius ab Aquapendente, de fonticula in sutura coronali, cannulam vocat, & inuento notatoque atramento fonticuli loco, sinistra manu fortiter imprimat, ut ea impressione & inuata cannulæ frigiditate, calor ferri candentis (Fig. II. subsequens) & dolor exinde subortus mitigetur, partesque vicinæ ab ignis offendi- culo defendantur.


Fig. II. est ferramentum solidum & uniforme, sine manubrio (ei tamen vel osseum vel ligneum, quale præcedens cannula obtinet, ad- sprari potest) quod bene ignitum, dextraque manu superiori cannu- læ intrusum, fontanellam inurit. Duobus hisce ferramentis fonticuli parantur in solis humani corporis artibus, videlicet quando ægri ferrum ignitum non formidant, aut Chirurgus capsulam Iulij Cas- serij Placentini, quæ cauterium actuale abscondit, non habet.

Fig. III. est cannula quoque ferrea, superiore tamen paululum profundior, ad recipiendum instrumentum proximè sequens.

Fig. IV. est instrumentum simpliciter cauum & incident, quo can- dida, & antecedenti cannulæ immisso, fonticulum efficiamus in su-



Armamentarij Chirurgici;
TABVLA I.



Tabula 1. Declaratio.

3


tutæ coronalis & sagittalis concursu, non tantum adurentes, sed etiam incidentes, ob instrumenti acumen, quod habet in extremitate. Hoc quando calvariæ attingit, circumuoluerendum est, ut cranio aliquod vestigium imprimat. Huius instrumenti usum improbant multi, non solum ob dolorem, quem inferre dicunt, verum etiam ob periculosam inflammationis metum in pericranio, quæ postmodum duræ matri subiectæ per suturarum coniunctionem facillime communicari possit, unde hoc reiecto, solidum ei & uniforme (Fig. II. huius Tabula depictum) recentiores substituunt: cauam tamen meo iudicio huic præferendum est, quoniam solidum illud enarrata modo incommoda multo facilius inferre potest: addo quod iniustio suturarum cum solido ferramento nimis tardè procedat, ob cutis in capite crassitiem, durtitiam, ac densitatem; ad administrationes autem chirurgicæ, imprimis ex, quæ ferro peraguntur ignito, citissime perficiendæ sunt.

Fig. V. & VI. sunt ferramenta non simpliciter incidentia & caua, sed prius *stellatum*, posterius verò *dentatum* est: quorum illud propter stellam circumuolui omnino nequit: hoc verò propter dentes non ita promptè incidit. Quapropter Chirurgi moderni, & inter eos ferè Princeps Hieronym. Fabritius ab Aquap. hæc duo instrumenta, tanquam ad operationem inepta, reiciunt.

Fig. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. coniunctim consideratæ constituunt *Capsulam, instrumentum ad inurendos fonticulos, in partibus extra caput collocatis, omnium optimum, omnibusque numeris perfectissimum*, quod excogitauit Iulius Casserius Placentinus, ut etiam illa incommoda (quæ masculi timidioris animi, sceminae, ac pueri expauescunt) calorem scilicet, dolorem, & ignis aspectum vitaret. Hoc Placentini inuentum occultat cautelum actuale, quod (cum escharam promptissime inducens) ut agri viri animaduertantur) potentialibus si non præferendum, optimo saltem iure substituendum esse sentio. Nec enim propter vaginæ extremitatem, grauiorem ex depressione incubitum, & miram operationis celeritatem, vel quicquam doloris, vel etiam subustionis, percipitur, quam ob causam nec vicinarum ostendiculum partium in minimis metuendum est.

Fig. VII. est lamina cannulata ferrea, circularis & immobilis (a. b.) huic & laminæ superiori itidem ferreae, circulari, in medio perforatæ, & versus inferiora mobili (c.) quatuor rotulae filo, æneo circumductæ (d.) insiguntur, ut *Stylus* (Fig. VIII.) ex cupro solidus, candefactus, prædictisque laminis immixtus (veluti Fig. IX. ostendit) & in Fig. X. capsulam ligneam repositus, ut operculo Fig. XI. foraminato abscondi, & beneficio clauiculæ (Fig. XII. & XIII.) umbellatæ, deprimi possit.

A 2 IV T A



T A B V L A II.

*De Spatha Celsi, cuius raso-
rio, modiolorum mare, scæminis, & veri-
bulo; instrumento lenticulari, veste debilissimo, membrana
custoda instrumento d- cussorio: quibus Chirurgo opus
est ad curandas fracturas Cranij.*

FIG. I. est instrumentum, quod ab Hippo. lib 2. de morb. cap. de sup-
purata peripneumonia *μαχαις ενδοειδης*, à Celfo autem m, &
Paulo passim *Spatha* appellatur: Scalpellus nimirum anceps, ut inq;
acutus, & in superiore parte paululum latus, qui in extremitate sua
in viam cuspidem coit. Hoc vulnere capitis in crucem vel triangu-
lum dilatantur, & paracentesis in thorace tutò peragitur.

Fig. II. est *culter raso-
rius*, siue scalpellus rectus, ex vna tantum
parte incidens, ex altera verò retusus, quo utuntur, quando partium
subiectarum non est habenda ratio, videlicet in cute capitis inciden-
da usque ad cranium, & gummatibus Gallicis, in tibia præsertim vel
alibi, aperiendis: deinde ubi utraque acies aliquid ledere potest, ut in
fœtu mortuo intra utrum in plures portiones dissecando, & vuluæ
carunculis incidendis. *Italicè vocatur Scodeghino.*

Fig. III. est *Modiolus mas*, seu instrumentum, ex optimo chalybe
paracum, cavum, teres, imis oris serratum, & quatuor alis præditum:
illa scilicet pars Trypani, quæ circa os circumuoluenda est, & dici-
tur Græcis *χαλκίον*, Celfo verò l. 8. c. 3. modiolus: qui in medio cla-
uum habet, ut, in principio circumuolutionis, *caluaria à pericranio
denudata*, firmiter insitât, & partes circumpositæ, labia nempe vul-
neris & pericranium, ut maximè sensibiles, ab offensione tutiores
reddantur. Quod si modiolus in principio adhibendus clauum non
haberet, summo cum periculo, & vehementi dolore fieret perforatio
caluariæ.

Fig. IV. & V. sunt *Modioli scæmina*; eiusdem magnitudinis cum
præcedenti masculo, neque aliter differunt hi & ille, nisi quod clauo
carcant, unde scæminæ nuncupantur. Antequam his scæminis uti-
mur, beneficio masculi cranio aliquod vestigium imprimendum, ut
ei scæminæ firmitus insistere possint. Pro perforatione autem Cranij
administrator ad minimum tres, sed exactissimè aequales modiolos in-
promptu habeat, unum nimirum masculum & duas scæminas, ut ali-
quoties mutari, & in aquam frigidam, aut oleum rosaceum immergi
queant, ne vel scobe pleni operationem retardent, vel ex crebra cir-
cumrotatione calefacti, cranium, ipsique subiectas membranas in-
flamment.

Inuentio alarum, quæ modiolos in cerebri membranas, vel propriam substantiam iminergi prohibent, summum Hieronymi Fabritij ab Aquap. ingenium arguit: nam quamvis ex recentioribus nonnulli, ut Vid. Vid. *J. Chir.* 4. c. 10. & Ioa. Andr. à Cruce l. 7. de *instrum.* etiam alarum in modiolis mentionem faciant, eas tamen nullus eorum tam exactè & accuratè fabrefieri curauit, quàm Fabritius. His modiolis nunquam non felici successu sum usus, vtunturque hodierna tempestate (omnibus veterum instrumentis, quæ olim ad perforandam caluariam excogitauerunt, & quorum schemata apud citatos modò Authores & Patrum. lib. 9. cap. 18. inueniuntur, reiectis) chirurgi, præcipuè Patavini, Fabritijque in praxi, & professione chirurgica successores; inter quos superstes est celeberrimus ille Medicus, Chirurgus, & Professor Patavinus, Petrus de Marchettis, Eques Dñi Marci Venetorum, meus olim in Anatomia & Chirurgia, per plures annos, respectiue condiscipulus, cuius mirificam operandi dexteritatem (qua serè omnibus Italis palmam præripit) tota non tantùm Italia, & vndique concurrens studiosorum cohors stupet, sed ea innumeri felicissimè restituti quasi ad cælos vsque extollunt.

Fig. VI. est Trypani altera pars, quæ manubrium seu *vertibulum* appellatur, & excisum habet foramen, quo mediante *modiolorum apex gossipio inuolutus* promptè excipitur, & extrahitur, quotiescunque commutatio τῆς χειρὸς fuerit necessaria. Hac ratione ex modio, & vertibulo componitur *Trypanum*, quo citò, tutò, & iucundè perforatur cranium.

Fig. VII. est instrumentum compositum ex scalpro (ob lenticulam in extremitate) lenticulari dicto, & velle. In fine perforationis cranij, hic *Vellis* inter labia excisi ossis immittitur, ad ossiculum hinc inde mouendum, ut vacillet, & vellellæ (*Tabul. IV. Fig. 1.*) parte dentata auferri possit. Confert quoque ad modicas cranij depressiones eleuandas, firmitatem suam in manu sola chirurgi obtinens. Lenticula inferuit ad asperitates (qua post tenebrationem, & ossis excisionem relinquuntur) abradendas, & leuigandas, ne cerebri membranæ, ob continuum earum motum, illis allisæ ostendantur.

Fig. VIII. est *instrumentum Lenticulare* solùm, quod oras facti foraminis, veluti modò dictum, leuigar, ne membranas pungendo, dolorem & inflammationem inferant.

Fig. IX. est lamina argentea (ex ferro enim nunquam parari debet, ob ipsi ingenitam frigiditatem, qua tam crasse, quàm tenui membrana cerebri nocet) firma, paulum resima, & ab exteriori parte levis, quia vtimur in magnis cranij depressionibus, & fracturis, ubi ter, quaterue, cranij os trypano perforare, atque foraminum interstitia excidere necessarium est: tunc enim lamina inter caluariam, & duram

Tabulæ II. Declaratio.

7

matrem demittitur, ut eius pars exterior cerebro propior sit, ne acumine forcipum & ferrularum (*quarum delineationes vi deantur infra Tab. V. & VI.*) membranz cerebri vel pungantur, vel incautè incidantur: hinc Celfo, qui in describendis ferramentis, Chirurgicisque instrumentis, admodum sedulus fuit, lib. 8. cap. 3. *Membrana custos* dicitur, Græcis *μωρυσσειλαξ*.


Fig. X. est *instrumentorum decussorium*, quo dura mater modicè depreffa, cranio exactè applicatur, ut purulenta materia inter cranium, & membranas collecta, per foramen modiolis factum, faciliè egrediatur.

Fig. XI. est *maïens plumbens*, quem olim vsurparunt, quando scalpri incisorijs (*quorum imagines varia reperiuntur apud Paracelsum lib. 9. cap. 5.*) particulam cranij separare voluerunt, ad evitandum strepitum, & prohibendam cerebri commotionem. Recentiores, & hac ætate cautiore chirurgi vtuntur ad hanc operationem forcipibus, & ferrulis, de quibus paulò infra, *Tabul. IV. & VII.*

A +

TA.

Armamentarij Chirurgici
TABVLA. III.



T A B V L A III.

De Terebra triformi, vecte validiore, Instrumento triploide, & eleuatorio Parai, quibus cranij punctura abolentur, eiusdem. que depressiones eriguntur.

FIG. I. est *Terebra triformis*, instrumentum scilicet merè ferreum, tribus ijsque diuersis terebris constans, quorum vsus in punctura cranij, quæ ambas laminas non penetrat, est necessarius, vt ijs vestigium caluarie impressum deleatur. Huius instrumenti pars triangularis etiam substitui potest terebello, quo Guilhelmus Fabricius Hildanus primam serè laminam perforat, antequam triploidis torcular adhibet.


Fig. II. est *vectis*, quem in depressionibus cranij eleuandis vsurpohic valentiore attollit robore, quàm ille Tab. II. Fig. VII. delineatus, quoniam firmitatem non in manu tantùm eleuatoris, sed etiam in capite suam habet.

Fig. III. est *instrumentum*, ob triplicem basin, quam habet, *Triploides* appellatum: si depressio cranij tam magna est, vt præcedentes vectes ob infirmitatem non sufficiant, *Triploidis vectem B.* (si spatium adest) submitto, & os depressum perpendiculariter attollo. Si autem locus huic vecti non conceditur, media depressio, *Triploidis Terebra A.* ultra diploidem perforari debet, & dicto eleuari modo, *unicè cauendo, ne terebra ambas cranij laminas perforet, & duram matrem pungat.* Vide Guil. Fabricium Hildanum, *centur. 2. obs. 4.* vbi modum depressiones eleuandi accuratissimè docet, licet alijs instrumentis, quibus ego nunquam vsus, sed hac triploide vnâ & alterâ depressionem bono cum successu reposui.

Fig. IV. est *Veetis*, quo vtuntur alij in maximis caluarie impressionibus, imitando victores, qui doliorum assulas intus depressas simili vecte solent retrahere. Indita igitur adunca vectis extremitate (a) sub os depressum, alterum vectis brachium (b) rectum, ossi sano inniti debet, vt, dum manubrium dextra deprimitur, adunca instrumenti parte id, quod depressum est, erigatur. Hunc vectem adumbravit quoque, & descripsit Ambros. Paræus l. 9. c. 5.

T A

Armamentarij Chirurgici,
TABVLA. IVI.
Eig I



T A B V L A I V.

De Volsella, & forcipe cum rostro psittaceo, atque vulturino, quibus
officuta cerebri membranas pungentia abrumpuntur,
& eximuntur.

FIG. I. est instrumentum, ad operationes manuales valdè necessarium, quod Paulus *Ægin.lib 6. c. 32. ἀνατὰς* & C. *Cell.lib. 7. c. 3. Volsellam* vocat. Huius parte duplicata & dentata A. frustulum ossis corruptum ac mobile, spicula itidem & globuli, eorumque fragmenta, turundæ atque pili, & quæ id genus alia in vulneribus extranea reperiuntur, extrahunt. Idem peragunt instrumentis, Tab. XI. Fig. III. & VI. delineatis, quorum alterutrum pro opportunitate vsurpandum. Singulariter etiam hæc volsellæ pars inseruit ad pilos & palpebris euellendos, quæ oculos irritant. Præter dictos vsus, quos præstat, famulatur medicinæ compitoriz, eà namque scæminæ, præsertim regiz, pilos in supercilijs, & alijs corporis partibus radicitus extirpant. *Notandum, si ossiculum aut aliud saucibus extraneum eximendum, hanc instrumenti partem altero tantò maiorem debere confici, quàm suis depicta.* Latiore sui parte B. ad ceratorum conducit extensionem, supra linteamina vel corium, in defectu spatulæ; ad tutam pericranij ab osse separationem, antequam modiolus & scalprum cranio admouetur, in defectu vnguium manus digiti indicis & pollicis paulò longiorum, aut manubrij illius scalpelli, qui infra Tab. XII. Fig. IV. adumbratus est. Vnguibus tamen illis longioribus, multo securius pericranium à cranio deducitur, quàm manubrio scalpelli citati, aut cultero separatorio Parzi, aut hæc volsellæ parte latà.


Fig. II. est forceps excisoria, cum rostro psittaceo, (a) cui superius cochlea umbellata (b) affigitur, quæ rostrum ad duram matrem (*vtor enim in fracturis cranij*) immergi vetat, vnde non incommodè ἀλατρίση appellari posset: inferius habet manubrium (c) quod cochleæ (d) Fig. III. circumuoluitur.

Fig. III. est rostrum psittaceum, extra suam cannulam (d. Fig. II.) positum, vt artifex cochleam rostri euidentius cernere queat.

Fig. IV. est forceps alia cum rostro vulturino, cannulata, ad cuius cochleam circumducitur.

Fig. V. est rostrum vulturinum, sine cannula depictum. His duabus forcipibus, vt & illis, quas infra Tab. XI. Fig. I. & II. & Tab. XIX. Fig. I. depingi curauimus, ossis aliquod frustulum, in curatione vultus capitis, partim rumpendo, partim incidendo, aufertur: quæ omnes magnitudine saltem & formà differunt, pro varietate ossium, quæ remouenda sunt.

T A.



T A B V L A V.

De Serrula versatili, quæ duorum foraminum interstitium excipitur.

FIG. I. est *serrula versatilis*, tympanis duobus, iisque dentatis prædita, utilis maximè ad intercidenda duorum vel trium foraminum, modiolis factorum, interstitia: ubi enim vinctes supra delineati & descripti, ob rimæ (quæ nuper impressionibus in a dultorum cranijis serè semper iungitur) angustiam, spatium non habent, interdum opus est, ut in cranio duo vel plura foramina modiolis conficiantur, quorum interstitium hæc serrula, *citra ullum lisionis periculum interciditur*, quo vinctis ad eleuandum commodus submitti, & ossis frustulum, quod non rarè membranas pungit, eximi possit. Huius instrumenti, quod ego excogitavi, partes coniunctæ literis minusculis, separatæ verò maiusculis notantur.

Fig. II. est *lamina ferrea* A. in medio secundum longitudinem excisa, quæ superius manubrium B. habet, & foramen C. in flexura laminæ, inferius autem utrinque aciem acuminatam D. quibus firmiter cranio nudato insistit.

Fig. III. est *claviculus umbellatus*, qui asterismo notatur, & per foramen C. Fig. II. transiens, capsulæ E. infigitur. Hæc capsula E. laminæ ferreæ foramini A. Fig. II. beneficio orichalceæ lamellæ Fig. IV. regulariter annectitur, per duas cochleas, quas capsula in parte auersa obtinet, correspondentes orichalceæ lamellæ, totidemque nodulos, ut Chirurgus beneficio claviculi capsulam, in ipso operandi actu, sursum & deorsum, pro libitu mouere valeat. Foramini H. axis rotulæ imponitur, ut ex Fig. V. & rotulæ centro appareat. Lamella I. superius dentata est, & ibi excipit rotulam; inferius L. utrinque æqualis, ut serrula K. in capsula, & Fig. V. fissuris M. beneficio rotulæ & capuli, regulariter dextrorsum & sinistrorsum moueri apta sit. Lamina orichalcea N. in medio caua est, & duas habet cochleas O. huius laminæ beneficio serrula, cum instrumentum planè fuerit compositum, æqualiter hinc inde ducitur.


Fig. IV. est *lamella orichalcea*, cum duabus materculis, quas supra nodulos vocavi.

Fig. V. est *rotula semidentata* P. & dimidia capsula Q. una cum tribus foraminibus R. quibus tres cochleas Fig. III. recipit, cum nodis seu materculis tribus S. firmatas.

Fig. VI. est *clavis*, qua instrumentum in suas partes diuiditur, & iterum ex ijs componitur.

Lit. T. axin notat, quæ capsulam & rotulam in parte auersa perficit: V. verò manubrium indicat.

T A.




TABULA VI.

De Scerrulis rectis, & varijs scalpris, quibus cranium vel cariosum vel fissum abraditur.

FIG. I. & II. sunt *ferrula recta*, quibus alij interstitia foraminum modiolis in cranio factorum intercidunt, scissuras capillares ac non penetrantes abolent, & cariem cranij abradunt.

Fig. III. Galen. l. 6. *meth. med. c. 6.* tria scalprorum genera describit, *primum cauum*, *κυνδοροχον* seu scalprum excisorium appellat, cuius delineationem supra Tab. II; Fig. IX. vidimus; *alterum*, quod in ima sui parte lenticulam refert, quod *παχυνον* vocat: Cuius vsum & delineationem, Tabula modò citata Fig. VIII. descriptam, & depictam habemus; *tertium* radendo idoneum, quod Græci *Ευρησα*, Latini scalprum ralonum, & Barbari ralpatorium nuncupant. Hoc tertio scalprorum genere recentiores vtuntur in tentandis, & abradendis fissuris cranij capillaribus, seu de penetratione dubijs, eiusque varias, pro ratione sedis aut timæ, formas excogitarunt. Caum scilicet, vt Fig. III. IV. V. & VI. semilunarem, vt Fig. VII. æchminatam, vt Fig. VIII. & denique planam, Fig. IX. & X. *Chirurgus scalpra, cuiusvis forme, ad minimum quatuor, semper parata habeat, ne ex indigentia aliunde ea petere cogatur, aut occasionem operandi, quam precipitem esse nemo non ignorat, cum patientis periculo, & fama sua naufragio perdat.* Cum os cariosum in partibus extremis, femore, tibia, humero & cubito, deradendum est, scalpra his maiora & validiora parari debent. Conficitur autem vnumquodque scalprum ex Chalybe optimè depurato, vt aciem acquirat, qua promptissimè abradat. Scalpris veteres omnibus & singulis suum proprium manubrium adaptarunt: recentiores contra *sed meo iudicio minus rectè*, vnicum manubrium parant, ex ligno vel ossibus, in cuius imo foramen cochleatum habet, quo omnium scalprorum caudas pariter torculatas excipit, vt ex Fig. III. & reliquis patet.



T A B V L A VII.

De varijs ad parandum in nucha setaceum instrumentis, forcipibus scilicet quatuor, acu, & setone armato, deque canterijs, quibus inuritur occiput.

FIG. I. est *forceps*, quæ propè foramen superius, quod neque nimis latum, neque nimis angustum est, *cauitatem habet amplam & circularem, annulumque ferreum*, qui instrumentum seu forcipem ex se stringit, tum necessarius, quando Chirurgus famulum non habet, qui sibi acum optime ignitam, ad parandum in nucha setaceum, porrigit.

Fig. II. est *forceps*, quæ superius similem habet cauitatem, at ob defectum annuli, non ex se, sed à Chirurgo, quantum satis est, *stringitur*. His forcipibus vtuntur, quando occiput perforandum venit valde carnosum & pingue: quibus cutis apprehensa, cum crassa sit, circulum ingreditur, vt non elabatur.


Fig. III. est *forceps*, quæ neque cauitatem, vt Fig. I & II. neque annulum vt Fig. II. habet; cā Chirurgus machilentorum nucham apprehendit, donec acu candefacta, & à ministro porrecta, eam perforarit.

Fig. IV. est *acus* pro setacæo, quæ neque nimis longa, ne cuspis foramen oppositum fallat, sed palmam æquat; neque nimis tenuis, neque nimis plena, sed foraminibus prædictarum forcipum paulò minus respondet: vnde benè ignita & candens quam citissime pertransit, setaceumque ferè citra dolorem perficit.

Fig. V. est *puntale* longum & angustum, setonem seu funiculum rotundum, ex serico purpureo adstrictum habens, qui ad medietatem traductus, in foramine relinquitur. Puntali affixus est globulus cercus, vt sine mora & dolore transcat.

Fig. VI. VII. VIII. & IX. sunt *ferramenta* sine manubrijs varia, quibus benè candentibus occipitium in infantibus & puerulis, (in quibus epilepsiæ, apoplexiæ, & vertiginis signum aliquod apparet) in Italia frequentissime comburitur. Eadem inustio quandoque auxiliatur adultis, cum huiusmodi affectibus corripiuntur.

Fig. X. est *forceps ex se stringens*, quæ apprehenditur cutis, si setaceum sectione parandum est: hoc instrumentum dimidia parte maius sit oportet, quàm hic depictum cernitur; scalpellum autem forcipi huic respondens, & iusta magnitudine depictus, videatur infra Tab. XVII. Figur. IV. & apud Guilhelm. Fabricium Hildan. cent. I, obs. 40.



Tabula VIII. Declaratio.

T A B U L A V I I I .

19

De instrumento crinali, acubus argenteis ad dispositionem catari aet idoneis, annulo oculum firmante, specillis, scalpello falcato, hamulo acuto, & vasculo vitreo oculis imponendo.

FIG. I. est instrumentum crinale, curuum & interius gossipio & syndone nigra obductum, quod exterius propter duas fibulas & ligulas annexam habet claniculam umbellatam, qua sinus in oculi maiore angulo comprimitur. Hoc instrumentum excogitauit Hier. Fabr. ab Aquapendente, cuius mentionem facit, de agrylope per chirurgiam curanda.

Fig. II. duas monstrat acus argenteus, ad suffusionem deponendam factas, quæ manubrio argenteo & oculo in oculo inseruntur, quod utrinque habet glandem perforatam, per quam acus argenteæ transeunt.

Fig. III. est manubrium illud apertum, cuius acus ex vna parte inseritur, ex altera cochlea non nihil conspicitur.

Fig. IV. est acus ad curationem cataractæ accommodata, cum manubrio & vagina argenteis.

Fig. V. est annulus aneus (alii laudant plumbeus) ad firmandum oculum pro excisione pterygii, alijque operationibus in oculo peragendis.

Fig. VI. est specillum oblongum, teres & argenteum, ut pro necessitate possit inflecti: cuius alterum extremum latius est, alterum vero globulum habet rotundum & politum. Lata specilli parte, quam Celsus l. 7. c. 7. de ancyloblepharo oculorum vicio, specillum aduersum vocat, non solum curatur palpebrarum coalitus, verum etiam pulueres & plagulæ vnguents illiæ ulceribus applicantur: globosam partem Chirurgi adhibent ad perscrutandum vulnere & fistularum statum.

Fig. VII. est specillum compositum ex lato ad dictos usus, & cochlea acuminata, quæ gossipio obuoluitur, pro deterfione sordium, in vulnerebus, vlcerebus, ac præsertim fistulis.


Fig. VIII. est scalpellus falcatus, ex vna tantum parte incidens, cuius mucroni argenteus affixus est globulus. Hoc scalpello vsitur Eraclides Tarentinus, & Celsus pro separatione palpebrarum, quæ conuerunt eam tunicis oculi.

Fig. IX. est hamulus acutus, & mucrone paululum intus recuruat, qui tam ad palpebram attollendam, quam oculorum vnguem leuandum, maxime est idoneus.

Fig. X. est vasculum oculare, vitreum, oblongum & ex crystallo conficiendum, ita ut exacte orbitæ oculi respondeat, & medicamentum per infundibulum immissa contineat, ne defluant. Hoc instrumentum oculare inuenit, & fusiùs descripsit Hieron. Fabr. ab Aquap, de suffusione: qui videatur.

T A .

Armentarij Chirurgici,
TABVLA VIII



TABVLA IX.

De Forcipe ad polypum resta, & curua; cannulis, qua naribus immittuntur, cum suo stylo: instrumento, quo abscinditur vñula: cochleari vñula relaxata admouenda, dilatatorio oris, & rostro grune obtuso.

FIG. I. est instrumentum Hieronym. Fabricij ab Aquapendente pro polypo extrahendo restam, ex chalybe confectum; extrinsecus conuexum & intrinsecus concavum; quod aciem habet introrsum recuruatam; qua nihil aliud valemus incidere, quam polypum iam apprehensum.

Fig. II. est instrumentum incuruatum, quo inciditur & extrahitur polypus, qui per narium foramina in palato ad facies tendit, & suffocatione minatur.

Fig. III. est cannula ex ferro solida, quæ naribus tam alte immittitur, ut ylcæris, quod ozænam vocant; adæquet longitudinem; postea cannula huic omnino integræ, nullibi perforatæ, inditur stylus ferreus & bene ignitus, quo cannula calefit & vicus exsiccat.

Fig. IV. est cannula ad latus perforata, pro callo perduto vlcæris in narium latere existentis, per cauterium actuale consumendo, aut osse corrupto maxime exsiccando, idonea.

Fig. V. est cannula in summitate foramen habens, quæ naribus inditur, quando post incisionem, & extractionem polypi, sanguis nimium profluens chirurgia per inuersionem sistendus est: præterea vsurpatur, cum summitas narium pro ossis corrupti remotione, aduri debet.

Fig. VI. est stylus ferreus, qui bene candens dictis cannulis immittitur, statimque retrahitur; quæ immisso & retracto toties repetenda est, quoties necessarium fuerit. Ad operationem hanc cito perficiendam, Chirurgus ad minimum duos in promptu stylos habeat, quos alternatim candefactos cannulae immittat. Notandum verò, quod vasculum oculare Tab. VIII. Fig. X. atque hæc cannula naribus immittenda, in iusta magnitudine depingi nequeat, quoniam pro ratione ætatis ægorum & magnitudine locorum affectorum debent confici.

Fig. VII. est instrumentum, quo abscinditur vñula, orichalceum, quod in parte superiore circuli habet non nihil excavatam A. in inferiore fistulâ B. per quam sili (postquam in seminodum circumuolutum E. & in coæcatum annuli, ne hinc inde vacillet, repositum fuerit) extremum C. mediæ stylo superius perforato D. trahitur: alterum sili extremum, per duos circuli annexos annulos ducitur, & inferiori fistulæ anulo alligatur. Hoc instrumentum primus inuenit & descripsit Guilhel. Fabric. Hildanus cent. 2. obseru. 22. quo correcto vñulam militis Cæsariani, à Luce Gallica infectâ & corruptam, absque negotio ligauit & bono cum successu abscidi, vltimæ die 8. Iunii anno 1637.

Fig. VIII. est instrumentum vñula relaxata admouendum, pariter orichalceum, cochlear nempæ paruum (dimidio autem maius debet parari, quàm delineatum est) cuius manubrium fistulosum, & nouem pollices longum, inferiori cochlearis parti annectitur. Hoc cochlear pulueribus adstringentibus & dirigentibus mixtis repletur, & vñula relaxatæ submittitur: deinde Chirurgus ore arripit fistulæ basim, & inflando pulueres columellæ & palato vndique aspergit.

Fig. IX. est instrumentum oris dilatatorium, cum cochlea, ex Patzi l. 9. c. 25. delineatum, quo dentes constricti, validèque commissi diducuntur, ut cibus præberi possit, ne fame pereat æger.

Fig. X. est rostrum gruneum, dentatum, & in anpsulum obtusum directum, globulis, & peregrinis corporibus, arripiendis, & è vulneribus extrahendis idoneum.





T A B V L A X.

De Instrumento volsella simili, cannula faucibus immittenda,
 forcipe pelicano, rostro coruino, veltibus trifidis,
 & infundibulo.

FIG. I. est instrumentum *Acantabolo* (Tab. IV. Fig. 3.) simile, forceps nimirum in semicirculum recurvata, dentata, & in apice nodulo donata, qua ossicula, spinæ, alique res extraneæ, in his faucibus infixæ solent eximi. Quando clariss. Hieronym. Fabricius ab Aquap. in *faucium Chirurgia* acantaboli mentionem facit, intelligit instrumentum aliquod oblongum & tenuè, quod duplex, alterum rectum Tab. IX. Fig. X. adumbratum; alterum recurvum, quale hoc est: utrumque tamen ob arripiendi & extrahendi facultatem volsellæ nomen meretur.

Fig. II. est *cannula* argentea, ut faucibus immitti queat, *incurvata*, crassitie pennæ oloris, & longitudine vnius pedis, cum dimidio vel etreiter. Est vndeque perforata, & in sua extremitate spongiam magnitudine avelanæ novam & firmiter alligatam habet, qua ad spinas & faucibus & medio œsophago trahendas felici successu vitur Guilhelm. Fabricius Hildan. cent. 1. obs. 26. ubi docet operandi modum per cannulam hic depictam.

Sequentia ferramenta vsurpantur ad dentes perforatos, aut mobiles, aut vehementissimè per intervalla dolentes, sub acerbissimo doloris paroxysmo eximendos: vnde

Fig. III. est *forceps, pelicanus* dicta, quoniam rostro pelicani volueris assimilatur: eo autem utuntur ad extrahendos dentes molares.

Fig. IV. est *forceps dentaria communis*, Italici cagnolo appellata, quod firmum canis morsum imitetur.

Fig. V. est *forceps, rostrum coruini* referens: qua dentium radices extrahuntur; de qua Cornel. Celsus (quem veluti in omnibus Chirurgijs mirabilem, nocturna versare manu, versare diurna, consilio Fabrit. ab Aquap.) l. 7. c. 12. de dentibus ita scribit: quotiescunque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facta forcipe, quam Græci *πίδα* πῶν vocant, eximenda.

Fig. VI. & VII. sunt *forceps dentariarum effigies*, quæ valent ad dentes euellendos, quibus neque pelicani, neque forcipis communis opera potest opitulari.

Fig. VIII. & IX. sunt *velles trifidi* appellati, quod plerumque tres cuspides habeant ad protrudendos & excutiendos dentes ineforios, & caninos, qui maxillarum alveolis simplici radiei insiguntur.

Armamentarij Chirurgici;
TABULA XI




Fig. X. Est *dentiscalpium*, quo separatur gingiua à dentibus, ut minori cum molestia & periculo euellantur. Ut igitur dentis euulsio feliciter succedat, obseruatis obseruandis, humili in loco collocetur æger, capite inter Chirurgi crura inclinato: tùm Chirurgus dentem extrahendum altius quasi circumradat, separando gingiuam dentiscalpio: qui si à gingiua liberatus vacillet, concutiendus, & submisso vecte protrudendus est. At si tenacius hæreat, neque post concussionem moueatur, forcipibus dentarijs (nunc hac, nunc illa, prout dentis magnitudo, figura & situs, postulare videbitur) excipiendus & euellendus. In harum forcipum dentatiarum vsu (inquit Ambros. Paræus l. 16. c. 27.) exercitatum & industrium dentispicem desiderem, his enim nisi qui solerter uti nouerit, committere vix poterit, quin tres vnica concussione dentes excutiat, eo sæpè inconcusso & relicto, qui dolorem mouet.

Fig. XI. est *infundibulum* seu fistula argentea, cuius pars angustior inter gingiuas ægri, qui arctè constrictos habet dentes, extremas ponitur; latior verò cibum liquidum & potum excipit, atque ad œsophagum demittit.

T A B V L A X I.

De alia forcipe cum rostro pssitacino & coruino, speculo oris, instrumento ad incidendas carunculas oris, & rostro gruino recto.

FIG. I. est *forceps alio cum rostro pssitacino*, qua utimur in fracturis cranij, quando frustulum ossis, quod membranas cerebri vel pungit, vel deprimat, auferendum.

Fig. II. est *instrumentum cum rostro coruino* in eundem finem affabrè factum: *notandum* verò, quod ambæ hæ forcipes, tertia parte maiores, quàm depictæ sunt, debeant confici.


Fig. III. quid sit, ex Tab. IX. Fig. X. constat.

Fig. IV. est *speculum oris*, quo deprimatur lingua & maxilla inferior, ut oris vitia exactè perspici, & idoneis tam instrumentis quàm medicamentis tractari possint. In primis autem factum est, ut eo furiosorum & attonitorum dentes diducti seruentur, donec cibus & potus sufficiens fuerit deglutitus.

Fig. V. est *instrumentum incisorium* instar forcipis, quo excinduntur tumores & carunculae oris.

Fig. VI. est *forceps cum rostro gruino*, dentata & recta, quæ vossellæ vices agere potest.

T A.



T A B V L A XII.

De Σκολομαχαίρις seu scalpellis falcatis, cultro ancipite, acu longissima, Siphone aureo, scalpello annulari, cannulis alatis ac perforatis, fistula aurea meatui urinario immittenda, & instrumentis, quibus hydropicorum venter & scrotum aperitur.

FIG. I. est Scalpellus Σκολοπομαχαίριον à Græcis nominatus, ob rostrum illius aus, quæ Latinis Gallinago, & Græcis Σκολοπαξ dicitur, nempe longus, & ad cuspidem paululum incurvatus veluti rostrum scolopacis. Hoc scalpello dilatantur vulnera thoracis nimis angusta, & aperiuntur abscessus magni. Eundem laudat Fabrit. ab Aquap. pro apertione abdominis hydropicorum infra umbilicum ad aquam emittendam. Nota, hic scalpellus pro dilatazione vulneris in thorace requirit globulum (qualem ex argento scalpellus Tab. VIII. Fig. VIII. habet) ferreum in mucrone, ne pulmones cuspe scalpelli offendantur.

Fig. II. & III. sunt scalpelli ad mucronem recurvati, scolopomacharij Græcorum formam referentes, quibus fistulæ in habitu corporis mediocres commodè inciduntur, vnde etiam σφιγγότομος appellari solent.

Fig. IV. est scalpellus falcatus, qui Italici vocatur gammate, & incidit ex parte caua, retusus in parte gibba est. Hoc frequentissime vtor ad omnem incisionem, quæ passim fit in omni apostemate, præcipuè verò in parvis incisionibus. Hic scalpellus habet manubrium osseum, quod commodum est, ad diuidendum ac separandum aliquid ab aliquo: vnde Celsus l. 7. c. 16. de tumoribus tunicatis dicit: tum scalpelli manubrio tunica (quæ post incisionem cutis protinus alba & intenta se ostendit) diducenda à cute & carne est, eijciendaque cum eo, quod intus tenet: hoc diducitur quoque pericranium à cranio, & vnguis ab oculo.

Fig. V. est scolopomacharium sine manubrio.


Fig. VI. & VII. sunt scalpelli ancipites, qui ad extremitatem referunt formam foliorum myrti: ijs utimur ad mammas mulierum cancro affectas abscindendas.

Fig. VIII. est acus acutissima, longa & anceps, qua mammx aufferendæ traijciuntur in basi.

Fig. IX. est canalis ex auro Vngarico patatus, & plurimis foraminibus perforatus.

Fig. X. est stylus ex eadem materia confectus, qui canulæ priori immittitur, ut ex duabus figuris vnicum fiat instrumentum, quod in vulneribus thoracis pro Siphone vtiliter applicatur, & sanguinem ex thorace non concretum, aut pus tenne trahit. Instrumentum hoc

tracto.



tractorium in angulum rectum vel obliquum flecti, & thoraci per vulnus, casu vel studio factum, immitti potest, ut sanguinem nondum concretum vel saniem contingat: Chirurgus extrahat stylum ex canali, & statim profluat de canali materia in thorace contenta. Hic trahendi modus ex thorace materiam tenuem, ubi sectio inter 5. & 6. iuxta Paulum, vel inter tertiam & quartam costam iuxta Hipp. propter virium debilitatem vel aliud prohibens non conceditur, optimè succedit.

Fig. XI. est *scalpellus* ille recurvus, qui annulo aureo potest abseindi: inciduntur hoc apostemata in facie aut gena puerorum, & in mammis foeminarum timidarum, ne conspicientes scalpellum perterrescant, & ita incisionem abscessus prohibeant.

Fig. XII. XIII. XIV. & XV. sunt *cannulae* magnitudine differentes, *alata*, & pluribus foraminibus perforatae, ut vulnus thoracis teneant apertum. Sunt alatae, ne vulnere immittæ, dum æger spirat, thoracem ingrediantur; tot verò foramina habent, ut ea ex omnibus, prout opus erit, possit exire colluvies.

Fig. XVI. est *fistula* ex auro Ungarico fabrefacta, qua ante excretionem urinae *meatus urinarius* immittitur, ut per eam exeat urina, atque ita leniatur sævissimus ille dolor & ardor, quem sentiunt ægri, quando urinam sine cannula reddunt, ob vlcus ex Gonorrhæa virulenta subortum in *meatu urinario*.

Fig. XVII. est *instrumentum acui tricuspidis* (a) & *cannula alata* (b) constans, quo hydropicorum umbilicus, & in hernia aquosa serotum perforatur, ad emittendam aquam. Hoc instrumentum intruditur usque ad cannulae asterismum, postea acus retrahitur, & cannula sola ad alam intrusa in abdomine relinquitur, absque omni periculi metu.

Fig. XVIII. est *cannula sola*, & sine acui depicta.

Fig. XIX. est *acus sola* extra cannulam posita.

Fig. XX. est *acus rotunda* cum suo tubulo, qua, in defectu acui tricuspidis, pari securitate perforatur hydropicorum umbilicus, & herniosorum serotum aqua repletum.

Fig. XXI. est solus acui rotundæ tubulus.

Fig. XXII. est sola acui rotunda.

T A B U L A XIII.


De Siphone cum tubo recto, & ineurnato; matriculari, & auriculari; fistula enematum, pileolo argenteo, & candelis cereis.

FIG. I. est *Sipho* ad extrahendum & infundendum aliquid, sæpè necessarius, qui hic tubum eorum habet annexum, rectum verò

Fig. II. potest recipere, quando curvus ad extrahendum aut infundendum aliquid non est aptus.

Huic Siphoni interdum accommodatur tubus Fig. III. plurimis for-





foraminibus perforatus, quem Græci & Galenus l. 9. de comp. med. sec. loc. c. 8. & l. 5. met. med. c. 5. *Metrenchytam* nominant. Hoc foraminæ, quæ negotium immittendi clysterem in uterum alijs præ pudore non facile concedunt, sibi ipsi liquores pro curatione variorum affectuum uteri, & eius vaginæ, varios, commodè applicant.

Fig. IV. est siphon auricularis *Otenchyta dictus*, quo liquores in auditus organa, pro ulcerum deterfione & consolidatione, infunduntur.

Fig. V. est *Enterenchyta*, canalis nempe orichalceus in forma *καδύτῃ* pos. recurvatus, quem parari curent illi, qui sibi ipsi clysterem applicare malunt, quàm ab alio quouis accipere, præferim, si ob intestinorum, præcipuè verò recti, vitia, creber enematum usus requiritur.

Fig. VI. est dicti canalis seu fistulæ incurvaturæ clavis B. Fig. V. cuius beneficio liquor Enematis in vesica, quæ circa lit. A. Fig. V. vulgari modo alliganda, ad libitum ægrotantis retinetur, prout canalem claudit & aperit.

Fig. VII. est claviculus umbellatus, c. Fig. V. qui clavi B. Fig. V. intorquetur, ne aliquid de clystere, in circumrotatione clavis, possit elabi, quod linteamina inquinet. Hoc instrumentum, ut cuilibet apparet, multum differt ab eo, quod Iohan. Heur. in sua meth. ad praxin medicam c. de Clysteribus, & Guilhel. Fabr. Hildanus cent. 1. obser. 78. depingi curantur, ad clysteres in aluum injiciendos.

Fig. VIII. est *pileus argenteus*, & ubique perforatus, qui exulceratis mammarum papillis applicatur, ut infantem nutrices absq; molestia lactare possint. Vsurpatur insuper hic pileus in vulneribus thoracis; postquam enim cannularum prædictarum aliqua thoraci fuerit immissa, & particula Spongiæ orificio cannulæ propè alam indita, superponitur pileus, ut materia, omni quasi momento, per eius foramina paulatim, & sine virium iactura, transfuderet.

Fig. IX. & X. sunt *candela* ex filo forti duplicato & cera alba (cui modicū terebenthinæ additum sit, ne tam facile frangantur) *paranda*, quæ vsurpantur ad suppressionem urinæ ex ca runcula in meatu urinario existente, curandam: *Candela Fig. IX. fracta est, ne in extractione candela frustulum cera, qua non nunquam in medio filum non habet in mensu relinquantur, & ischuria augeatur: quare portio, nem fractam ad ellychnij extremitatem chirurgus forcipe abscindat, deinde meatui urinario, quantum opus erit, immitat candelam, oleo amygdalarum dulcium illitam.*

T A B V L A XIV.

De syringotomis, acu qua pertunditur scrotum post sectionem hernia Nursinam & fundus fistula declinioris; cathetere, itinerario, & duobus instrumentis, quibus glandes & sclopotorum vulneribus trahuntur.

FIG. I. est scalpellus securus, qui parte interna, a, aciem habet, & excipia, b, est retusus, *Syringotomus* scilicet ex altera extremitate

te, c, pungens & incidens, quo utimur in fistula quauis vnum foramen habente, vt finis fistulæ perforetur, & postea ab vno ad alterum foramen incidatur interstitium: ad huius cuspidem insigere oportet globulum ex cera alba formatum, quo fistulæ immisus scalpellus, sine omni obstaculo, dolore & noxa, ad sanum perueniat.

Fig. II. & III. sunt scalpelli *syringotomi*, quorum vterque ex altera extremitate obtusus est, & globulum ex ferro leuigatum obtinet: His inciditur fistularum penetrantium totus ductus.

Fig. IV. est scalpellus *Syringotomus*, quo dilantur vulnera abdominis, vt intestina prolapsa & flatibus turgida commodè reponi possint. Globum habet in altero extremo multo maiorem, quàm scalpelli duo priores, ne vulnere intrusus intestina lædat.

Fig. V. est *acus*, seu *instrumentum* ferreum, aciem ancipitem habens, quod Nursini mco tempore in Italia hac in Chirurgia (qua hernias curat cū excisione testiculi) maximè exercitati, eoq; nomine celeberrimi castratores, per inguinis vulnus ad scrotum fundū demiserunt, quem instrumenti cuspide (cui perpetuè cere alba exiguum globulum annexere oportet, ob rationem supra allaram) perforant, quo purulenta materia, quæ per inguinis vulnus ad scrotum descendit, expurgetur. Hæc operatio, quoniā satis & horribilis, & maximo vitæ periculo non vacat (quod illius auctores optimè norunt, unde curandos suscipiunt vt mortuos) chirurgiæ studioſis alium eumque tutum huius instrumenti vsum aperiam. Inciduntur eo feliciter fines sinuum decliues, quorum eausa fistulæ expurgari nequcūt, nisi æger ita situctur, vt pedes sursum & caput deorsum conuertat, ac materia dein proprio motu emanet. Notum enim est, sinus illos, qui callum condum contraxerunt, de quibus etiam hic sermo est, medicamentis solum agglutinantibus, & fascia conuenienti posse curari, modò materia in sinu collecta exitum quocidè habeat. Dum autem situs iste sursum conuersus pedibus & capite deorsum, satis sit importunus, hoc instrumento, cuius cuspidi globulus ex cera debet annexi, sinuum fundus perforatur (intacto foraminum interstitio) vt pus per inferius foramen egredi possit, & sinuum parietes agglutinari.

Fig. VI. est *catheter* seu *Syringa tentatiua*, quā in canalem virgæ & vesicam positā exploramus intimos vesicæ anfractus, in quibus latitare solet lapillus, quo humana natura sæpè numero eruciatur: Græcis appellatur *καθετήρ*, & vsurpatur ad vrinam suppressam reddendam. Est argentea, vt inslecti possit, omni asperitate vacat, ne pars exquisitissimo sensu prædita in transitu catheteris afficiatur, & vt sine dolore vesicam ingrediatur: Pluribus in extremo foraminibus perforata est, vt retracto stylo, vrina in vesica contenta, per fistulam liberè, & sine difficultate exeat. Notandum, quod stylus fistulæ non inmit-

immittitur, vt quasi vi vacui urinam suppressam secum trahat, sed ne urina statim effluat, dum Lichotomus vel Medicus lapillum expiscatur occultum. Magnitudinem catheteris describit Celsus l. 7. cap. 26. vid. Tab. XXXIX. Fig. IX.

Fig. VII. est *stylus argenteus*, qui inflecti debet, vt fissuram, quam in medio sui vsque ad extremum obtinet, in dorso vel gibba parte habeat: Latinis vocatur *Itenerarium*, eo quod virgæ immissum fidelissimè collum vesicæ monstret, & super ipsum incisio facienda sit, pro extractione calculi vesicæ.

Fig. VIII. est *instrumentum orichalceum*, quo extrahitur calculus, qui in mentu urinario resedit; specillum scilicet, quod parte, qua ad cochlearis auricularis similitudinem excavatum est, in canalem colis demittitur, ita vt lapillum prætereat & superet, ipsumque suo labro & cauo comprehendat: quo facto, per stylum specilli cannulatum & lato orificio donatum, vtreæ, vt lubrica fiat, immittitur oleum amygdalarum dulcium, postea specillum sensim extrahitur, & canalis post lapillum digito comprimitur, donec is è meatu urinario foras deducatur.

Fig. IX. est *instrumentum globulis ex vulnere trahendis* maximè idoneum ex optimo chalybe sabrefactum, & tribus cõstans partibus, duabus nempe *cannulis & terebello*. Cannula externa, *a*, cannulam internam, quæ altera in extremitate in duo diuisa est cochlearia, *b*, ferrata, claudere potest, vt globulum firmet, ne cum terebello, quod ipsi infigendum est, circumuoluatur. Terebellum, *c*, acutissimum est & duabus suis cannulis paulò longius, quod per foramen capuli, *d*, cannulæ immissum cernitur.

Fig. X. est *terebellum* extra suas cannulas depictum.

Fig. XI. est instrumentum idem cum priore (nisi quod terebello careat) quo extrahuntur globuli, duabus constans partibus, cannula, *a*, & stylo, *b*, solido, qui in altera extremitate in duo cochlearia desinit, quæ globulum in se recipere possunt. Hoc instrumentum idem præstat quod *Alphonsinum* Tabula sequentis.

Fig. XII. est instrumenti præcedentis cannula sola.

Fig. XIII. est instrumenti stylus, ad dimidium solidus, in extremitate altera cochlearium dentatorum effigiem referens, in altera cochleas, capulo & nodulo, distentas.

Fig. XIV. est styli capulus cum matercula, rotundus & cauus.

Fig. IX. X. XI. XII. XIII. & XIV. huius Tabula tertia parte maiores fieri debent, quàm hic depicta videntur.




I



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



T A B V L A X V.

De alijs serratmentis ad globulos sclopetorum eximendos idoneis, instrumento nempe Alphonfino, forcipe anserina cum & sine cochlea, hamulo, terebello, cannulato, & spatula, quæ rostrum anserinum refert.

FIG. I II & III. est instrumentum Alphonfinum dictum, ad extrahendas è vulneribus sclopetorum glandes accommodatum, quod Alphonfus Ferrius. Medic. Neapolitanus l. 2. de vulnerib. sclopetor. c. 3. his verbis describit. Non inuoluendum tamen silentio est grui-
num rostrum (vt vocant) vtpote quod & ipsum ad extrahendum in-
strumentum est excellentissimum, atque ab omnibus, cum veteribus,
tum recentioribus, commendatum: quo non solum pilulæ è difficil-
limis locis, sed & alia, vt armorum, & cæterarum rerum frustula ex-
trahuntur. Huic nos, vt commodius manu ac valentius reneri possit,
atque ita pilæ, ac cætera extranea, in vulnere certius explorari, an-
nulos forcipularum adiicimus hoc pacto: Figuræ primæ annulus A.
ad anteriorem partem missus, instrumentum claudit. Figuræ secun-
dæ annulo B. ad manubrium retracto instrumentum aperitur. Figura
tertia est instrumentum, quod globulum iam apprehendit.

Sequentium instrumentorum imagines desumptæ sunt ex Barthol.
Maggij tractatu de curatione vulnery a bombardarum & sclope-
torum globulis illatorum.

Fig. IV. est forceps anserina, quæ circa manubrium cochleam ha-
bet, vt globulum firmiter comprehendat.

Fig. V. est hamulus ferreus, educendis glandibus inseruiens.

Fig. VI. est forceps anserina, quæ si cochleam haberet, priori simi-
lis esset.

Fig. VII. est terebellum acutissimum, cannula munitum, quo edu-
cuntur globuli sclopetorum.

Fig. VIII. est terebellum extra cannulam positum.

Fig. IX. est spatula rostro anserino prædita, ad excipiendos & tra-
hendos globulos parata. Instrumentum Alphonfinum & forcipes
anserina, tertiam partem maiores conficiantur, cannula verò cum tere-
bello aliterq. tanto maior sit.

Plura quidem, sed propositis hæud præstantiora ad viuum delinea-
uit Ambr. Parvus in sua Chirurgia, vbi de sclopetorum vulneribus
agit, & Guilhelm. Fabric. Hild. Cent. I. Obs. LXXXIX. Instrumen-
torum igitur, quæ ad globulos ex vulneratis partibus trahendos va-
lent, pro varietate vulnery, & forma corporis educendi, varia sunt
genera, quorum alia apprehendunt & foras trahunt, vel quatenus



acuta globulis solum infiguntur (Figur. VIII.) vel quatenus serrata sunt in extremitate, & alia figuram rectam (Tab. IV. Fig. I. Tab. IX. Fig. VI. & hac Tabula Fig. I.) atque alia recurvam habent (Tab. IX. Fig. X.) prout iter globuli vel rectè vel obliquè processit; Quædam in se globulum recipiunt, quatenus latiora & caua in extremo sunt (Fig. IV. V. VI. & IX.) Alia apprehendunt & recipiunt simul, (Tab. XI. V. Fig. IX.)

Quod si globulus, specillo inuentus, debet tenacula educi, summo perè cauendum est, ne labia vulneris, partesque ipsius interiores, (arterias, puta, venas, neruos & tendines) lædantur & apprehendantur. Hoc enim si fiat, præter enorme sanguinis profluium, grauissimi dolores, & insignes inflammationes, cum magno vitæ periculo excitantur. Ad ea igitur præcauenda symptomata, numquam dilatur tenacula, nisi eius extremitate sentiatur globulus: tunc enim apprehensa est tenacula, globulusque ea comprehensus educendus est.

T A B U L A X V I.


De cannula emnino solida, & tubulis ad latera perforatis, eorumque quibus ano immittitur exsiccantur & comburuntur hæmorrhoides & vlceri intestini recti: de vitro etiam, quo extrahuntur papilla in mammis occulta.

FIG. I. est instrumentum ad resiccandas hæmorrhoides internas, quæ vel tument, vel superficialiter intestinum exulcerant, idoneum, cannula nimirum ferrea, quæ ano inditur, alata, & in fundo oclusa, ne ferramentum candens Fig. IV. quod cannulæ cavitati frequenter immittitur, & eximitur, altius quam oportet, perueniat.

Fig. II. & III. sunt tubuli pariter ano immittendi, sed in lacetæ (pro situ viceris callosi aut profundi, quod medicamentis non cedit topici) perforati, quibus immittitur ferramentum ignitum Fig. IV. His tubulis partes sanæ ab immediato ignis contactu defenduntur, quò solum vlcus tutissimè bis vel ter ferro ignito tangi possit.

Fig. IV. est stylus, qui ignitus redditur, & cannulis perforatis ac solide immittitur ad exsiccandas hæmorrhoides internas & tumentes, sanandaque vlceri intestini recti, superficialia & profundiora.

Fig. V. est vitrum vacuum, longum & angustum, ex altera extremitate os habens, magnitudini papillæ respondens, ex altera verò foramen paruum cum fistula longa, per quam patiens ipsa suctu foras trahit papillam occultam, vt ipsam infans ore apprehendere, & lac maternum sugere queat.



T A B V L A X V I I .

De unco ad extrahendum foetum mortuum, speculis ani,
dioptra matricis, circulis uterinis, & forcipe
deceptoria.

FIG. I. est instrumentum duobus vncis donatum, quo extrahitur
foetus mortuus, integer, vel in frusta incisus, ex utero.


Fig. II. est instrumentum, quod *speculum ani*, & *vagina uteri*
appellant, eo quod huius beneficio speculentur ulcera intestini re-
cti, & vaginæ uteri, ad quantitatem & eorum qualitatem perquiren-
dam. Pars speculi A. notata aperta, & masculus dicta, maribus ap-
plicatur: pars vero clausa, & B signata, foeminis adhibetur, vnde fo-
emina appellatur.

Fig. III. monstrat idem speculum, quod maribus convenit, clau-
sum; quod vero foeminis applicari solet, apertum.

Fig. IV. est *speculum matricis* magnum, quod mulieribus adhi-
betur solum, quando incidendus est foetus mortuus, aut inspicienda
matricis exulceratio. Ha dioptra a tertia parte maiores conficiantur,
quam extant depicta.

Fig. V. VI. VII. & VIII. sunt *circuli uterini* ex ligno buxco fabri-
cati, qui post repositionem uteri prolapsi, vaginæ induuntur, ne ute-
rus iterum procidat. Ex vna parte A, qua intus spectant, non nihil
acuminati, ex altera vero B. obtusi. Chirurgus vel Medicus ad mini-
mum tres vel quatuor annulos uterinos, qui magnitudine saltem
differant, semper in promptu habeat, ut ijs, pro ceruicis amplitudine
& angustia, uti possit.

Fig. IX. est *forcipis deceptoria*, eo quod, si non egrotum, Chi-
rurgum tamen decipiat, in dilatandis sinibus, iuxta antiquorum
sententiam.



T A B V L A XVIII.

*De instrumentis, quibus pes contractus paulatim extenditur;
cubitus rigidus sensim & sensim flectitur, arteria
carpi vulnerata comprimitur, & setaceum
in nucha inciditur.*

FIG. I. est instrumentum ex ferro fabricitatum, incuruato & con-
uulso crure, genu adaptandum, quod constat ex diuersis parti-
bus, nimirum capsula A. ferrea, quam transit cochlea B. & affigitur
annulo ex lamina ferrea in latitudinem, vt genu totum complecta-
tur, fabrefacto. C. fibulis D. vt claudi & aperiri possit: foramini-
bus in extremitate E. vt gossipio & linteo subducatur: & tandem
clauicula ferrea F. cuius beneficio attrahitur annulus, & crus in re-
ctitudinem tendit.


Fig. II. est dimidia & inferior pars cochleæ B. Fig. I. depictæ.

Fig. III. est cochlea B. Fig. I. extra locum, duabus constans parti-
bus, quarum superior, a, post attractionem annulo affixa relinqui-
tur, altera, b, extrahitur. Hoc instrumentum non parum differt ab eo,
quod Guilhelm. Fabricius Hildanus in libello suo de combustionibus
c. 15. se inuenisse scribit.

Fig. IV. est instrumentum ex varijs è ferro laminis confectum,
plurimisque foraminibus perforatum, vt gossipio & linteo induci,
ac cubito instar manicæ adaptari, claudi atque aperiri possit. Cochlea
umbellata, quam habet instrumentum, comprimitur arteria carpi,
consilio aut fortuito aperta, ne vitam cum sanguine profundat.

Fig. V. est instrumentum ferreum, quo utimur, quando cubitus in-
flecti nequit: Hoc instrumento paulatim, mediante cochlea, flectitur.
Huius tabula instrumenta Fig. I. IV. & V. ad proportionem membri
affecti debent parari.

Fig. VI. est scalpellus anceps & folij myrtini formam referens,
quo secatur setaceum in nucha: huius scalpelli forceps delineatur,
& describitur supra Tab. VII. Fig. X.



T A B V L A XIX.

*De ferramentis diuersis, quibus candefactis varia corporis partes
varijs de causis comburuntur; & lanceola, ad incidenda
vasa, aperiendos abscessus cutaneos, & perfo-
randos meatus ani, & penis, & pra-
putij oclusos.*

FIG. I. & II. sunt ferramenta, in summa parte reflexa & lata, quibus candentibus non solum compescitur sanguinis fluxus enormis, post abscisionem mammæ, aut membri spachelati, verum etiam pars relicta roboratur, ne nouum accipiat humorum affluxum. Anno 1635. tempore pestis, Patricius quidam Vlmenis, adhuc superstes, circa anum torquebatur anthrace pestilenti, magno & nigro, qui interiora petens omnino euauit, & mortem certissimam minatus est. Pro anthracis retractione, instrumenta Fig. I. & II. optimè ignita alternatim, propè anum, admouit, vt non irritaretur eorum contactu, sed tantum vim ignis perferiret, ad bonam laborantis tolerantiam, quo carbunculus retraheretur. Retracto Escharam induxi ferramento Fig. III. sequentis, ad Escharæ casum applicui cataplasma, quod bidui spatio eam separauit.

℞. Salis commun. ʒ. ss.

Piperis. ʒj.

Caricar. ping. n. iij.

Fol. rut. virid. Mj.

Ferment. veter. acid. ʒj.



Misce omnia in mortario quàm diligentissimè, in formam cataplasmaris, quod bis in die renouetur.

Hoc cataplasma descripsit Sennertus, & Spigelij maiores in Belgio habuerunt, pro secreto, eò quod escharam omnem optimè tollat. Eschara sublata vlceri imposui supet filamenta carpta vnguentum citrinum, quod vim habet digerendi, attrahendi, carnem generandi, & venenis resistendi: Circa vlcus adhibui emplastrum album coctum: tandem ad cicatricem duxi emplastro diapalmæ.

Fig. III. & IV. sunt *causteria* actualia rotunda, quibus tangitur os corruptum, vt à sano separetur.

Fig. VI. & VII. *qualem* referunt in extremitate formam, quibus hæmorrhoides nimium fluentes sigillatim comburuntur.

Fig. VIII. IX. X. & XI. sunt *causteria* in extremo rotunda, quæ



quæ dentium canitibus immittuntur , ad eorum cariem prohibendam . Figura asterismo notata scalpellus est rectus , & ex utraque parte ineidens, *lanceola* dictus: Hoc felicissimè Galli & Itali venas ineidunt, præmittendo sanguine: Hoc puerorum recens natorum anus & penis non perforatus aperitur: Hoc, in Germania, fonticuli artuum secantur .

T A B V L A XX.

*De forcipe maxima, forcipe cartilagines incidente, eultro falcato, scalpro, & malleo ligneo, quibus, præter forcipem, ad amputationem membri, spachelo cor-
recti, indigemus.*

FIG. I. est *forfex*, qua abseinduntur non solum ossa, quæ in fracturis cum vulneribus eminent, & reponi non possunt: verum etiam ea, quæ suo acumine cerebrum pungunt: hæc forcipe etiam abseinduntur digiti manuum & pedum, superflui, spachelo & carcinomate affecti: quæ altero tantò maior paretur, quam hic delineata cernitur. vid. inf. Tab. XXVI. Fig. I. & VI.


Fig. II. est *forceps incisoria* , ad partes cartilaginosas & callosas facta.

Fig. III. est *eultellus falcatus* , quo caro usque ad os serra resecandum ineiditur , ante imputationem cruris , & brachij necessarius .

Fig. IV. est *scalprum* , quo non tantum digitorum, verum etiam cubiti & radij capita amputantur.

Fig. V. est *malleus* ex ligno durissimo fabrefactus.

Fig. VI. est *truncus* ligneus rotundus & altus, in quo partes scalpro auferendæ collocari debent,



T A B V L A XXI.

De instrumento τῆς ἀμῆς, Hippocratica Scala, Nilei Plinteo,
Canali, Glossocomo Galeni.

FIG. I. monstrat instrumenti, quod Hipp. ἀμῆ nuncupat, effigiem cum suis additamentis.

Fig. II. est instrumentum ambi dictum in suas partes (columnam scilicet A. Spatham lineam seu ἀμῆ propriè dictam B. & clauum C. qui continet ἀμῆ versatilem B. in sua columna, A.) diuisum. Ambi Hippocrates sect. 6. de articulis, ita describit :

Lignum B. esto latitudinis ferè quidem quinque aut quatuor digitorum, crassitudinis verò duorum, aut etiam tenuioris, longitudinis autem bicubitalis, aut paulò minus. Cuius alterum extremum D. rotundum sit & angustissimum ea parte, maximèque tenue. Super-ciliofam autem habeat eminentiam, in summa rotunditatis parte paulum extantem, qua non latus, sed brachij caput attingit, ut huic supposita ala ad costas adapteretur. Addo, quod lignum hoc tria debebat habere foramina, per quæ traiciantur lora, quibus brachium ligno firmiter alligandum.

Fig. III. est scala, cuius gradus superior habet corpus quoddam E. rotundum, quod sub alam ponitur inter costas & humeri caput : postea Chirurgus brachium luxatum (sed spathæ non alligatum) deorsum trahit, alius ministra apprehensa ceruice & summo humero, similiter trahet ex alia parte : tertius apprehendit totum corpus, trahetque deorsum ex alia parte scalæ. Huius operationis idea videatur apud Galenum Comm. in libr. Hippocratis de articulis : habet etiam hæc scala quatuor sibi annexas trochleas, pro vsu Nilei Plintei, quod infra Fig. V. explicabitur.

Fig. IV. est formula instrumenti glossocomi, ad fracturas femoris & cruris (quando patiens ex suo lecto, in quo iacet, ut sternatur, transfertur in alium) firmiter continendas, maximè idoneum. Glossocomi huius descriptio apud Galenum comm. in libr. Hipp. de fracturis talis est : Ad continendum autem firmiter, Glossocomum instrumentum à iunioribus Medicis inuentum est, seu femur, seu crus fractum sit, cuius structuram vsunque subijciam. Id autem non abs re mihi videtur fuisse excogitatum : & tam si femur, quàm si crus comminutum sit, ubi callus circumdatur, commodissimè adhibetur. Ab ima parte axis A. ad quem extremi laquei in diuersa extendentes deligantur, iniiciantur laquei extremis partibus ossis, quod curatur, sicutque ex duabus habenis B. & C. sic, ut quatuor uterque capita habeat, bina à dextra parte. F, totidemq; à sinistra G.

Ex

Ex ijs capitibus, quæ inferioris laquei B. sunt, per foramina facta in inferiore parte D. gloslocomi ad axem duci debent; quæ superioris, primo procedere ad superiora, deinde ipsa quoque per latera gloslocomi perforata trajici, quibus foraminibus Cochleæ F. incluse sunt; utrinque autem ab exteriori parte gloslocomi F. & G. superioris laquei C. capita ferenda sunt ad axem. His enim ita constitutis, vna axis conuersio pariter ambos laqueos extendit, deorsum versus illum, qui ad inferiora fracti ossis alligatur, sursum verò alterum sic, ut ubi crus iacet, liceat in posterum quotidie hunc laqueorum in diuersas partes intentionem corrigere, valentius vel lenius extendendo. Laqueum B igitur, qui in inferiori parte est, directâ ductione axis extendit, eum verò C. qui in superiori parte intercedente alio motu extendit, Græci *διὰ τὸν μεταληπτικῆς τὰρσεως* dicunt. Schema ostendit extensionem femoris diminuti; Si autem sit crus diminutum, laqueus superior C. infra genu, inferior verò supra malleos alligandus est, atque ita crus in diuersa extantum conseruandum.



Fig. V. est *organum tractorium Nilei Plintheum* nuncupatum, factumque ad eorum exemplum, quæ tractoria oblonga, & quadrata dicuntur. Hoc instrumentum duo habet latera, *a*, quatuor palmas longa, & digitorum transuersum crassa, quæ extremis partibus transuersarijs duobus, *b*, in medio foramen, *c*, per quod laquei, *b*, trajiciuntur, habentibus, inter se compacta sunt. Est autem transuersariorum crassitudo & latitudo, quæta laterum, sed longitudo palmam implet. Merito igitur talis compactio fit, ut latera, *a*, quatuor palmas, transuersaria verò, *b*, vnam longa sint. Totius organi structura oblonga confecta est. Licebit autem, si quis voluerit, latera breuiora, quàm dictum est, efficere, quandoquidem organum per vnicum axim præstat effectum. In Medio itaque latera pertusa sunt rotundis & peruijs foraminibus, per quæ axis, *d*, trajicitur, cuius caput sinistrum, quo latus excedit, manubrium ligneum habet, *e*. In hoc quoque organo quatuor sunt annuli ferrei, *f*, cum totidem loris pendulis lateribus affixi, bini ab inferiore parte, totidemque à superiore, ut scalæ Fig. III. alligari possit. Axis extremitatibus ambabus additæ sunt rotulæ, *g*, & his remoræ, *i*, ut axim manubriolo circumductum firmiter contineant. Quod si neque per fasciam alæ subiectam (Tab. XXIII. Fig. II.) neque per linteam glomeratum (Tab. XXIV. Fig. I.) cubitus luxatus reponi potest, hoc organum scalæ alligandum, cubitusque extendendus ea ratione & modo, ut in Schema apud Orisbal. lib. de machinament. c. 14. reperitur.

Fig. VI. est *canalis longus*, in quo reponitur vel crus vel femur fractum, & luxatum, stuppis replendus; canalem enim toti potius parti quam

quam dimidiz iniicere oportet: Hipp. de officio Medic. Hæc capitula in fundo habet foramen G. quo recipit calcaneum, & ad extremitatem lignum oblongum, quo innititur planta pedis.

Fig. VII. ostendit omnium optimam per instrumenta humeri sub axillam prolapsi restitutionem, quam Fabricius ab Aquaputa describit: Spathæ extremitas inferenda est sub alam humeri luxati, inter costas & caput humeri: reliqua verò tabula per longitudinem brachij interni collocata ligari debet; primum quidem statim sub capite humeri luxati, deinde supra cubitum, postea ad carpum. Hoc facto, æger collocetur supra sedile E. & brachium tabulæ alligatum, trahi seu columnæ (Fig. II. A.) beneficio clauui (Fig. II. C.) adaptetur, ita vt columna sit inter costas & tabulam brachio alligatam (Figur. VII. F.) Sic collocato ægro & columna, Chirurgus (G.) ex vna parte brachium deorsum; ex altera verò minister (H.) cernicem & summum humerum amplexus, ægrum similiter deorsum trahat. Dum enim Chirurgus brachium deorsum trahit, tabula etiam cum brachio ad costas trahitur: vbi verò inferior tabulæ extremitas ad costas adducitur, superior rotunda pars facit motum contrarium, & ita mouet caput luxatum ad partem anteriorem, qua mentione facta facillè postmodum musculi trahunt, aut ipse Chirurgus impulsus faciens, reponit hoc modo caput ossis humeri. Hic tabulæ vtendi modus differt ab eo, quem Paræus lib. 15. c. 27. depingit. Quomodo humerus, per scalam & spatham simul, reponatur, iconem habet Paræus lib. eisd. c. 26. Reliqui modi humerum luxatum restituendi, nempe per sedile Thessalicum, ianuam biforem, trabem transuersam & pistillum, inueniuntur depicti apud Galenum, in Comm. Hipp. de articulis.





T A B V L A XXII.

De machina tractoria Vitruuij, zonula & remora Hildani,
& Scamno Hippocratis.

FIG. I. est machina tractoria cum funiculo, qua vtimur ad extendendas artuum luxationes & fracturas, ex Vitruuij lib. 10. cap. 4. desumpta.

Fig. II. est zonula (qua brachium supra carpum vel cubitum, semur supra genu, & erus supra maleolos ciungitur,) cum duobus hamulis.

Fig. III. est instrumentum remora dictum, quod in luxationibus humeri ad inferiora, alæ subiicitur, vt nodus humeri capiti respondeat & remoram clauus B. firmet. Quamuis hoc instrumentum, quod Guilhel. Fabric. Hild. cent. 5. obs. 86. cum vtendi modo depingit & describit, à recentioribus summo, perè commendetur: humeri tamen luxationes spatia Hippocratis, multò felicius restituntur, si manibus reponi nequeunt; quam remora, & reliquis instrumentis.

Fig. IV. est scamnum Hippocratis, ad luxata & fracta membra restituenda & componenda, maximè idoneum. Paratur lignum A. sex cubitos longum, & duos latum: crassitudine Æ. nouem digitos obtinet transuersos resupinendum. Hoc lignum habet quatuor alia ligna in superioribus partibus rotunda, duo scilicet & iterum duo in vtraque sui extremitate B. Huiusmodi ligna Hippocrates φλῆας vocat, in latitudine foraminibus pertunduntur peruijs, quibus continentur axes C, penetrantes, qui in suis capitibus manubria ductoria D habent, quibus circumuoluuntur. Torum lignum, à medio vsque ad extremum, cavitates obtinet E. quatuor digitos transuersos inter se distantes, quarum latitudo, & altitudo pariter tres digitos transuersos æquat, quibus scalmus seu ptapius F recipitur. Foramina hæc imperuia Hippocrates καπῖτες appellauit. Scamnum hoc præter quatuor φλῆας G. extremas duas alias in medio habet, quæ lignum transuersum H. in supremo foramine continent, ad restituendum semur in posteriorem & exteriorem partem prolapsum: de quo vid. Oribasil. lib. de Machin. c. 37. & 38. scamnum sex pedibus insitit, vt manibus eleuari, & de loco in locum moueri possit. Rotulis scamni, remoræ possunt adaptari, quæ axes extremos contineant immotos. Vsum huius scamni Hippocratici infra Tab. XXV. declarabo, ne tyronibus accadat, quod meo tempore Patanij Medico & Chirurgo alias celeberrimo euenisse scio. Hic, cum ad fracturam cruris extendendam scamno opus haberet, sed mutuo accepto vti nesciret, magna cum sui nominis infamia, modum vtendi scamno erubescens didicit ab eo, qui scamnum, quasi coactus, mutuo dedit.



T A B V L A XXIII.

*De humeri fracti compositione, & luxationum cubiti,
humeri, ac femoris restitutione.*

FIG. I. docet humeri fracti extensionem & compositionem, quam Hippocrat. sect. 6. de fract. text. 9. pulcherrimè describit. Brachij igitur æquissima distantia hæc est. Lignum cubitale A. aut paulo brevius, cuiusmodi sunt ligonum manubria, ab utraque parte sine B. de. ligatum & suspensum esse oportet. Homo autem alto quodam sedili collocatus, manu super incubat, sic ut manubrium sub ala ita statuatur, vix ut ille considerare possit, sed propè suspensus maneat. Tum supposito firmo aliquo & superdato pulvino vno aut C. pluribus ea altitudine, quæ obliquè collocato cubito ad rectum angulū respondeat: præstitit quidem ex corio lato & molli, vel fascia lato super iniecta D. graue aliquod pondus E. quod modicè intendat, suspendere. Aut alius vir sic collocatum cubitum ad cubiti flexuram vi quadam deorsum deducat robustius. Fig. II. Medicus verò erectus, altero pede altiore loco collocato, adgrediatur curationē, & manuum palmis os componat. Quod certè facile fiet, hæc enim extendendi ratio laudabilis est, si quis ea probè utatur. Alij laudant Celsi humerum intendendi modum, quem lib. 8. c. 10. verbis valdè obscuris describit, cuius clatum, & integrum sensum apposuit Foësius commento in supetiora Hippoc. verba, quibus, & ego subscribendum esse censeo.

Fig. II. est restitutio luxationis cubiti ad mentem Hippocratis, Vbi cubitus in anteriorem vel posteriorem partē prolabitur, distentio ita adhibenda est, ut cubitus ad rectum angulum cum humero collocetur. Attollere autem alam oportet fascia F, subiecta, & cubitum super rem aliquam collocare, ac iuxta articulum graue aliquid appendere, Fig. I. aut manibus ministri deorsum urgere, ut in hac Figura. Suspenso autem articulo necesse est prominentioribus palmarum partibus adurgere. Hac figura convenit, dum deligatur, dum suspenditur, & collocatur cubitus. Vbi is in posteriorem partem prolabitur, subito extendere oportet, & prominentioribus palmarum partibus in suam sedem compellere, quod similiter seruandum est, in alijs reponendis. Vbi in anteriorem partem prolabitur, imposito lintheo in pileæ spectem inuoluto flectere simul, & reponere necesse est Tabulæ XXIV. Fig. I. Quod si in alteram partem vergat, cum reponitur, etiam utrumque fieri debet, vid. Tab. XXIV. Fig. I.

Fig. III. ostendit restitutionem humeri sub axillam luxati Hippocraticam. Quamvis enim optimus restituendi modus sit ille, qui

D 3 paulo

Fig I



III



paulò supra Tab. XXI. Figur. VI. fuit commendatus: huic tamen sequens proximè accedit bonitate sua, quem Senex noster his verbis laudare videtur. Quibus igitur humerus frequenter elabitur, ij per se vt plurimum in suam sedem reponere possunt. Immissis enim sub alam alterius manus digitorum nodulis, articulum sursum propellunt, cubiti verò gibbum ad pectus adducunt. Ad hunc quoque modum Medicus in suum locum compellet, si interiore articuli prolapsi parte, sub alam immissis digitis, ipse quidem capite ad summum humerum obfirmato, à costis reducat, genibus verò ad cubiti flexum brachio admotis, ad costas repellat. At qui reponit, manus cum habere robustas conuenit; aut ipse quidem manibus & capite id præster, alius verò quidam *minister* gibberum ad pectus adducat.

Fig. IV. est *repositio femoris luxati*, quam Hippocrates describit vt sequitur. Reponitur autem hoc modo femoris articulus, siue in anteriorem, siue in priorem partem eruperit. Scala desoditur, cui homo insidet integro & sano crure leniter extento, & qua commodè poterit alligato: vitiato verò cruri G. Calathus H. in quem coniecti lapides fuerint, vel vas fictile appenditur aqua plenum, cuius effigies videatur apud Galen. *comm. 4. in Hipp. de ars. text. 1. 4.*

T A B U L A XXIV.



De luxationum cubiti, manus & inguli curatione.

FIG. I. ostendit aliam *restitutionem cubiti luxati* secundum Hipp. sententiam. Expedit autem *fasciam glomeratam*, seu linteam durum implicatum, non magnum, qua parte cubitus cuiuatur, transuersum iniicere, tum repente cubitum flectere, & quantum maximè potest, manum ad humeri caput proripere: hæc enim reponendi ratio ijs, quæ sic in priorem, & posteriorem partem luxata sunt abundè est.

Fig. II. *manus luxata restituitur*. Manus autem vel in anteriorem vel posteriorem partem promouetur, sed maxima ex parte anteriorem. Manifestum indicium, vbi in posteriorem, quod curnari, vbi in anteriorem, quod digiti porrigi non possint. In restituendo collocentur digiti super scamnum vel mensam, & in diuersa à duobus ministris distendantur. Quod extat ex osse, vel prominentiore chirurgi palmæ parte, vel calce simul repellatur, & in anteriorem & posteriorem partem urgeatur: sed ab inferiori iuxta alterum os pila aliqua mollis subijciatur, manui pronæ, vbi à superiori est, supina, vbi ab inferiori.

Fig. III. ostendit *restitutionem inguli*, quam desegibit Galen.

D. 4. comm.



comm. 1. in lib. Hipp. de artic. text. 73. Si ea pars iuguli; quæ cum pectoris osse committitur, vel in latus vel in inferiorem partem prorumpat, tunc ait Hippoc. commodè restitui potest, si homo resupine, tur, subiecto inter scapulas iuxta spinam puluino, seu cervicali, seu tali quopiam, ut hæc via thorax totus recuruetur. Hoc autem expressit vocabulo *πρὶπιδας*, quo Poëta etiam vsurpauit, quam inquit *πρὶπιδας δὲ δισπαιεῖν πατέρεσσι* Ce Homine itaque ita figurato, præcipit, ut Medicus altera manu humeri ad latus deducti caput in exteriorem partem repellat; sic enim deductæ iuguli partes, plurimum inter se recedent, recuruato pectoris habitu multum ad eam rem conferente; altera manu componat, atque in vnum adducardiductas iuguli partes. Humerum verò iuxta latus sursum compelli, interdum satis esse in sequentibus adscribi.

T A B V L A XXV.

De astraguli luxati restitutione, cruris fracti extensione, & spina ad exteriora prolapsa directione.

FIG. I. docet tali seu *astraguli restitutionem*, quam Oribasius lib. de machinamentis cap. 40. describit. Talus modò in interiorem partem procidit, interdum in posteriorem quoque conuertitur, in quas partes ubi venerit æquè (*super scamnum Hippocratis*) resupinare hominem conuenit crure vitiato extento; ac cruri (*statim infra genu*) carchesium laqueum A. æqualiter extendentem circumponere, eiusque capita à posteriori parte ad axem, qui supra caput est, adducere. Tale autem draconem seu sandalium B. iniicere, eiusque capitæ ad inferiorem axem alligare, tumq; membrum vel in diuersa diducere, vel continere, & ab inferiori parte extendere: nervis quantum res postulat diductis conuenienter impellere, ubi in inferiorem vel exteriorem partem eruperit, retrò cogendo: ubi in posteriorem extrahendo, nunc siquidem ob eum habitum impulsus extrahendo aptatur.

Quod si infractura vel tibiæ, vel fibulæ, vel ossis vtriusque simul, crus manibus extendi nequit, collocetur æger super scamnum Hippocratis, ac cruri infra genu carchesium laqueus A. circumponatur, sandalius verò B. supra malleolos alligetur: postea crus laqueis in diuersa diductis extendatur, fracturaque componatur.

Fig. II. *spina dorsi ad exteriora luxata extensionem*, & impulsum monstrat, qui faciliè comparatur, si ex Hipp. scamno Tab. XXII. Fig. IV. adumbrato medix *Φλας* G cum priapisco Fremouentur, & in foramen *τοῦ Φλας* dextræ A lignum aliquod B dimittitur excavatum, quod recipiat spatham C clauo D firmandam, ne excidat.

Hoc

Fig I



II



Hoc facto, collocetur patiens pronus super scamnum: deinde duolacui corpori circumdantur, vnus supra E. alter infra F. gibbum, quorum capita è regione ad axem ferantur, vt spinam circumuoluta æqualiter extendant. Lignum illud, quod spatham recipit, ad minimum tria foramina quadrata habeat, vt ipsis spatha, pro magnitudine gibbi in supremo, medio, vel infimo loco accommodari possit. Vltimo spatha super gibbum coniecta, & magna vi medici depressa, luxatio impellitur. Hic impellendi modus multum differt ab eo quem Oribalius lib. de machin. c. 35. figurâ & verbis nimium obscuris descripsit.

T A B V L A XXVI.

De femoris fracti in diuersa extensione & coaptatione; genu luxati repositione; & totius brachij ac pedis in figura media depositione.


FIG. I. ostendit *fracturam femoris* per habenas extentam. Quum manibus extensio fieri nequit, & scamnum Hippocratis ad manus non est, collocetur æger super scamnum commune supinus, habena alligetur sub axillis, aliaque ponatur in spatio illo, quod interiacet genitalia & anum: alia denique habena alliganda est supra genu, & ralum. Hæ habenæ à ministris robustis attrahantur, superiores sursum, at inferior deorsum, donec medicus fracturam composuerit. In repositione genu luxati, quando manibus extensio fieri nequit, superiores habenæ similiter alligentur, inferior supra malleolos.

Fig. II. & III. ostendit *figuram mediam* membrorum, & musculorum, *brachij & pedis totius*, quæ est necessaria in membri aut fracti aut luxati extensione, coaptatione, deligatione & depositione. Schema autem huius configurationis ideo adpingi curauimus, vt eam, cum infra sæpius indicetur, Chirurgiæ tyrones vno quasi intuitu addiscere, & in praxi imitari possint.

TABVLA
XXVII

Instrumentarii Chirurgici

Fig I



T A B V L A XXVII.

De ossium tibiae & cubiti ad medullam usque corruptione: de tibiae cum vulnere & prominentijs fractura fascijs in circulum adductis obligata: deque manus aut pedis extremi resectione.

FIG. I. ostendit corruptionem ossis usque ad medullam tibiae dextrae Domini Augustini Merken, quam sequenti modo curavi. Primo de trium digitorum transuersorum spatio infra patellam, ubi scilicet terminatur musculus rectus, tibiam extendens, crus secundum longitudinem, usque ad inferius tibiae caput scalpello recto (Tab. II. Fig. II. delineato) incidi, os calloso & mobili substantia obductum inueni, & vulnus medicamentis sanguinem sistentibus obligavi. Secundo, subsistente sanguine, callum seu cartilagine, quae ossi tibiae supercreuit, modiolis (Tab. III. Fig. III. IV. & V. depictis) perforavi tribus in locis, statimque trium foraminum interstitia forcipis (Tab. XX. Fig. II. descriptae) opera intercidi, & os tibiae cariosum & integre putrefactum inueni, quod à genu usque ad inferius caput à sano separatum, volsella extraxi, deinde crus fascijs tredecim in crucem deligatum, in capsulam seu canalem stuppa repletum reposui, veluti Fig. X. huius Tabulae ostendit. Paravi autem fascias tredecim, longitudine quidem diversas (*tenuior enim & inferior cruris pars breviores, crassior vero longiores exposcit fascias*) sed tres digitos transuersos latus, quas capsulae cruri supponenda apposui, ita ut cuiuslibet inferioris fasciae portio medietate, quasi superioris cōtegat. Hoc facto crus obligandum in capsulam fascijs coopertam reposui, deinde infimae fasciae extremitates sursum versus in crucē flexi, postea capita fasciarum, quae proximè infima est, & sic deinceps, donec ascendendo ad supremam devenirem, cuius extremitates nodo gemino adduxi. vid. Tab. XXIX. Fig. X. Huiusmodi fascijs opus habemus, quando pars affecta crebream requirit inspectionem, & ab humorum incursu defensionem.

Fig. II. monstrat tibiae integre putrefactam & cariosam, sicut erat post excisionem calli, quo contegebatur.

Fig. III. exhibet locum, in quo situm habuit os corruptum, & volsella iam extractum: monstrat insuper foramen, in quo videtur caput fibulae magis corruptum, quam tibia, quod modiolis excidi.

Fig. IV. est os illud tibiae corruptum, quod patiens memoriae causa repositum.

Fig. V. ostendit in tibia modò curata aliam fracturam, de qua infra integram historiam annotavi.

Fig.

Fig. VI. est dexteri cubiti os corruptum, ac veluti (præcedens tibia) cartilagine quadam obductum. Hinc cutim externi cubiti, à carpo vsque ad humerum similiter scalpello incidi, vulnusque impositis stegnoticis dilataui. Altero die, callum seu cartilaginem bis tepano Aquapend. perforaui, interstitia foraminum forcipe Tab. XX. Fig. II. excidi, & os subiectum detexi.

Fig. VII. ostendit os cubiti omnino corruptum & asperum, quod etiam volsella, sed frustulacim, detraxi, sine omni dolore & strepitu.

Fig. VIII. indicat locum (in quo reponebatur os cubiti corruptum, & modò detractum) quem natura callo repleuit, ita vt æger operationes rusticanas absq; impedimento exequi posset. Æger fuit rusticus Pappalauientis, cui anno 1650. miles quidam cubitum quatuor in locis sine vulnere fregit. Hæc cubiti fractura, per me & Nicolaum Meuten, quantum fieri potuit, fuit composita, nostroque etiam iudicio benè curata. Sed nobis nihil mali cogitantibus, cubitus de nouo intumescit, vehementer dolet, tandem exulceratur parum, cum totius corporis consumptione, ita vt de ossis toties fracti corruptione suspicari cœperimus, quam etiam post sectionem cutis, & calli cum modiolis incisionem, inuenimus, fascijs decussatis demum cubitum obligauimus, & remedijs, quæ Domino Augustino Merken fuerunt adhibita, curauimus.

Fig. IX. est fractura tibia cum vulnere & denudatione ossis adeò, vt eius extremitates extra cutim proruperint, quæ si longæ sunt, sola extensione ob doloris, conuulsionis, & inflammationis, quæ imminet, metum, reponi nec possunt nec debent, sed vel immisso (si fieri potest) inter extremitates ossis instrumento, quod scalprum sua figura incisorium refert, dum crus sine violentia extenditur, compellantur; vel si prominentiarum aliqua ita promineat, vt neque per scalprum incisorium A. reponi possit, sed potius vicina corpora dilaceret, doloremque inferat, iuxta Hippocratem tertio de fracturis, (Tab. XX. Fig. I.) abscindatur, & fracta postmodum ossa in locum compellatur. Cum extantia refecatur, ita vt os breuius fiat, prædicendum voluit ægro, crus vel alias partes fractas futuras esse breuiore: quæ prædictio ex Galeno & Hipp. vera est, quando semur vel humerus fractus particulam ossis amiserit: cum verò tibiæ vel cubito (ossibus socijs nihil patientibus) portio quædam abscinditur, breuitas membri semper timenda non est: os enim sanum membrum conseruat distentum, donec natura defectum portionis abscissæ callo quodam compensarit.

Fig. X. est tibiæ os cum vulnere & prominentijs fractum, fascijs non in crucem, sed in circulum adductis obligatum, & intra caplu.

capsulam debite repositum. Ligatura hæc ascialis, quæ Hippocrati describitur, infra in curatione fracturæ cum vulnere clarissimis verbis explicabitur.

Fig. XI. est *manus*, *cancro occulto affecta*, quæ abscinditur in parte sana, ad capita scilicet radij & cubiti. Inciditur autem substantia carnosa scalpello falcato B. vsque ad ossa, quæ postmodum unico ferræ C. acutissimæ ductu refecantur. Nota, quod supra incisionis locum fascia cubitus non ligatur, vt sanguis infectus ex vasis effluat, ne retentus cubitum distendat.

Fig. XII. est *manus sphacelo tentata*, quæ in defectu ferræ super lignum D. posita, in radij & cubiti capitibus sanis scalpro E. contra Hildan. bono cum successu amputatur: cubitus supra carpum fascia stringitur, non solum vt sensus minuat, verum etiam vt arteriæ, post amputationem partis demortuæ, constringi queant, citra magnam sanguinis profusionem.

Fig. XIII. est *pelvis oxycetato repleta*, cui innata vesica, quæ madefacta parti mutilatæ adhibenda.


Fig. XIV. sunt duæ *fasciæ glomeratæ* F. & G. quarum quælibet duobus donata est capitibus ad obligandum brachium, cui manus extrema fuit abscissa.

Fig. XV. notat *pedem sphacelo corruptum*, qui in parte mortua (iuxta Hieron. Fabricium ab Aquapendente, lib. i. *pentateuch. cap. 19. & lib. oper. chirurg. titul. de sphaceli chirurgia*) propè sanam forcipe Tab. XX. Fig. I. aufertur. Remota parte mortua, putredinis reliquum ferramentis candentibus (Tab. XXVIII. Fig. IV.) absumitur, donec patiens vim ignis percipiat. Postea plagulæ H. vnguento Ægyptiaco Hildani illinuntur, quæ escharæ applicantur. Splenijs tandem superpositis I. pes mutilatus fasciâ K. madidâ ad genu vsque obligatur, veluti manus (Tab. XXVIII. Fig. II. & III.) vsque ad medium cubitum.

Fig. XVI. sunt *ferramenta varia* (Tab. XIX.) & ignita, tam ad putridæ partis reliquias absumendas, quam ad sanguinis fluxum sistendum, idonea.

Fig. XVII. sunt *vascula duo medicamentis repellentibus*, vino nimirum rubro, albumine oui, & oleo rosarum repleta, quibus fasciæ (siue in sano siue in mortuo pars amputetur loco) imbuantur, ad prohibendam inflammationem.

TABVLA XXVIII



T A B V L A XXVIII.

*De ratione deligandi membra mutilata, & cum vulnere fracta;
canali pedis, & generali luxationum atque
fracturarum curatione.*

FIG. I. docet *Deligationem cubitorum post abscissionem manus*, seu quomodo fascia (F. Fig. XIV. Tab. XXVII.) cubitas (Fig. XI. & XII. Tab. XXVII.) in viuo truncatis adhibeatur. Postquam arteriæ sanguinem fundentes, vel forcipe extractæ, si loque constrictæ, vel ferramentis candentibus ractæ fuerint, vulneri cum plagulis medicamentum stegnoticum, & super has splenia oxycrato expressa applicentur, deinde fasciæ bis vel ter in crucem adductis capitibus, vno vsque ad dimidium cubiti brachium inuoluatur.

Fig. II. monstrat priuò *vesicam* oxycrato madefactam, & priori fasciæ superpositam; secundo alteram fasciam (G. Fig. XIV. Tab. XXVII.) quæ vt prior in crucem sæpius adducta, vno capite ad flexuram capiti ascendat, ad prohibendum humorum affluxum.

Fig. III. est brachium, cui manus extrema fuit resecta, medicamento sub plagulis stegnotico curatum, splenis cruciatim oppositis, primâ fasciâ, vesica oxycrato madefacta, & secunda fasciâ obligatâ. *Hæc deligatio observanda est in quocunque membro mutilato, siue in confinio vini, siue in loco viuo fiat operatio.*

Fig. IV. est *pes* ob sphacelum in parte demortua truncatus, in quo putredinis reliquum ferramentis optimè ignitis, vsquè ad patientis sensum, absumitur.

Fig. VI. est *peluis postea repleta*, qua imbuuntur splenia, fascia prima, & spongia noua Fig. VII. qua irrigatur totum brachium, ad precauendum sanguinis accursum.

Fig. VIII. est fractura dextri femoris cum vulnere in parte syluestri, quam passâ est Catharina Motin, Giengensis, de qua infra singularis reperitur obseuatio, monstrat insuper, quomodo cruri cum vulnere fracto fascia fascialis (Tab. XXVII Fig. X. in circulum adducta & de qua plura dicentur in fracturæ cura) subiiciatur.

Fig. IX. est frustum femoris de vulnere extractum, & dextra sinistraque patre depictum, vt eius caries melius videri ac considerari queat.

Fig. X. est femur fractum fascia fasciali & in crucem adductâ obligatum, canaliculus Tab. XXI. Fig. VI. longo imponendum. Nam si quis canalem femori subiiciat, qui poplite non excedat, is potius lædit, quam prodest. Neque enim corpus, neque tibiâ sine femore moueri prohibebit: quin popliti adhibitus molestiâ afferet, & ad id,

E

quod

quod minimè opus est, impellet. Genu namque flecti minimè opus est. Si quis enim aut femore deumcto, aut tibia, genu inflectat, is vinculorum rationem totam perturbabit, cum necesse erit vt musculi alio atque alio habitu collocentur, & ossa fracta dimoucantur. Imptimis igitur conan lum, vt poples extendatur. Canalis ergo erit vsui, qui à coxa ad pedem suppositus similiter contineat, præcipueque, si ad poplitem cum canali fascia laxa circumjiciatur, velut infantes in cunis fasciari solent. Vbi enim femur in superiorem partem, aut ad latus distorquebitur (*vel per somnum, vel dum ager ad descendendum progreditur, aut ipsi stratum substernitur*) ita cum canali melius continebitur. Canalis igitur à summo ad ianum vsque, ant nullus adhibendus. Cæterum imo calci magna cura adhibenda, vt tum in tibiæ tum in femoris fracturis aptè collocetur. Etenim si pes dependeat, tibia reliqua obfirmata, ossa in anteriore tibiæ parte gibba apparere necesse est, idque eo magis, si hominis calx suapte natura grandior fuerit. Hipp. de fract. femoris. vid. Tab. XXVI Fig. II.

Fig. XI. est brachium mutilatum, in quo arteria instrumento extrahitur, ad ligandum, ne sanguinem fundat.

Fig. XII. est pollex dextræ manus, qui carpo prius fascia compresso; propter sphacelū forcice Tab. XX. Fig. I. in viuo abscinditur.

Guilhelm. Fabricius Hildanus tractatum doctissimum conscripsit de cura gangrænæ & sphaceli, quem tyrones at' erud' legant, sæpiusque magna diligentia perlegant, in quo *præter modum fascia ligandi partes mutilatas, quem in ipsorum gratiam hic apposui* omnia ad refectionem membri necessaria inuenient. Is pluribus quidem probare niti ut rationibus, partem demortuam citò, tutò, & iucundè abscindi non posse, si putredinis aliquid relinquatur ferramenti candentibus absumentum: illæ tamen meo iudicio non euincunt, amputationem membri affecti, iuxta Hieronymum Fabricium ab Aquapendente institutam, nunquam benè succedere; *multò minus* demonstrant, hanc illi, quæ peragitur in viuo, postponendam esse; considerando, amputationem in parte sana institutam, *iucunde fieri non posse*, siue nouacula, siue cauterio cultellati incidantur partes molliores: *neque etiam tuto*, quoniam viua pars fascia constricta facili negotio emoritur, imo sectio etiam in parte sana semper accuratè institui nequit, quin aliquādo partes profundiores altius, quàm exteriores, corruptæ relinquuntur; quod si fiet, vel noua sectio tentanda, quæ esset horribilis, vel reliquæ ferramenti iuxta recentiores comburendæ. *Non cito*, quia maius temporis spatium requiritur, ad extrahenda instrumento arterias, filoque constringendas (*Et si fascia remouetur, nonnunquam tale sanguinis profluvium sequitur, quod nisi vasa cauterijs actualibus tangantur, mortis causa fit*)
quam

quam ad vulnus statim ferris ignitis inurendū: ne dicam, magis protrahi operationem, si post resectionem ab Hildano & veteribus præscriptam, aliquid putredinis remanet. Vnde rationibus & felici experientia fretus, Hier. Fabrici, ab Aquapend. operandi modum, resectioni veterum plerumque præferendum esse statuo.

Quod si vires ægri, ob vapores putridos, & antecedentem sanguinis fluxum, adeò debiles sint, ut certi simus cum in ipsa operatione defecturum; in eo casu abstinendum à sectione, quoniam magis excusabile est, ægrotantem relinquere, quam ipsum scienter occidere. Cum autem nulla spes vitæ sit reliqua, nisi pars abscindatur, quid Chirurgo incumbit? partem demortuam manè & vesperi ferramentis optimè candentibus quotidie tangat, ad imbibendos humores putridos, ne sursum versus repat sphacelus, patienti etiā medicamenta alexipharmaca, quæ vapores à corde depellant spiritusque rescindendo vires instaurent, per os exhibeat, & etiam externæ regionis cordis adhibeat. Viribus parumper refocillaris (pristinæ enim cum certo vitæ periculo expectantur) cum prædictione periculi, operationem petitam aggrediatur, nam satius est viribus ita se habentibus, anceps & miserrimum hoc auxilij genus expetiri, quam nullum. Dum Patavij studio medico operam dedi, Comes quidam Vicentinus ambo cruris dextri ossa in medio fregit, cum profusione sanguinis usque ad syncope, & superueniente sphacelo. Pedem sphacelatum Excell. Pet. de Marchettis, ob virium, ex sanguinis fluxu, debilitatem refecare non luit, sed ferramenti candentibus sæpius adhibitis prohibuit, ut serperet putredo, & medicamenti internis & externis corroboraui, & spiritus, quantum possibile, refecit: Tandem, *in scio patiente*, partem demortuam nouacula circum cum circa incidit, quæ decidenti, reliquum putredinis cauterijs actualibus absumpsit, ad remouendam escharam vnguentum Ægyptiacum simplex adponens. Tertia (post a-scissionem pedis extremi usque ad fracturam) die, patienti conquiescenti de insigni dolore digiti maximi pedis dextri, Chirurgus subridens respondit, se mirari querelam de dolore digiti, qui ante tri-duum fuerit sepultus, quibus æger ita fuit perterritus, ut statim in grauissimum animi deliquium inciderit. Ablata eschara, musculisq;, ut solent, sursum retractis, ossa quatuor digitos transversos prominebant, quæ filamentis aridis & pulueribus quotidie secantibus cooperta, duorum mensium spatio à sanis separabantur. *Ut præcedentes tabulas & proxime sequens, quæ de curatione fracturarum & luxationum tractant, melius intelligantur, curam eorum generalem ex Hieron. Fabricio eiusque Præceptore Fallopio, (hos enim qui habet, omnes habet) paucissimis perstringam.*

Curatio Luxationis Simplicis.

Flt quinque scopis, 1. Extensione, 2. Repositione, 3. Deligatione, 4. Depositione partis luxatæ, & 5. Religatione partis.

Extensio autem facile fieri, si quatuor observantur, primò tempus, secundo organa apta, tertio modus, & quarto extensionis quantitas. *Tempus* ab Hippocrat. de art. 64. proponitur, ut scilicet statim post luxationem fiat, dum pars adhuc caler. Quod si extensio ob absentiam Medici vel Chirurgi statim fieri non possit, facimus id die etiã secunda vel tertia, nisi cogamur ob inflammationem, quæ prius super venit, desistere; in quarta verò propter exacerbationes nihil tentandū: observatum enim, quod, si tentetur extensio, restitutio feliciter non succedat, sed eam multa sequantur incommoda. Vnde Fallopius de luxationibus cap. 3. Monco vos, inquit, ut habeatis semper rationem temporis, ad summum non excedentis diem tertium, & si dies tertia esset iam præterita, expectandus est terminus inflammationis, & tempus, usque quo periculum non sit de inflammatione, estque Hippocrat. 4. de artic. § 6. monente, dies septimus, ad quem usque æger, (inedia seu victu porci tenui) extenuandus est. Ergo si primis tribus diebus fieri non possit extensio, expectate usque ad septimam. *Tempus* in quo potestis restituere est prima, secunda & tertia, vel saltem 7. 8. & 9. in decima verò, undecima, duodecima & reliquis, non est tutum, quia tum generatur callus. Sed antequam deveniamus ad extensionem, præparandus est articulus ad indolentiam, & facilitatem restitutionis, calefaciendo, emolliendo, & laxando partes articuli, scilicet musculos, tendines & ligamenta: si enim mollior sunt, facilius trahentur & sine dolore. Calefactio autem & emollicio articuli fit, aut per frictiones, aut per affusionem plurimæ aquæ calidæ, vel & in alijs locis hydrælei, vel decoctionis malvæ, alch. &c. Frictione commodè utimur in locis, ubi aqua non faciliè potest affundi; debet autem fieri manu inuncta materia aliqua oleosa vel pingui, ut oleo communi aut axungia porci minimè salira. Spigelius in publicis lectionibus narrabat, ad curationem luxationis taurum posse balneum aquæ dulcis, ut eo nihil sit præstantius.

Organa extensionis sunt manus, vincula & instrumenta; Manus adhibentur, si luxatio sit levis; vincula, si mediocris; instrumenta, si magna. Manus ergo sint vel Medici, vel ministrorum, prout extensione opus est levi, vel paululum maiore: vincula verò, ubi requiruntur, ob contactum musculorum maiorem, extensio validior, in quibus observanda 1. figura, quomodo scilicet obvolvenda, de qua (quoniam verbis exprimi non potest) videatur Oribas. liber de laqueis:

queis: 1. materia, quæ sit valida, mollis & tractabilis. Talis est corium ceruinum, molle & præparatum, ex quo conficiuntur thoraces. Inunguntur deinde vnguento pomato, vt tractabiles fiant. Nonnulli vtuntur, in defectu corij, linteis parum detritis: 3. vbi iniicienda; in loco nimirum remotiore articuli luxati, ne muscoli constringantur, aut in validiore extensione dilacerentur. Vbi infra luxationem duo sunt adhuc articuli; Hippocrates vtrique articulo adhibet vinculum, vid. Tab. XXVI. Fig. I. Instrumenta mechanica, quæ præcipuè necessaria sunt in antiquatis, vel primis tribus diebus non repositis luxationibus, sunt 1. scala (Tabul. XXI. Fig. III.) 2. Glossocomum seu Ambf Hippocrat. (Tab. XXI. Fig. I.) & 3. scamnum Hippocraticum (Tab. XXII. Fig. IV.) dictum.

Modum extensionis indicat Hippocrat. 1. de fract. 1. dum dicit, quod Medicus luxationum & fracturarum extensiones (quæ per tractionem in diuersas fiunt partes) quàm rectissimas facere debet. Oportet igitur seruare rectitudinem, tum ratione ossium, tum ligamentorum & musculorum, propter fibras. Nam seruata harum partium rectitudine, extensio sine dolore & difficultate succeder.

Quantitatem extensionis optimè sciet Medicus, quando non ignorat, ex quo loco exciderit, per quam viam egressum, & ad quem locum sit progressum, in quo quiescat. Extensionem propè factam animi deliquium ægri vel adstantium non impediat.

Reponitur os in suum locum manibus, vel Medici vel Ministri modicè iunctis cerato aliquo molli, vel oleo rosarum. Fit autem repositio vel per circumgyrationem, vel per impulsum in oppositam partem illi, ad quam prolapsum est. Hi motus non semper necessarii, nam interdum, vbi extensio facta, si muscoli prius contracti tantum remittantur, facillè sua sponte articulus in locum naturalem redit.

Signa autem benè repositi membri sunt, *Primo* figura membri naturalis, quando nulla cavitates, nullusque circa articulum tumor apparet, quemadmodum ante restitutionem, sed in omnibus similibus sanæ parti, aut parum admodum abest, propter influxos humores. *Secundò* doloris remissio, quæ signum est inseparabile, semper enim dolore sedato, signum est restitutum esse os, non autem contra sequitur, restitutum est os, ergo dolor cessat: potest enim interdum dolor remanere, quod prius valdè læsi sint muscoli. *Tertiò* iuxta nonnullos strepitus, quæ sentitur ab ægris & adstantibus, dum os in cavitatem suam redit, sed signum hoc fallax est, & nunquam exoptandum, siquidem strepitus iste interdum fit, cum extenduntur articuli, & ligam. trahuntur; sæpè etiam strepitus fit,

h. i. cum

cum oculis supercilia rumpuntur, ex collisione mutua ossium, quam sequitur motus difficilis.

In *deligatione* prima & reliquis observanda sunt duo (figura scilicet partis affectæ, & deligatura ipsa,) quæ conseruabunt articulum in suo sinu, & imminuent inflammationem prohibebunt.

In *figura* oportet observare figurationem articuli, non solum restitui, sed etiam totius membri, nam sicut figuræ quædam naturales & indolentes: ita quædam nonnaturales & dolentes sunt: Figura indolens brachij est flexa, sicuti pedis in rectum extensa Tab. XXVI. Fig. II. & III. *sed notandum, quod dicta figura articulo vel toti membro ante deligaturam tribuenda est, ne scilicet fasciæ vel laxentur, vel nimis confringantur.*

Deligatura, sic fascijs lineis, quia melius constringunt, quam illæ quæ ex lana conficiuntur, mollibus, ne dolores inferant; æqualibus, ut æqualiter ubique constringant; & mundis, ut ex colore cognoscantur humores, qui ex articulo residunt. Latitudo fasciarum secundum partes deligans variat: partes enim crassiores, requirunt fascias latiores, tenuiores vero angustiores. In crassis (scilicet femore & genu) sint quatuor, in tenuioribus (ut tibia, humero, cubito & manu) trium, in tenuissimis (ut digitis) duorum saltem latæ digitorum transversorum ægrotantis. Fasciæ distinguuntur à Galeo in interiores, quæ sub splenijs ligant articulum, & dicuntur subligamina: Ex in exteriores, quæ splenijs imponuntur: Hippocrates vitur duabus interioribus, eisdemque exterioribus: *quævis interdum una sufficiat fasciæ, quando scilicet articulus non est facilis ad prolapsum.*

Longitudo fasciarum ob varietatem partium deligandarum varia est: in cubito longitudo fasciarum debet esse trium cubitorum (per cubitum intelligo spatium ab apice digiti mediæ, usque ad articulum cubiti) ægrotantis: in cruribus quatuor: in humero novem: in femore duodecim: & in digitis minus duorum digitorum. Fasciæ præter constrictionem etiam inflammationem atteant, ex mistura vini austeri, & oleo rosatum madefiant, quoniam sicce multo tempore inter se non cohærent. Alij fascijs moderatè oblinunt, felici successu, cerato Hipp. humido, quod describit Galen. l. 6. de compos. med. per. gen. c. 4. dicitur ceratum à cera, quam recipit, & humidum, quia ob oleum est molle. Propottio autem ceræ & olei est, ut sumatur una pars ceræ, & duæ olei y. gr. 3j. ceræ albæ, & 3ij. olei rosacei. Vitanda sunt hic illa medicamenta, quæ sunt ex pulveribus adstringentibus, & albumine oui, quoniam articulum vel nimis refrigerant & exsiccant, ut flexura impediatur, vel humoribus influxis excludunt exitum. Deligatio laxati articuli communis est fracturis, quo pacto autem facien-

facienda sit, infra docebitur, in curatione fracturæ simplicis, & Tabul. XXIX.

*Depositi*o membri est triplex. Alligatio, suspensio, & collocatio. *Alligatio*, cum iuxta Paulum thoraci alligatur brachium in luxatione & fractura humeri aut cubiti. *Suspensio*, si suspenditur brachium de collo apposta vitta. *Collocatio*, quando collocamus membrum affectum supra aliquam partem corporis, ut brachium supra thoracem, vel supra stragulum aliquod capsulæ inditum. Alligatione & suspensione utimur in partibus superioribus, colloca- tione vero in inferioribus. Depositiō autem debet esse in figura partis mediæ, mollis (vnde canalis stipula repletur, ne æger molestiam pariat) æqualis (maximum enim incommodum ex parua inæqualitate oriri potest) & sursum vergens, ne fluant humores ad partem affectam, & inflammationem efficiant, Tab. XXVI. Fig. II. & III. *Post bonam* deligationem, & membri depositionem requiritur etiam quies, ita ut Antiquiores in luxatione & fractura femoris perforarent lectum & stragula, ut ægri per illud foramen excernant, ne moveri cogantur.

Religatio indicatur 1. si membrum non rectè fuerit deligatum, quod apparet, si nimis arctè constringitur, vnde in extremis membri luxati partibus exoritur tumor durus; vel nimis laxè, quod indicatur, cum neque bonus, neque malus, id est, neque moderatus, neque magnus aut durus, apparet tumor. 2. si pruritus aut dolor adsit. Pruritus ille fit vel à rebus secundum naturam ut temperamento calidiorè, vel à rebus præter naturam. Solutis dictis ob causam fasciis, affundatur membro aqua tepida pura, non solum ut mitigetur ille pruritus & discutiatur humor serosus, qui remansit impressus ex ligatura, verum etiam ut roborentur ligamenta, dum aqua siccat humiditates col- lectas. Nisi ergo deligatio sit malè facta, nec pruritus infestet, solutio protrahatur usque ad septimum diem. Si autem nimis arctè, secundo; si nimis laxè, tertio, ob pruritum verò tertio vel quarto ad summum die ligaturam dissolvere oportet. Septima die, quæ est terminus transactæ inflammationis, deligatio iterum solvatur, & affundatur aqua tepida (*non nimis calida, qua ligamenta laxaret.*) sed non amplius fasciæ supra dicto liquore madefaciendæ, nec cerato rosaceo oblinendæ, quoniam inflammationi iam satisfactum est, sed septima dies indicat corroborationem, & consolidationem articuli, & idèò medi- camento opus est siccante valdè & adstringente. Si tamen septimo die adhuc suspicio esset inflammationis, tunc usque ad undecimam diem protrahatur roborantium medicamentorum oppositiō. Ta- lia sunt 1. Medicamentum catagmaticum Moschionis, cuius descri- ptionem habet Galen. l. 3. de comp. med. sec. gener. c. 9. 2. ceratum

diapalmæ. 3. ceratum Barbarum, quod optimum est hyemis tempo-
re. 4. emplastrum catagmaticum Renodæi. Hæc medicamenta ante-
quam apponantur, emolliantur vel cerato rosarum humido, vel myr-
tino, pro molli frictione partis affectæ. Facta molli frictione, articu-
lus leniter mouendus ad hanc aut illam partem, vt humor in articu-
lo genitus exprimatur sine dolore: Medicamenta (non dissoluta) post-
modum super linteam extensa apponantur, & deligatio prioribus
paulò arctior sit oportet. Post hanc deligationem membrum solu-
endum non est, vsque ad finem curationis. Vt cognoscatur tempus, quo
sanantur luxationes, sciendum est, quod tres dentur gradus articulo-
rum; alij enim sunt parui, & ad restitutionem faciles: quidam medio-
cres & maioris momenti: nonnulli magni & ad restitutionem diffi-
ciles. Primorum (*articulorum digiti cuiusvis*) curæ terminus est dies
decimus quartus; secundorum (*articulorum ossium pedis & manus
extrema*) vigesimus; Tertiorum (*reliquorum*) quadragesimus. Arti-
culi ergo digitorum inter quatuordecim dies glutinantur, & pro-
pterea in luxatione talium articulorum à septima vel nona die, vs-
que ad decimum quartum non oportet vnquam fascias soluere: in
reliquis expectandus est terminus sanationis, nisi aut pruritus, aut
vltusecula, aut humor inter caput articuli & sinum collectus, laxa-
rum fasciarum solutionem indicent, tertio quoque die repetendam.
Hoc modo procedendum, donec membrum satis videatur robu-
stum: quo tempore soluenda est ligatura, & pars luxata decocto fo-
uenda, quod eam roboret. R. Flor. Chamomil. ros. rubr. auth. stæchad.
Fol. salu. beton. salic. chamæd. iux arthet centaur. min. absynth. ana
mß. vini rubr. mediocriter ansteri ꝑ. vj. lixiu. dulc. Barbitonforum
lib. iij. bulliant ad consumptionem quartæ partis: postea, appposito
cerato, per aliquot dies absque deligatione in media Tabul. XXVI.
Fig. II. & III. membrum restitutum est conseruandum; dein ægro-
tanti præciendum, vt operationes consuetas moderatè exercere
incipiat.

*Curatio Luxationis cum inflammatione, ante vel post
restitutionem exorta.*

SI inflammatio vrgeat ante repositionem, aderunt duæ iudica-
tiones, altera luxationis, & altera inflammationis, sed quia ma-
gis vrget inflammatio, illi prius est incumbendum, nam si prius
tentaretur restitutio articuli luxati, fieret conuulsio, vel gangræna
partis, quam sequitur sphacelus: Omittenda igitur in hoc casu re-
stitutio artienli, & ponenda pars in medio, minimèque doloroso
sit. Tab. XXVI. Figur. II. & III. Vniuersalibus præmissis, rebus

non

non naturalibus benè dispositis, & aluo laxà clysteribus conseruata patti affectu apponatur lana succida, & continuò super affundatur hydzæleum calidum, quod recipit copiosam aquam calidam, & copiosum oleum rosatum. Aqua calida enim discutiet humores, laxabit partes, doloremque sedabit: Oleum rosatum mitigabit dolorem, & repellendo impediet inflammationis augmentum. Lanà succidà etiam mitigabitur dolor, & prohibebitur inflammatio, sed quia dum cessat inflammatio, humores collecti paulum incrassantur, ideò sub finem inflammationis debemus membrum leniter fricare manibus inunctis oleo amygdal. dulcium, vel communi, deinde impo-
nere malagma vel Nili vel Nilei, *qua Galen. l. 8. de comp. med. sec. loc. cap. 5. describit*, & præstantissima sunt in declinatione inflammationis, propter ceram, ammoniacum, oleum, crocum & acetum, quibus ad emolliendum, euocandum, & discutendum nihil est præstantius: sed cum hæc non vbique habeantur in officinis, adhibeatur Emplastrum oxycroceum Nicolai, quod pariter emollit, discutit, & ex alto trahit, quare optimo euentu potest substitui. superata inflammatione, extendatur, reponatur, deligetur, & deponatur membrum, eo modo, quem in luxatione simplici didicimus.

Si inflammatio post repositionem succedat, quod crebro fit, tùm ratione extensionis violentæ, tùm doloris perpetui, instituendus est victus tenuis, secanda est vena, & purgatio instituenda, statimq; dissoluenda est deligatio (*etiam si fit in prima vel secunda die*) & similiter hydzæleum tepidissimum affundendum, donec æger ex hoc inuamen aliquod percipiat. Postea deligetur membrum laxius paucioribus fasciis hydzæleo imbutis. Hoc singulis diebus faciendum est, vsque ad inflammationis declinationem, quæ sit die vt plurimum quinta; declinante inflammatione, apponenda sunt vel malagmata dicta, vel oxycroceum Nicolai, pro resoluendis inflammationis reli-
quijs cum ligatura adhuc laxiore. Ablata verò inflammatione, obseruetur curandi modus in simplici luxatione dictus.

*Curatio luxationis cum vulnere, & osse, vel tantum
detecto, vel parum etiam prominente
extra cutim.*

SI articulus luxetur, ita vt sit vel detectus, vel extra pellem parum protrusus, affectus est lethalis, & maioris periculi, si restitatur, quàm si non restitatur. Si enim non restitatur, superueniet inflammatio, conuulsio, & interdum mors. 1. aderit turpitudine ipsius membri. 2. vlcus insanabile, quod si fortè cicatrice aliqua obducatur, ob mollitiem faciliè etiam soluitur. Si verò reponatur, maxi-
mum

num adducit conuulsionis, gangrenæ & mortis periculum. Se i non nulli huiusmodi pericula timent solūmodo in articulis magnis (carpo videlicet, cubito, humero, talo, genu & femore, quæ ob tendinum robur, ligamentorum & vasorum magnitudinem, restitutionem prohibent, nisi eam æger & aditantes, audita prædictione periculi, urgeant, quam Medicus die vel primo, vel secundo, vel octauo, vel nono tentare debet, ne artem Medicam ignorare videatur) non autem in articulis minoribus, digitorum nempe pedis, & manus extremæ, quos Celsus cum prædictione periculi pariter reponit, rationem habens primò inflammationis & conuulsionis, deinde vulneris & luxationis. Vbi ergo articulus maior reponi nequit, primum habenda est ratio vniuersalium & victus, membrumque sine omni extensione & deligatione, in media figura, vel de collo suspendatur, vel in capsulam leniter collocetur, vt immobile maneat, & dolorem non sentiat. Impedienda quoque inflammatio & conuulsio imminens, medicamento dolorem mitigante, concoquente, refrigerante & repellente, quale est, ex mente Hip. 4. de art. 6 Ceratum picarum, quod super splenium, vino austero, nigro, ac tepido expressum extenditur, & tepidè articulo imponitur.

Curatio Conuulsionis, post articuli restitutionem suborta.

SI, osse restituto, superuenit conuulsio, statim articulus iterum luxandus, copiosaque aqua, vel oleo tepido, oprime ac diu ablues. Calefaciendum quoque totum corpus, ita vt sudor exciterur, & omnes articuli calefiant, quoniam inter se omnes consentiunt: Inungenda sunt præterea nervorum principia, mucha scilicet, spina dorsi, inguina & axillæ, oleis & vnguentis, ad conuulsionem facientibus.

Curatio luxationis cum callo, qui impedit restitutionem, & motum articuli.

IN articulis, ante vel post restitutionem, malè tractatis, facilè crescit callus, præcipuè verò in ijs, qui non multa carne sunt circumvallati, vt cubitus, genu & pes: reliqui articuli quandoque, sed non ita facile patiuntur callum, quoniam carnosiores sunt, & humorem sanguineum, qui pro alimento & faciliòri articulorum motu illabitur, facilè discutiunt. Callus autem vel est durus, vt lapidis naturam acquirat, vel non ita durus, vt lapidosus. Signa calli lapidosi sunt quatuor, 1. articulus gracillimus, & siccissimus conficitur. 2. articulus

culus ab ægro moueri non potest, neque etiam violenta manu Medici 3. extenuatio & gracilitas membri est diuturna. 4. adhibita fuerunt medicamenta uim refrigerantia, vehementer adstringentia & exsiccantia, quibus humor supradictus in lapidosam abiit materiam. Signa lapidis simpliciter duri sunt item quatuor. 1. Si recens est affectus, dum enim antiquatur, fit lapidosus. 2. Quamuis membrum ab ægro moueri nequeat, potest tamen à Medico. 3. si medicamenta idonea articulo fuerint apposita. 4. aderit tumor aliquis in parte quidem durus, non tamen osseus.

Callus lapidosus curationem Celsi sine periculo non admittit, quare ita relinquendus. Curatio uero calli mollis, seu minus duri, talis est: Primo euacuetur corpus purgatione & venæ sectione. 2. instituantur bona victus cæterarumque rerum non naturalium regula. 3. emolliatur pars oleo, vel sequenti medicamento.

℞. Radic. alth. ℥iij.
Cutum. asinin. ℥ij.
Fol. Malu. ℥ij.
Bisualmu. ana. mij.
Semin. lini.
fœnugr.
Caricar. ping. ana. ℥iij.
Capit. veruec. no. j.

Coq. in l. q. aq. simpl. donec caro capitis ab ossibus separatur, cuius vapore per aliquot dies articulus callosus foueatur, forum excipiant frictiones per tertiam horæ partem durantes, manibus inunctis ex oleo amygd. dulc. & pinguedine auferina recenti mixtis, Facta frictione imponatur Malagma Nilei, supra allegati, vel oxycroceum Nicolai, pinguedine auferina malaxatum: Post tres vel quatuor dies pro emolliatione & discussione calli, laudatur fumus aceti. Vnde Galenus accepit lapidem pyritem, (vel in huius defectu molarem) quem ignitum facit, postea aceto perfundit, in quo macerata sit portio quædam gummi Ammoniacy, ut vapor inde sublatus, & per 3. horæ partem susceptus, non solum attenuet callum, sed etiam emolliat: attenuatione facta, cataplasma imponendum est vel sequens, vel fortius. ℞. Furfurum hordei & oxym. simpl. ana. q. s. pro form. cataplasmaris. Notandum, ut æger (si articulus est restitutus) inter usum emollientium & discutientium, articulum, quantum possibile, moueat, quo motu callus digeritur. Si articulus nondum restitutus, & callus oboritur, hic prius curetur, dein articulus reponatur: ut in luxatione simpliciter dictum.

CURATIO

Curatio luxationis articuli, qui de sua sede, post restitutionem, spontè recidit.

Articulus recidit tribus de causis. 1. quando post violentam luxationem malè reponitur articulus, & ligamenta non benè exsiccantur. 2. quando tumor aliquis, ex inflammatione circa articulum oborta & malè curata, prohibet, ne articulus in sua sede possit contineri. 3. cum humor ad articulum fluit, qui ligamenta laxat. Prima causa maiora exsiccantia requirit: Secunda verò emollientia & discutientia indicat, de quibus supra: Tertia omnium est pessima, quæ (post expurgationem corporis per pharmaca, venæ sectionem & bonam victus rationem) postulat adustionem, quâ nihil est præstantius. Nam hæc absumet primò humiditates illas per crustam, quæ cauum facit vicusculum, quod cicatrice obductum partem relaxatam contrahit: per inustionem enim calefacimus, siccamus & humores digerimus. Sed animaduertendum est, 1. vt vratur locus, ad quem cadit os, vt si humerus sub alam cadat, sub axilla vstio fieri debet; si caput femoris ad anteriorem partem luxetur, anteriora pluribus in locis vrenda. 2. ne vrantur partes neruosæ, ligamenta, venæ, arteriæ & glandulæ, quibus ignis est inimicus, exoritur enim, ob siccitatem, conuulsio incurabilis. 3. vt vstio fiat ferramentis, quæ non magnas faciat escharas, vnde eligantur ferramenta parua, oliuaria, acuminata, & optimè ignita. 4. vt post inustionem articulus quiescat per multos dies, si enim iterum luxetur, affectus erit immedicabilis.

Curatio Elongationis articuli.

In articuli elongatione ligamenta laxiora debent constringi medicamentis non frigidis (hæc enim articulum rigidum & ad motum ineptum reddent) sed calidis. Cum autem non detur simplex, quod vim habeat calefaciendi & simul constringendi, apponendum est compositum, veluti est emplastrum ex pelle arietina. Si autem medicamentis non succedat curatio, vnicum superest remedium; nempe vt cutis externa ex vtraque parte (cauendo tunc partes prædictas) inuratur ferramentis paruis, & optimè ignitis, deinde pars fasciis aptis deligetur.

Curatio Fracturæ Simplicis.

Transuersæ & obliquæ quatuor absoluitur, 1. Repositione, 2. Re-
positi conseruatione, 3. Calli generatione, & 4. Accidentium
fracturæ

fracturæ superuenientium correctione. Repositio duobus expletur, extensione nimirum & conformatione, vel per impulsum, vel per coaptationem.

In *Extensione* etiam considerandum, 1. vbi, 2. tempus, 3. modus, 4. instrumenta, 5. qualitas, & 6. quantitas.

Vbi, extensione opus est, quando ossis fracti partes nondum directæ, iacent, sed vna alteri adhuc superimponitur.

Tempus optimum est; si statim cognita fracturâ instituatur extensio; nam si id non fiat, magnus, ob dolorem vehementem, fit humorum affluxus, & muscoli versus sua principia trahuntur, hinc extensio difficilis euadit, & si instituatur, ossa fracta adjacentes partes carnosas pungunt, & consequuntur conuulsiones, inflammationes, aliaque mala accidentia. Potest tamen ante inflammationem, die scilicet secundo vel tertio, extensio tentari: in quarta & sequentibus (donec timor inflammationis præterijt) extensionem Hippocrates prohibuit. Verum recentiores, vt inflammationem imminuant, dolorem mitigent, & musculos versus sua principia contractos emolliant, aquâ calidâ perfundunt partem fractam. Alij sumunt hydralecum, vel decoctum malux, alth. &c. horumque vapore membrum, per integrum horæ spatium, fouent. Vbi notandum, ab initio huius fomenti, partem affectam quidem intumescere vehementer, sed vbi paululum fomentatio perseuerarit; non modo tumorem vapore excitatum, verum etiam priorem, qui extensionem prohibuit, euanescere. Optimum quoque remedium est pellis recens inactati vituli, vel alterius animalis, adhuc calens circumligata, & per horas aliquot supra membrum fractum detenta; habet enim insiguem vim digerentem, emollientem, & anodynam.

Modus. Membrum fractum in media figura, supra & infra fracturam, instrumentis ad extensionem necessarijs, comprehenditur, & in diuersa, sursum scilicet & deorsum, quam rectissimè trahitur.

Instrumenta, interdum sunt solæ manus duorum ministrorum robustæ, vbi mitius Tab. XXIX. Fig. I. interdum habenæ ex linteo vel corio, vbi valentius Tab. XXVI. Fig. I. interdum machinamenta, vbi vehementissimè extendendum, Tab. XXV. Fig. I.

Qualitas pro varietate & præsertim magnitudine ossium & musculorum variat. Hinc minimam exoptulat extensionem radius; maiorem ossa, quæ in summa manu & summo pede sunt; adhuc maiorem cubitus & fibula; validiorem humerus & tibia, validissimam femur. Præterea in vnoquoque ossè validiorem extensionem tolerat, 1. Corpus molle, quàm durum, 2. primus dies, quàm reliqui, quibus durat timor inflammationis, 3. fractura vetusta, quàm recens.

Quam

Quantitas. Membrium in directum extenditur, vsque quo ossa ponantur è regione inuicem, at se mutuo non constringant.

Conformatio probè fiet, si, dum organa extendentia sensim, & sensim remittuntur, & membrum in media figura conseruatur, partes ossis fracti, quæ è directo nondum exacte iacent, in directum ex amussim ponantur, eorumque eminentiæ in proprias cavitates, citra omnem violentiam, suauiter & blande, manibus chirurgi recondantur. Tab. XXVI. Fig. I. Hæc operatio optimè succedit, quando membrum conformatum sano in figura erit simile, tactu nulla sentietur inæqualitas, & dolor vehemens sedabitur, vel mitescet.

Conseruatio fracturæ, iam coaptatæ, continet deligationem, & inflammationis, per topica, prohibitionem. Deligatio fit fascijs, splenijs, & ferulis.

Fascia Tab. XXIX. E. F. G. autem parantur ex linteis vetustis, alijsque visibus ex parte attritis, vt sint tractabiliores, validis ramen, ne extentæ lacerentur: nullas confusiones aut extantias habeant, vt æqualiter, ac sine dolore, constringant. *Latitudo* autem fasciarum magnitudine partis innotescit; pars enim crassior latiores, tenuior angustiores requirit.

Longitudo tanta sit, quanta requiritur, vt scilicet deligatio, & supra fracturam & infra, comprehendat non parum de parte sana, debitis circumuolutionibus, quæ tot sint, quot requiruntur ad firmitamentum partis fractæ.

Splenia Tab. XXIX. Lit. I. sunt panni linei (antiqui parabant ex stuppa pexa) sæpius complicati, sicque dicuntur, quoniam imitantur splenes brutorum, qui solent esse oblongi & angusti. Alij hos pannos vocant p' a'ulas: veteres appellarunt plumaceolos aut puluillos, quoniam ex plumis, inter duos pannos confutis, parantur. Hæc splenia adeò longa sint, vt totam deligationem comprehendant; breuiora enim omnes fasciæ circumuolutiones non tuerentur: latitudo autem ipsorum sit triū aut quatuor digitorū, eius qui deligandus est. Quod verò ad crassiciem attinet, sint triplicia & quadruplicia etiā, vbi maiori opus est firmitate: Et cum debeant totam partem circumdare, tot accipienda sunt, quot possunt partem in orbem complecti. Vnde Hipp. lib. de offic. Medic. *Splendorum longitudo, latitudo, crassitudo et multitudo talis esto: Longitudine deligationem aequent, latitudine trium sint aut quatuor digitorum; crassitudine triplicia aut quadruplicia, multitudo, vt in orbem conuoluta, neque plura sint, neque pauciora.* Et Galen. in comm. huius loci: in hoc, quem nunc de fracturis Hippocrates instituit, sermo e primum plagulas commemorat, splenia quoque à splenis similitudine, quem imitantur, appellata: quæ præcipit longitudine æquare deligationem, vt potè quæ

in eius gratiam adhibeantur, videlicet, vt eam firmam & immotam seruent. Latitudinem verò habere trium aut quatuor digitorum hominis, nempe deligandi. Crassitudo ea sit, vt triplicia vel quadruplicia sint: Quaduplicia quidem, vbi deligatio maiore eget custodia. Verum vbi minore, triplicia posse satisfacere arbitratur. Eam autem plagularum multitudinem adhiberi consultat, vt in orbem deligatum membrum comprehendant.

Ferula Tab. XXIX. K. sũt assule læues, quæ ossibus fractis & luxatis apponuntur, postquam transierit inflammationis tempus, vt fracturam magis stabiliant, plagulis non admodum dissimiles. Veteres, inter quos primus fuit Hippocrates, parauit ferulas ex ligneo ferulæ fructicis cortice, aut ex ipsis ramis per medium diuisis, vnde & nomẽ habent ferulæ. Est enim hoc lignum aptissimum ad hunc usum, cum & durissimum, vnde antiqui ex eo scipiones parabant, quibus innitebantur. Nos in defectu huius fructicis (quandoquidem in Germania locisq; frigidioribus haberi nequit) optimo cum successu paramus ferulas ex operculo capsularum, quibus vtuntur Pharmacopœi & Mercatores ad Merces recõdendas. Si nec dicta opercula haberi possunt, ferulæ optimè conficiuntur ex vaginis ensium antiquis, quæ quoniam corio obducuntur, sunt duræ, sed simul læues. Hippocrates lib. de offic. Med. text. 9 bonas ferularum condiciones exposuit, dum scribit: *Ferula porro læues, (καὶ λείες) æquales, circa extrema resima sinu oportet, & ab utraque parte deligationis, paulò breuiores, crassissima verò qua parte fractura erupit.* Nō asperas, sed læues vult, vt possint nunc sursum nunc deorsum, nunc in rectum, nunc in obliquum prout opus requirit, trahi: Non disteneas, quæ deligationem, & membrum distortent sed æquales, vt æqualiter cingant. Simas iuxta extremitates, hoc est, ex inferiore extremitate, leuiter derasas, vt magis adstringant in loco fracturæ, quam ad partes sanas, quæ compressæ dolent, deinde inflammantur. Ab utraq; parte deligatione facta breuiorẽ, eadem causa, ne premant partes in extremo sanas, atq; adeo dolorem & inflammationem inferant. Galen. comm. 3. de Chirurg. offic. text. 11. scribit: *Fracturæ vero maximè conducit, vt ferulæ neque asperæ, neque distortæ sint, quippe quod veroque modo comprimât, sed quæ distortæ sunt, id insuper habent, vt deligationem distortqueant, qua distorta, cõfracta etiam pars distortetur.* Consultat præterea, vt illæ eligantur, quæ ab ipsis capitibus sunt simæ, quæ enim eandem semper vsque ad extremum crassitudinem seruant, æqualem ea parte deligationem, cæteris omnibus præstant: quod fieri minimè expedit, cū ipse velit, vt ferulæ in media deligatione magis adstringant, inde verò vsq; ad extremas partes sint magis laxæ, vbi & laxissimæ esse debeat. Vult etiam vt longitudine sint breuiores, quàm sit.

deli-

deligatio, ne cutim ultra deligationem attingant, quæ, ex eo quod humores à vinculis expressos plerumque recipit, tumidior redditur. Vult etiam crassiores esse serulas, vbi fracturæ insident, quod locus is præ cæteris eorum compressione indigeat.

Inflamatio imminens prohibetur, medicamentis anodynis, & repellentibus, parti extrinsecus appositis. Ego felici semper successu vtor medicamento, quod componitur ex vino austero, oleo rosarum, & albumine ouorum spatula agitato, debita proportione mixtis. Si dolor vrget, albuminibus omissis, vino oleum in maiore quantitate immiscere soleo. In hoc medicamento fascias Tabul. XXXIX. E. & F. quæ dicuntur subligamina, imbuo & exprimo Tabul. XXXIX. H. iuxta admonitionem Auicennæ, qui lib. 4. *Fen. 5. tract. 1. c. 5. de curatione dislocationis* præcipit, vt sumus solliciti, ne imponantur calidæ & siccæ. Calidæ enim calefaciunt, & calefaciendo humores attrahunt: siccæ vero non coherent inter se.

Facta igitur extensione, fractura composita, omnibusque ad ligandum necessarijs preparatis, membrum adhuc in diuersa extentum, est *immediate* fascijs sursum & deorsum ductis inuolendum. Initio autem, fasciæ primæ tres circumuolutiones supra fracturam facere oportet, & tantam facere compressionem, quam a sufficiens sit ad firmanda ossa: hinc versus superiorem partem, ad sanam scilicet ducenda est deligatio, paulatim compressionem minuendo Tab. XXXIX. Fig. I.

Vbi satis de sana parte fuerit comprehensum, ibi deligationem terminare oportet. Dein alia fascia (primâ longior, vt ad eum locum peruenire possit, vbi prima desijt) accipienda est, atque vna vel altera circumuolutione (contrario modo, si prior versus dextrâ, hæc versus sinistram) facienda est supra fracturam, atque ex ea versus inferiorem partem, ducenda est deligatio, similiter paulatim compressionem minuendo. Sed circumuolutiones huius fasciæ non sint adeo frequentes, quoniam non adeo timemus ab extremis partibus, & vbi satis de sana parte fuerit comprehensum, finem circumuolutionis ad inferiora facere oportet, Tab. XXXIX. Fig. II. & reliquo fasciæ, rarioribus circumuolutionibus, redire per ipsam fracturam, vsque tandem ventum sit ad finem fasciæ primæ. Quoniam verò hæc duæ fasciæ, iam circumuolutæ, ad fracturam continendam debiliores sunt, splenia circa fracturam, & totum membrum, per eius scilicet longitudinem adhibenda, vt vnum alteri non superponatur, sed inter vnum & alterum vnus digiti transuersi hominis scilicet deligandi, spatium intercedat, quæ firmentur fasciâ tertiâ ex duplici capite, ita vt prima circumuolutio fiat super fracturam, deinde alterum caput ducatur versus superiora crebrioribus circumuolutionibus, rarioribus verò alterum versus inferiora, deinde ab inferioribus sursum, vsque

vsque in eum locum, in quo adhuc alterum caput huius fasciæ, utrūque tamen caput toties circumuoluendum, ut plagularum extremitates utrinque parum promineant, Tabul. XXIX. Fig. III. *Signum* congruæ deligationis erit, quando patiens se firmatum esse refert, non compressum, & magis super partem læsam, quàm super sanas, minimè versus extremitas.

Congruæ deligationi succedit bona membri *Depositis*, quæ est in media figura, mollis, æqualis & sursum vergens. Pars igitur deligata intra capsulam ligneam stappa pexa, & linco inuoluta, repletam deponatur, atque ita vsque in tertium diem relinquatur, si patiens eo, quo deligatus est die, & sequenti nocte, sibi videtur magis compressus, secundo rursus, ad hoc etiã in extrema parte tumor aderit mollis & paruus: maior enim & durus, prauam & nimis arctam indicat ligaturam, & imminens inflammationis, ac gangrenæ periculum, unde æger incauenter soluendus, atque denuo, sed moderatè, deligandus est.

Si tertio, post primam deligationem, die, laxiores videntur fasciæ, resoluantur (animaduertendum autem, ubi soluenda deligatio, antequam ossa sint aliquantulum firmata, circumuolutas spiras non esse paulatim soluendas, sed pars cubet, atque linco & fasciæ secantur, donec, detecta superiori parte, possis omnia detrahere, parte à proprio loco non eleuata, sic enim non est opus, ad soluendam deligationem, partem eleuare, atque suspendere & contrectare, ex quibus nulla potest utilitas aegrotanti contingere, quousque medicamenta adhibenda, membrumque denuo fasciis inuoluendum) parsque pruriens aqua tepida sæpius persudenda, ut fuligines detentæ euaporent: postea membrum ligaturâ, quæ moderatâ paulò arctior sit, constringatur, in capsulamque deponatur vsque in septimum diem, quo fasciæ iterum soluendæ, membrum aqua perfundendum, & deligandum, fasciis adhuc arctius adductis, ita tamen ut vitam & alimentum permittant transire ad membrum extremum. Parti igitur fractæ applicetur ceratum diapalmæ, vel emplastrum catagmaticum Renodæi, aut vni lato linco aut pluribus angustioribus inductum, supra hoc fasciæ vnum caput habentes, vinoque austero expressæ, & supra has plagulæ, prius in vino expressæ, deinde albumine oui subactis imbutæ, denique fascia ex duobus capitibus, eodem vino insuccata.

His ritè peractis, quoniam hoc tempore plerumque cessat inflammationis timor, ad fracturam magis stabiliendam ferulæ (quæ nisi transacta septima, ob inflammationis periculum, rursus non alligantur, ut deligationem conseruent) circumquaq; plagulis in utroque superfasciationis extremo prominentibus, per longitudinem membri, circumcirca vinculis I. maximè laxis apponendæ, hoc ordine, ut primò

F

ligentur

ligentur in superiore parte, secundo in inferiore, tertio verò supra fracturam, ne validior fiat supra fracturam constrictio, & dolor excitetur, Tab. XXIX. Fig. IV. In appositione præterea ferularum cavenda sunt ossa prominentia, & excarnia, namque illis appositæ dolorem inferrent, & exulcerarent: Vnde aut ad altera opponantur, aut sint breviores. Membrum ita deligatum, detineatur immotum in capsula, vsque ad vigesimum, nisi pruritus, excoariatio, dolor, aliaque accidentia, fasciarum resolutionem & convenientem remediorum applicationem, desiderent. Nihilominus tamen Medicus interrim ægrosum, de tertio in tertium diem, visitet, & ferulas laxas leuiter admodum, supra fracturam constringat, id semper præ oculis habens, quod ferula circumponatur, non vt comprimant, sed vt subiectam deligationem tueantur, ac firment.

Cum autem terminus hic præterijt, ferulae, ac fasciae religandæ, & pars affecta, pro generatione aut nutritione calli, aqua calida (donec inrumescat, nec ultra) fouenda, deinde appposito catagmatico, fasciæ & ferulae laxius adstringendæ (vt humores callum generantes & nutriendos concresecant) inque capsulam pars deposita per biduum relinquenda, ad explorandam calli quantitatem & qualitatem demum religenda. Quinto quouis posthac die, fasciæ resoluedæ, & membrum aqua calida persusum, cerato, fascijs, ferulisque laxioribus, tractandum, vsque dum fractura callo mediocri confirmetur, quod in cubiti ossis, in triginta plerumque diebus, in humeri & tibiae quadraginta ferè, in femoris verò quinquaginta fieri solet: *Nihil tamen est perpetuum; nam & natura à natura, & ætate plurimum distat.*

Callus autem generatur ex sanguine, qui ante septimam attrahi non debet, hic Emplastrum oxycroceum primis diebus periculosum ob imminentem vel præsentem inflammationem. Ad calli generationem alij exhibent iuscula, in qua bullierint folia agrimonie, & radices consolidæ maioris. Nonnulli viscidiores cibos præbent. Recentiores, ante 60. annos, inuenerunt lapidem, qui in Palatinatu crescit, & ad calli generationem, ab incolis istius loci, miris commendatur laudibus, vnde ἐσπερίων vocatur: de quo legantur Guilhelm. Fabrit. Hild. centur. 1. obseru. 90. 91. & 92. & Sennertus libr. 5. Inst. part. 2. sect. 1. cap. 7. Extrinsecus tutissime applicatur non modò ceratum Barbarum, & diapalmæ Galeni, verum etiam Emplastrum oxycroceum Nicolai, & catagmaticum Renodæi Barbarum & oxycroceum apponantur hyeme, diapalma tempore æstatis, Emplastrum Renodæi medijs temporibus.

Fracturas quandoque nonnulla sequuntur *symptomata*, vt pote pruri-

pruritus, excoriatio, callus maior vel minor, dolor, gracilitas membri, & distortio, quæ omnia Medici operam requirunt.

Pruritus cessabit, si aqua tepida pars religata foueatur, donec rubescat, & paulo amplius, ut attracta materia iterum digeratur. Quando locus affectus tepidæ affusionem commodè non admittit, aquæ vaporis satis utiliter apponitur. *Sculptura ob pruritus agris prohibenda, eò quod pessima, & præter excoriationem, humores astrahat, & dolores graues excitet.*

Excoriatio, quæ oritur non rarò. quando fasciarum resolutio diutius quam par est protrahitur, deinde quando patientes ex impatentia scalpunt, sanatur affusione tepidæ, ut in pruritus cura dictum, & adhibitione ynguenti de cerussa, quod refrigerat & exsiccat.

Dolor mitigatur fomento hydrelæ, vel decoctionis capitis castrati cum floribus chamomillæ.

Callus iusto maior generatur, quando æger plenior, quàm decet, victu vititur, vel Medicus negligentior est in curatione, si manu eius qualitatem non explorat, & fascias nimis laxè circumuoluit. Præcauetur, si victui detrahatur, qualitas calli aliquoties exploratur, & fasciæ paulo arctius constringuntur. Minuitur primò medicamentis emollientibus, postea emollientibus, & discurrentibus simul (in curatione luxationis cum callo propositis) donec ad mediocritatem veniat. Callus minor habet causas contrarias, unde præseruatur etiam contrarijs. Augeretur crassiore victus ratione, alimenti ad partem affectam attractionem per affusionem aquæ calidæ (ea moderatione, ut dum pars adhuc attollitur, priusquam concidat, desistamus) & fasciarum laxiore ligatura.

Extenuatio partis fit, vel propter fasciarum nimiam stricturam, vel inopiam alimenti viscosi. Si strictura extenuationem efficiat, fasciæ magis remissè ligentur: si alimenti inopia gracilitatis causa est, alimentum attrahatur foris aquæ calidæ, donec rubeat pars, cui deinde emplastrum aliquod picatum, linteo lato inductum apponatur, multotiesque velociter detrahatur, cauendo postmodum strictam fasciarum circumductionem, quæ alimentum attractum iterum repelleret.

Distorsionis membri, vel malæ coformationis ossium est causa, vel medici incuria, dum aut extensionem aut coaptationem, aut deligationem minorem, quam par est, facit; vel ægrotantis vitium, quando membrum fractum ante calli confirmationem mouet, aut ipso innititur; vel fracturæ culpa, quædo præsertim femur rumpitur. Nam ossa femoris, nequæsi diducta per vim extensionis deligaris sic diducta vinculo contineri poterunt, sed cum primo intentio remiserit, inter se conuerrant. Idcirco enim carnes crassæ, ac valida deligatione super-

rant, non ab ea superantur. Hippoc. de fract. Quod confirmare videtur Cellus, dum *lib. 8. c. 10.* de crurum femorumque curatione scribit: neque enim ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur; & Auicenna *lib. 4. Fen. 5.* tradit, raram admodum esse femoris fracti integram curationem. Quorum verbis nos admonent, vt integram curationem femoris nunquam promittamus, sed omnem potius diligentiam adhibitori claudicationem dubiam predicemus, ne ex fracturę natura, aut, quod sæpius contingit, ex agrotantium impatientia superueniens, nostro adscribi errori, & præmij loco famam minuire possit. Fit etiam mala conformatio fracturę culpa, quando frustulum ossis inter ambobus ossa fracta continetur, quod eorum mutuum contactum impediatur. Ossa Medici & agrotantis vitio distorta nunquam rumpantur (nisi aliter fieri nequeat, ob magnam membri in operationibus suis læsionem) si patiens senex, & debilis, callus vetustus, & induratus, & os magnum, quale est femoris & humeri. At si læsio magna, patiens iuuenis & robustus, callus recens, qui sex menses non excesserit, emolliatur callus per quindecim dies, perfusionibus, balneis & emplastris; deinde membrum ab vtraque parte, vel manibus, vel habenis, vel machinis, prout necesse fuerit, in diuersa extendatur, vsque dum callus frangatur, & ossis fracti partes manuum palmis coaptari possint: postea fractura curetur, vt supra dictum. Si ossis frustulum membrum totum distorqueat, scalpello *Tab. II. Fig. II.* sectio fiat vsque ad os fractum, & vossella ossis portio glutinationem impediens, extrahatur, dein fractura per extensionem coaptetur, deligetur, & deponatur, eodem modo quo fractura recens. In dicta femoris distortionem os minimè rumpendum, magis enim conducibile est viuere cum claudicatione, quàm periculolam operationem, non sine torminibus & recidiuæ metu sustinere. Femoris autem distortio præcauetur, si membrum in, ante, & post deligationem instrumento glosiocomo *Tab. XXI. Fig. IV.* quod huic vsui secundatio destinatum est, conseruetur extensum, vsque ad perfectam fracturę confirmationem,

Curatio Fracturæ asseralis.

IN fractura asserali, seu per longitudinem ossis facta, fasciæ arctius stringendę sunt, quam in reliquis, vt ossa fracta, quę per latitudinem à se inuicem recesserunt, ad mutuum contactum & actum ducantur, & recidere nequeant, Galen. *l. 6. m. c. 5.* Cæterum ea omnia agenda, quę in curatione fracturę transuersę & obliquę dicta sunt.

Atque ista quidem de fracturarum curatione simplicium, in quibus neque ossa eminent, neque aliqui vulnus accessit, sufficiant; punctum

nunc patissima tradam, quomodo fractura cum vulnere curanda sit. Fracturarum cum vulnere varix sunt species, vel enim os à perioestio & carne denudatum est, vel ipsi adhuc tectum: in utraque iterum vel ossis portionem aut parvam aut magnam expectamus abscessuram, vel nullam.

Fractura cum vulnere simplici.

IN quà nec os à suis tegumentis denudatum est, neque aliqua ossis portio abscessura, curatur ut fractura sine vulnere, nimirum 1. congrua extensione, 2. debita coaptatione (*quam sequitur labiorum vulneris ad mutuum contactum adductio, adductorumque conservatio, per linetola emplastica cruciatim imposita, & fasciam*) 3. deligatione, & denique 4. depositione.

Hic tamen circa curationem notandum, *primò* ut extensio fiat a chirurgo statim vocato, prima aut ad finem secunda die, priusquam scilicet parti grauis superueniat inflammatio. Si chirurgus opportune non fuerit accersitus, sed tertia, quarta aut quinta die, in quibus inflammatio vel imminet, vel cœpit, tunc tentanda non est extensio, donec septem vel paulò plures dies præterierint: totis interea viribus contra inflammationem pugnet Medicus, tam remouendo causam antecedentem, per dietam, chirurgiam, & pharmaciam, quam respiciendo ad partem affectam anodynis, repellentibus, & congruè, quantum licet, membri depositione, & vultus suppurationibus contendo. Præterito inflammationis periculo, vel per extensionem solam, vel etiam vectis operam, fractura coaptanda, deinde tribus fascijs, & sufficiente plagularum numero, deliganda, moliterque deponenda.

Secundò, ut extensio non sit adeo valida, ut in fractura simplici, propterea, quia substantia carnosæ, musculosa, & nervosa, iam lacerala, contusa & attrita est: alioqui insignes dolores & conuulsiones excitarentur, cum maximo vitæ discrimine.

Tertiò, ut fascia prima paulò laxior sit, quàm vulnus ipsum, præcipuè circa principium, à quo incipienda est circumuolutio, ut ora vulneris utrinque comprehendat: *Si enim fascia angustior esset, tunc vlcus cinctum teneret, & dolorem inferret.*

Quartò, Fasciæ etiam minus stringantur, quàm in fractura sine vulnere, ne compresso vulnere, dolor & inflammatio oriatur: ob eandem causam sint magis etiam molles, quàm in fractura simplici. Pars, tertio post extensionem, & directionem die, soluatür, iterumque deligatur, ita tamen, ut deligatio aliquantum magis comprimat (*ad membrum gracilius reddendum*) quamdiu timor durat in-

flammationis, nisi dolor aliter suadeat. In secunda verò solutione, non arctior fiat deligatio, sed potius laxior, vt detur exitus sanguini futuri materia calli.

Quinto Ferulæ non apponantur ad vulnus, sed si apponendæ, adhibeantur ad vulneris latera & partem oppositam, donec sit sanatum vulnus. Rarò autem contingit, vulnus in tali fractura simplex, secundo vel tertio apparatu, cicatrice non obduci, vel saltem carne non repleri. Sanato vulnere, si os nondum est confirmatum, eadem agantur, quæ in fractura simplici.

Si autem inerea (neque enim ossis sepatatio, nisi fractura conformatione frustrata, aut osse diutius detecto semper ab initio potest præsentiri) die scilicet 18. vel 20. vel alio vulnus incrudescat, & fractura ossis abscessum minetur, (*quem indicat sanies multa, quæ vulneris magnitudini non respondeat, labia vulneris inuersa, & caro hebes in vulnere generata*) considerandum an ossis frustulum sit magnum, aut paruum? si magnum, signa proposita erunt intensiora, sin paruum, remissiora. 2. an abscessum à reliquo osse iam sit separatum, vel adhuc cum eo contineatur? Illud cognoscitur, quando æger vel ad eam rem intentus, tacitam quandam morionem, vel minimè attentus, dolorem pungitium percipit; Hoc, quando patiens neque latentem, neque manifestum sentit motum.

Fractura cum vulnere, ubi os nudatum non est, ossis tamen frustulum paruum recessurum expectatur.

Modus curandi, in fractura simplici adhibitus, nequaquam formidandus, sed, omissis ferulis, continuandus, laxiori saltem deligatione, & crebriore (de tertio scilicet in tertium) resolutione, opusque naturæ medicamentis quàm citissimè iuuandum, donec officulum omninò separatum vossella arripi, ac citra violentiam extrahi possit. Officulo extracto, ferulæ adhibeantur ad latera vulneris, donec consolidetur. Si vulnere ad cicarricem ducto, fractura nondum fuerit co. firmata, ferulæ vndique erunt apponendæ, sicut in fractura simplici dictum.

Fractura cum vulnere, in qua os nudatum non est, magna tamen ossis portio, vel plures (vt vulneribus scelopetorum) recessura, vel statim, vel postea cognoscuntur.

Si statim, aliam & à superiore longè diuersam, pro citissima ossis separatione ligaturam exposcit, vt membrum quotidie deligati & solui queat, abique eo quod fractura moueatur. Probatissimum au-

tem

rem deligandi modus est Hippocraticus, quo pus non intercluditur, fractura stabilitur, inflammatio arcetur, dolor non excitatur, & citissima ossis recessio procuratur. Ad hæc omnia præstanda, ex panno linceo parentur plagulæ duplicatæ, non angustiores, quàm ut labia vulneris sufficienter apprehendant, quoad longitudinem paulo longiores, quàm ut semel membrum circumceant, totq; numero sint, quot ad faciendam fasciam ascialem Tab. XXVII. Fig. X. opus erit. Hæ œnelæo, ex vino nimirum auttero & oleo rosarum composito, ut dolorem sedent, & inflammationem prohibeant, insuccatæ, apponuntur latiori linceo, eo ordine, ut media plagula sibi proximas, & hæ remotiorum medietatem contegant: His præparatis, fracturâ coaptata, vulnèrique appposito suppuratorio, tetrapharmaco scilicet Galeni, linteum illud, unâ cum dispositis plagulis, membro deligando subiiciatur, ita ut media plagula sub fracturâ veniat; Tab. XXVIII. Fig. VIII. Deinde minister alterum mediæ plagulæ caput tentum detineat, alterum Medicus, quæ adducuntur, ut longè ab extremitatibus sese circulari modo interfecerint, & arctè, quantum in fracturis cum vulnere & particula ossis abscessura, licitum potius, quàm necesse est, partem læsam firment. Mediâ in circulum adductâ, adducatur etiam superiorum prima, deinde secunda, postmodum tertia, & sic deinceps, donec ad partem illam peruentum sit, ad quam fascia prima Tab. XXIX. Fig. I. si vulnus non adesset, ascendere deberet. His superioribus apposis similiter adducatur inferiorum prima, deinde secunda, tertia, & quarta, & sic deinceps descendendo etiam usque ad partem sanam. Tab. XXX. Fig. II. Hæc medicamenta, cum sua ligatura, (quotidie fascias cum œnelæo solum irrigando) applicentur quousque tempus inflammationis præterierit, dein omni industriâ eo intendendum est, ut os recedens, quàm citissimè fieri potest, totâ extrudatur, naturam adiuuando iniectione decocti diuini, & appositione cerati sacri Galeni, supra vulnus, (ut eius tantum otas comprehendat) & diachalciteos circa partem affectam. *Nota*, iuducantur ceratum diapalmæ splenijs septem (pluribus vel paucioribus) simplicibus & in circulum eorum capita adducantur, à medio incipiendo, ac postmodum ascendendo & descendendo, ut complagulis duplicatis fieri solet. Splenijs ex cerato adhibitis, plagulæ ex linceo duplicato confectæ & vino saltem auttero imbutæ, ut melius inter se cohereant, apponantur.

Osse in conspectum detruso, eoque vossellâ, si citra violentiam fieri possit, extracto, vulnus cerato diuino consolidandum. Vulnere autem ad cicatricem ducto, membrum in quiete conseruandum, donec fractura confirmetur, apposis vndique ferulis. Obseruandum præterea, si fascias, ob carnem duritiem vel immunditiem, remoueri

neceſſe eſt, vt membrum eicietur quidem, ſed itatim iterum depoſitur ſupra latius linteum, cui ordinatim linteola iſta duplicata iam fuerint appoſita Tab. XXIX. Fig. VIII.

Si non ſtatim, ſed demum poſtea, os abieſſurum appareat, deligatio (quæ tribus peragitur faſcijs & ſpleijs) mutetur in aſcialem, modo deſcriptam, donec os abieſſerit. Oſſe ſatis magno (qualia ſunt illa Tab. XXVII. Fig. IV. & Tab. XXIX. Fig. IX. de piſta) reſceſſo, ſpleniorum circularis apparatus (Tab. XXVIII. Fig. VIII. in crure) in cruciformem (Tab. XXVII. Fig. I.) mutandus, deligatioque ab inſima plagula incipienda, & ſuprema finienda, (Tab. XXVIII. Fig. X.) vt humiditates in cauitate oſſis ſeparati collectæ, quæ plagulis deſcendentibus deorſum traxæ ſinum magnum efficerent, è vulnere exprimantur: Vulnere ad cicatricem ducto, pro confirmatione fracturæ, ſerulæ apponi poſſunt.

Fractura cum vulnere, in qua os à periſtio denudatum eſt, extra vulnus tamen non eminet.

C Vratur primò moderata membri extensione, ſecundò conuenienti coaptatione, terciò labiorum vulneris ad murum contactum adductione; quarto apta deligatione, & quinto congrua deſpoſitione. In deligatione conſiderandum, an aliqua oſſis portio ſit reſceſſura, vel nulla? Nulla abſcedet, ſi os nudatum itatim cutis operculo fuerit reſectum: Aliqua reſcedit, ſi os diutius aëri fuerit expoſitum. Si nullum aut paruum os eſt abſceſſurum, deligatio tribus faſcijs, & ſpleijs, eſt peragenda, velut in fractura cum vulnere ſimplici, & in qua oſſis parui expectatur ſeparatio: ſi magnum eſt abſceſſurum, deligatione aſciali pars affecta vincienda eſt, vt modò dictum in fractura cum oſſe magno abſceſſuro.

Fractura cum vulnere, in qua os extra vulnus eminet.

A Ntequam reponantur, conſiderandum eſt; an os eminens in propriam cauitatem, beneficio debitæ extensionis, citra violentiam, & conuulſionis periculum, reſtitui poſſit, nec ne? Vnde, ſi poteſt citra periculum reſtitui, reſtituatur, ſin minus, non reſtituatur. Periculofam reſtitutionem indicant, prominentia magna, inflammatio, & pars, ob mufculorum contractionem, dura: Facilem, os eminens: paruum, abſentia tumoris phlegmonofi, & partis mollioris. Quod ſi ergo reſtitui nequit, è duobus malis minus eligendum, os (cum prædictæ ſutura membri breuitatis, ne ea chirurgi adſcribatur error) eminens & nudum, forſice Tab. XX. Fig. I. præciden-

dum

Quantitas. Membrum in directum extenditur, vsque quo ossa ponantur è regione inuicem, at se mutuo non contingant.

Conformatio probè fiet, si, dum organa extendentia sensim, & sensim remittuntur, & membrum in media figura conseruatur, partes ossis fracti, quæ è directo nondum exacte iacent, in directum ex amussim ponantur, eorumque eminentiæ in proprias cavitates, citra omnem violentiam suauiter & blande, manibus chirurgi recondantur. Tab. XXVI. Fig. I. Hæc operatio optimè succedit, quando membrum conformatum sano in figura erit simile, tactu nulla sentietur inæqualitas, & dolor vehemens sedabitur, vel mitescet.

Conseruatio fracturæ, iam coaptatæ, continet deligationem, & inflammationis, per topica, prohibitionem. Deligatio fit fascijs, splenijs, & ferulis.

Fascia Tab. XXIX. E. F. G. autem parantur ex linteis vetustis, alijsque vsibus ex patre attritis, vt sint tractabiles, validis tamen, ne extensæ lacerentur; nullas consutiones aut extantias habeant, vt æqualiter, ac sine dolore, constringant. *Latitudo* autem fasciarum magnitudine partis innotescit; pars enim crassior latiores, tenuior angustiores requirit.

Longitudo tanta sit, quanta requiritur, vt scilicet deligatio, & supra fracturam & infra, comprehendat non parum de parte sana, debitis circumuolutionibus, quæ tot sunt, quot requiruntur ad firmitatem partis fractæ.

Splenia Tab. XXIX. Lit. I. sunt panni linei (antiqui parabant ex stuppa pexa) sæpius complicati, sicque dicuntur, quoniam imitantur splenes brutorum, qui solent esse oblongi & angusti. Alij hos pannos vocant p'agulas: veteres appellarunt plumaceolos aut puluillos, quoniam ex plumis, inter duos pannos confutis, parantur. Hæc splenia adeò longa sint, vt totam deligationem comprehendant; breuiora enim omnes fasciæ circumuolutiones non tuerentur: latitudo autem ipsorum sit triū aut quatuor digitorū, eius qui deligandus est. Quod verò ad crassitatem attinet, sint triplicia & quadruplicia etiā, vbi maiori opus est firmitate: Et cum debeant totam partem circumdare, tot accipienda sunt, quot possunt partem in orbem complecti. Vnde Hipp. lib. de offic. Medic. *Spleniū longitudo, latitudo, crassitudo et multitudo talis esto: Longitudine deligationem aequent, latitudine trium sint aut quatuor digitorum; crassitudine triplicia aut quadruplicia, multitudo, vt in orbem conuoluta, neque plura sint, neque pauciora.* Et Galen. in comm. huius loci: in hoc, quem nunc de fracturis Hippocrates instituit, sermone primum p'agulas commemorat, splenia quoque à splenis similitudine, quem imitantur, appellata: quæ præcipit longitudine æquare deligationem, vt potè quæ

in eius gratiam adhibeamur, videlicet, vt eam firmam & immotam seruent. Latitudinem verò habere trium aut quatuor digitorum hominis, nempe deligandi. Crassitudo ea sit, vt triplicia vel quadruplicia sint: Quadruplicia quidem, vbi deligatio maiore eget custodia. Verùm vbi minore, triplicia posse satisfacere arbitratur. Eam autem plagularum multitudinem adhiberi consulit, vt in orbem deligatum membrum comprehendant.

Ferula Tab. XXIX. K sūt assulę laues (quę ossibus fractis & luxatis apponuntur, postquam transierit inflammationis tempus, vt fracturam magis stabiliant) plagulis non admodum dissimiles. Veteres, inter quos primus fuit Hippocrates, parauit ferulas ex ligneo ferulę fruticis cortice, aut ex ipsis ramis per medium diuisis, vnde, & nomē habent ferulę. Est enim hoc lignum aptissimum ad hunc usum, cum & durissimum, vnde antiqui ex eo scipiones parabant, quibus innitebantur. Nos in defectu huius fruticis (quandoquidem in Germania locisque frigidioribus haberi nequit) optimo cum successu paramus ferulas ex operculo capsularum, quibus vtuntur Pharmacopoei & Mercatores ad Merces recõdendas. Si nec dicta opercula haberi possunt, ferulę optimè conficiuntur ex vaginis ensium antiquis, quę quoniam corio obducuntur, sunt durę, sed simul laues. Hippocrates libr. de offic. Med. text. 9 bonas ferularum condiciones exposuit, dum scribit: *Ferula porrò laues, (ἁῖλοι) æquales, circa extrema resima sine oportet, & ab utraque parte deligationis, paulò breuiores, crassissima verò qua parte fractura erupit.* Nō asperas, sed laues vult, vt possint nunc sursum nunc deorsum, nunc in rectum, nūc in obliquum prout opus requirit, trahi: Non distentas, quę deligationem, & membrum distorquent sed æquales, vt æqualiter cingant. Simas iuxta extremitates, hoc est, ex inferiore extremitate, leuiter derasas, vt magis adstringant in loco fracturę, quam ad partes sanas, quę compressę dolent, deinde inflammantur. Ab vtraq; parte deligatione facta breuiiores, eadem causa, ne premant partes in extremo sanas, atq; adeo dolorem & inflammationem inferant. Galen. comm. 3. de Chirurg. offic. text. 11. scribit: *Fracturę vero maximè conducit, vt ferulę neque asperę, neque distortę sint, quippe quod vtroque modo comprimāt, sed quę distortę sunt, id insuper habent, vt deligationem distorqueant, qua distorta, cõfracta etiam pars distorquetur.* Consulit præterea, vt illę eligantur, quę ab ipsis capitibus sunt simę, quę enim eandem semper vsque ad extremum crassitudinem seruant, æqualem ea parte deligationem, cæteris omnibus præstant: quod fieri minimè expedit, cū ipse velit, vt ferulę in media deligatione magis adstringant, inde verò vsq; ad extremas partes sint magis laxę, vbi & laxissimę esse debeant. Vult etiam vt longitudine sint breuiiores, quàm sit.

deli-

deligatio, ne enim ultra deligationem attingant, quæ, ex eo quod humores à vinculis expressos plerumque recipit, tumidior redditur. Vult etiam crassiores esse ferulas, vbi fracturæ insident, quod locus is præ cæteris earum compressione indigeat.

Inflamatio imminens prohibetur, medicamentis anodynis, & repellentibus, parti extrinsecus appositis. Ego felici semper successu vtor medicamento, quod componitur ex vino austero, oleo rosarum, & albumine ouorum spatula agitato, debita proportionem mixtis. Si dolor vrget, albuminibus omissis, vino oleum in maiore quantitate immiscere soleo. In hoc medicamento fascias Tabul. XXXIX. E. & F. quæ dicuntur subligamina, imbuo & ex primo Tabul. XXXIX. H. iuxta admonitionem Auicennæ, qui lib. 4. *Fen. 5. tract. 1. c. 5. de curatione dislocationis* præcipit, vt sumus solliciti, ne imponantur calidæ & siccæ. Calidæ enim calefaciunt, & calefaciendo humores attrahunt: siccæ vero non cohererent inter se.

Facta igitur extensione, fractura composita, omnibusque ad ligandum necessarijs preparatis, membrum adhuc in diuersa extentam, est *immediate* fascijs sursum & deorsum ductis inuoluendum. Initio autem, fasciæ primæ tres circumuolutiones supra fracturam facere oportet, & tantam facere compressionem, quanta sufficiens sit ad firmanda ossa: hinc versus superiorem partem, ad sanam scilicet ducenda est deligatio, paulatim compressionem minuendo Tab. XXXIX. Fig. I.

Vbi satis de sana parte fuerit comprehensum, ibi deligationem terminare oportet. Dein alia fasciæ (primæ longior, vt ad eum locum peruenire possit, vbi prima desijt) accipienda est, atque vna vel altera circumuolutione (contrario modo, si prior versus dextrâ, hæc versus sinistram) faciendæ est supra fracturam, atque ex ea versus inferiorem partem, ducenda est deligatio, similiter paulatim compressionem minuendo. Sed circumuolutiones huius fasciæ non sint adeo frequentes, quoniam non adeo timemus ab extremis partibus, & vbi satis de sana parte fuerit comprehensum, finem circumuolutionis ad inferiora facere oportet, Tab. XXXIX. Fig. II. & reliquo fasciæ, rarioribus circumuolutionibus, redire per ipsam fracturam, vsque tandem ventum sit ad finem fasciæ primæ. Quoniam verò hæc duæ fasciæ, iam circumuolutæ, ad fracturam continendam debiliores sunt, splenia circa fracturam, & totum membrum, per eius scilicet longitudinem adhibenda, vt vnum alteri non superponatur, sed inter vnum & alterum vnus digiti transuersi, hominis scilicet deligandi, spatium intercedat, quæ firmentur fasciæ tertiæ ex duplici capite, ita vt prima circumuolutio fiat super fracturam, deinde alterum caput ducatur versus superiora crebrioribus circumuolutionibus, rarioribus verò alterum versus inferiora, deinde ab inferioribus sursum, vsque

vsque in eum locum, in quo reliquit alterum caput huius fasciæ, vtrūque tamen caput toties circumuoluendum, vt plagularum extremitates ytrinque parum promineant, Tabul. XXIX. Fig. III. *Signum* congruæ deligationis erit, quando patiens se firmatum esse refert, non compressum, & magis super partem læsam, quàm super sanas, minimè versus extremas.

Congruæ deligationi succedit bona membri *Deposio*, quæ est in media figura, mollis, æqualis & sursum vergens. Pars igitur deligata intra capsulam ligneam stipula pexa, & linteo inuoluta, repletam deponatur, atque ita vsque in tertium diem relinquatur, si patiens eo, quo deligatus est die, & sequenti nocte, sibi videtur magis compressus, secundo tamen, ad hoc etiã in extrema parte tumor aderit mollis & paruus: maior enim & durus, prauam & nimis arctam indicat ligaturam, & imminens inflammationis, ac gangrenæ periculum, unde æger incautè solvendus, atque denuo, sed moderatè, deligandus est.

Si tertio, post primam deligationem, die, laxiores videntur fasciæ, resoluantur (animaduertendum autem, vbi solvenda deligatio, antequam ossa sint aliquantulum firmata, circumuolutas spiras non esse paulatim soluendas, sed pars enber, atque lintea & fasciæ secentur, donec, detecta superiori parte, possis omnia detrahere, parte à proprio loco non eleuata, sic enim non est opus, ad soluendam deligationem, partem eleuare, atque suspendere & contrectare, ex quibus nulla potest utilitas agrotanti contingere, quousque medicamenta adhibenda, membrumque denuo fasciis inuoluendum) parsque pruriens aqua tepida sæpius perfundenda, vt fuligines detentæ euaporent: postea membrum ligaturâ, quæ moderatâ paulò arctior sit, constringatur, in capsula inque deponatur vsque in septimum diem, quo fasciæ iterum soluendæ, membrum aqua perfundendum, & deligandum, fasciis adhuc arctius adductis, ita tamen vt vitam & alimentum permittant transire ad membrum extremum. Parti igitur tractæ applicetur ceratum diapalmæ, vel emplastrum catagmaticum Renodæi, aut vni lato linteo aut pluribus angustioribus inductum, supra hoc fasciæ vnum caput habentes, vinoque austero expressæ, & supra has plagulæ, prius in vino expressæ, deinde albumine oui subactis imbutæ, denique fascia ex duobus capitibus, eodem vino insuccata.

His ritè peractis, quoniam hoc tempore plerumque cessat inflammationis timor, ad fracturam magis stabilendam ferulæ (*quæ nisi transacta septima, ob inflammationis periculum, tuto non alligantur, vt deligationem conferuent*) circumquaq; plagulis in vtroque superfasciationis extremo prominentibus, per longitudinem membri, circumcirca vinculis I. maximè laxis apponendæ, hoc ordine, vt primò

F ligentur

ligentur in superiore parte, secundo in inferiore, tertio verò supra fracturam, ne validior fiat supra fracturam constrictio, & dolor excitetur, Tab. XXXIX. Fig. IV. In appositione præterea ferularum cavenda sunt ossa prominentia, & excarnia, namque illis appositæ dolorem inferrent, & exulcerarent: Vnde aut ad altera opponantur, aut sint breuiores. Membrum ita deligatum, detineatur immotum in capsula, vsque ad vigesimum, nisi pruritus, excoaratio, dolor, aliaque accidentia, fasciarum resolutionem & conuenientem remediorum applicationem, desiderent. Nihilominus tamen Medicus interrim ægrotum, de tertio in tertium diem, visitet, & ferulas laxas leuiter admodum, supra fracturam constringat, id semper præ oculis habens, quod ferulæ circumponantur, non vt comprimant, sed vt subiectam deligationem tueantur, ac firment.

Cum autem terminus hic præterijt, ferulæ, ac fasciæ religandæ, & pars affecta, pro generatione aut nutritione calli, aqua calida (donec intumescat, nec ultra) fouenda, deinde appposito catagmatico, fasciæ & ferulæ laxius adstringendæ (vt humores callum generantes & nutrientes concresecant) inque capsulam pars deposita per biduum relinquenda, ad explorandam calli quantitatem & qualitatem deum relinquenda. Quinto quouis posthac die, fasciæ resoluendæ, & membrum aqua calida persusum, cerato, fascijs, ferulisque laxioribus, tractandum, vsque dum fractura callo mediocri confirmetur, quod in cubiti ossis, in triginta plerumque diebus, in humeri & tibiae quadraginta ferè, in femoris verò quinquaginta fieri solet: *Nihil tamen est perpetuum; nam & natura à natura, & ætas plurimum distat.*

Callus autem generatur ex sanguine, qui ante septimam attrahi non debet, hic Emplastrum oxycroceum primis diebus periculosum, ob imminentem vel præsentem inflammationem. Ad calli generationem alij exhibent iuscula, in qua bullierint folia agrimonie, & radices consolidæ maioris. Nonnulli viscidiores cibos præbent. Recentiores, ante 60. annos, inuenerunt lapidem, qui in Palatinatu crescit, & ad calli generationem, ab incolis istius loci, miris commendatur laudibus, vnde ἐσκαλλων vocatur: de quo legantur Guilhelm. Fabric. Hild. centur. 1. obseru. 90. 91. & 92. & Sennertus libr. 5. Inst. part. 2. sect. 1. cap. 7. Extrinsecus tutissime applicatur non modò ceratum Barbarum, & diapalmæ Galeni, verum etiam Emplastrum oxycroceum Nicolai, & catagmaticum Renodæi Barbarum & oxycroceum apponantur hyeme, diapalma tempore æstatis, Emplastrum Renodæi medijs temporibus.

Fracturas quandoque nonnulla sequuntur *symptomata*, vt pote pruri-

pruritus, excoariatio, callus maior vel minor, dolor, gracilitas membri, & distortio, quæ omnia Medici operam requirunt.

Pruritus cessabit, si aqua tepida pars religata foueatur, donec rubescat, & paulo amplius, ut attracta materia iterum digeratur. Quando locus affectus tepidæ affusionem commodè non admittit, aquæ vaporis satis vtiliter apponitur. *Scalpsura* ob prurium agris prohibenda, è quod pessima, & præter excoariationem, humores attrahat, & dolores graues excitet.

Excoariatio, quæ oritur non rarò. quando fasciarum resolutio diutius quam par est protrahitur, deinde quando patientes ex impatientia scalpunt, sanatur affusione tepidæ, ut in pruritus cura dictum, & adhibitione vnguenti de cerussa, quod refrigerat & exsiccat.

Dolor mitigatur fomento hydrelæi, vel decoctionis capitis castrati cum floribus chamomillæ.

Callus iusto maior generatur, quando æger plenior, quàm decet, victu vitur, vel Medicus negligentior est in curatione, si manu eius qualitatem non explorat, & fascias nimis laxè circumuoluit. Præcauetur, si victui detrahatur, qualitas calli aliquoties exploratur, & fasciæ paulo arctius constringuntur. Minuitur primò medicamentis emollientibus, postea emollientibus, & discutientibus simul (in curatione luxationis cum callo propositis) donec ad mediocritatem veniat. Callus minor habet causas contrarias, vnde præseruatur etiam contrarijs. Augetur crassiore victus ratione, alimenti ad partem affectam attractionem per affusionem aquæ calidæ (ea moderatione, ut, dum pars adhuc attollitur, priusquam concidat, desistamus) & fasciarum laxiore ligatura.

Extenuatio partis fit, vel propter fasciarum nimiam stricturam, vel inopiam alimenti viscosi. Si strictura extenuationem efficiat, fasciæ magis remissè ligentur: si alimenti inopia gracilitatis causa est, alimentum attrahatur foris aquæ calidæ, donec rubear pars, cui deinde emplastrum aliquod picatum, linteo lato inductum apponatur, rursusque velociter detrahatur, cauendo postmodum strictam fasciarum circumductionem, quæ alimentum attractum iterum repelleret.

Distorsio membri, vel malæ coformationis ossium est causa, vel medici incuria, dum aut extensionem aut coaptationem, aut deligationem minorem, quam par est, facit; vel ægrotantis vitium, quando membrum fractum ante calli confirmationem mouet, aut ipso innititur; vel fracturæ culpa, quâdo præsertim semet rumpitur. Nam ossa femoris, nequæ diducta per vim extensionis deligantur sic diducta vinculo contineri poterunt sed cum primo intonso remiserit, inter se conuertunt. Idcirco enim carnes crassæ, ac valida deligatione superant,

rans, non ab ea superantur. Hippoc. *de fract.* Quod confirmare videtur Cellus, dum *lib. 8. c. 10.* de crurum femorūque curatione scribit; neque enim ignorati oportet, si semut fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur; & Auicenna *lib. 4. Fen. 5.* tradit, raram admodum esse femoris fracti integram curationem. Quorum verbis nos admonent, vt integram curationem femoris nunquam promittamus, sed omnem potius diligentiam adhibitori claudicationem dubiam prædicemus, ne ex siacturę natura, aut, quod sæpissimè contingit, ex *agrotantium impatientia superueniens*, nostro adscribi errori, & præmij loco famam minuere possit. Fit etiam mala conformatio fracturę culpa, quando frustulum ossis inter ambo ossa fracta continetur, quod eorum mutuū contactum impediāt. Ossa Medici & agrotantis vitio distorta nunquam rumpantur (nisi aliter fieri nequeat, ob magnam membri in operationibus suis læsione) si pariens senex, & debilis, callus vetustus, & induratus, & os magnum, quale est femoris & humeri. At si læsio magna, pariens iuuenis & robustus, callus recens, qui sex menses non excesserit, & molliatur callus per quindecim dies, perfusionibus, balneis & emplastris; deinde membrum ab vtraque parte, vel inanibus, vel habenis, vel machinis, prout necesse fuerit, in diuersa extendatur, vsque dum callus frangatur, & ossis fracti partes manuum palmis coaptari possint: postea fractura curetur, vt supra dictum. Si ossis frustulum membrum totum distorqueat, scalpello *Tab. II. Fig. II.* sectio fiat vsque ad os fractum, & vellella ossis portio glutinationem impediens, extrahatur, dein fractura per extensionem coaptetur, deligetur, & deponatur, eodem modo quo fractura recens. In dicta femoris distortionē os minimè rumpendum, magis enim conducibile est viuere cum claudicatione, quàm periculosam operationem, non sine torminibus & recidiuæ metu sustinere. Femoris autem distortio præcauetur, si membrum in, ante, & post deligationem instrumento glossocomo *Tab. XXI. Fig. IV.* quod huic vsui secundario destinatum est, conseruetur extensum, vsque ad perfectam fracturę confirmationem,

Curatio Fractura asseralis.

IN fractura asserali, seu per longitudinem ossis facta, fasciæ arctius stringendę sunt, quam in reliquis, vt ossa fracta, quę per latitudinem à se inuicem recesserunt, ad mutuū contactum & actum ducantur, & recidere nequeant, Galen. *l. 6. m. c. 5.* Cæterum ea omnia agenda, quę in curatione fracturę transuersę & obliquę dicta sunt. Atene ista quidem de fracturarum curatione simplicium, in quibus neque ossa eminent, neque aliqui vulnus accessit, sufficiant;

pung

nunc paucissima tradam, quomodo fractura cum vulnere curanda sit. Fracturarum cum vulnere variz sunt species, vel enim os à periostio & carne denudatum est, vel ijs adhuc relictum: in utraque iterum vel ossis positionem aut parvam aut magnam expectamus abscessuram, vel nullam.

Fractura cum vulnere simplici.

IN quà nec os à suis tegumentis denudatum est, neque aliqua ossis portio abscessura, curatur ut fractura sine vulnere, nimirum 1. congrua extensione, 2. debita coaptatione (*quam sequitur labiorum vulneris ad mutuum contactum adductio, adductorumque conservatio, per linteola emplastica cruciatim imposita, & fasciam*) 3. deligatione, & denique 4. depositione.

Hic tamen circa curationem notandum, *primò* ut extensio fiat a chirurgo statim vocato, prima aut ad summum secunda die, priusquam scilicet parti grauis superueniat inflammatio. Si chirurgus opportune non fuerit accersitus, sed tertia, quarta aut quinta die, in quibus inflammatio vel imminet, vel coepit, tunc tentanda non est extensio, donec septem vel paulò plures dies præterierint: totis interea viribus contra inflammationem pugnet Medicus, tam remouendo causam antecedentem, per dietam, chirurgiam, & pharmaciam, quam respiciendo ad partem affectam anodynis, repellentibus, & congruè, quantum licet, membri depositione, & vulnus suppurantibus contegendo. Præterito inflammationis periculo, vel per extensionem solam, vel etiam vectis operam, fractura coaptanda, deinde tribus fascijs, & sufficiente plagularum numero, deliganda, molliter, que deponenda.

Secundò, ut extensio non sit adeo valida, ut in fractura simplici, propterea, quia substantia carnosæ, musculosa, & neruosa, iam lacerala, contusa & attrita est: alioquin insignes dolores & conuulsiones excitarentur, cum maximo vitæ discrimine.

Tertiò, ut fascia prima paulò latior sit, quàm vulnus ipsum, præcipuè circa principium, à quo incipienda est circumuolutio, ut ora vulneris utrinque comprehendat: *Si enim fascia angustior esset, tunc vlcus cinctum teneret, & dolorem inferret.*

Quarid, Fasciæ etiam minus stringantur, quàm in fractura sine vulnere, ne compresso vulnere, dolor & inflammatio oriatur: ob eandem causam sint magis etiam molles, quàm in fractura simplici. Pars, tertio post extensionem, & directionem die, soluatür, iterumque deligetur, ita tamen, ut deligatio aliquantum magis comprimat (*ad membrum gracilius reddendum*) quamdiu timor durat in-

F 3 flam.

flammationis, nisi dolor aliter suadeat. In secunda verò solutione, non arctior fiat deligatio, sed potius laxior, ut detur exitus sanguinis futuri materia calli.

Quinto Ferulæ non apponantur ad vulnus, sed si apponendæ, adhibeantur ad vulneris latera & partem oppositam, donec sit sanatum vulnus. Rarò autem contingit, vulnus in tali fractura simplex, secundo vel tertio apparatu, cicatrice non obduci, vel saltem carne non repleri. Sanato vulnere, si os nondum est confirmatum, eadem agantur, quæ in fractura simplici.

Si autem interea (neque enim ossis separatio, nisi fractura conformatione frustrata, aut osse diutius derecto semper ab initio potest presentiri) die scilicet 18. vel 20. vel alio vulnus incrudescat, & fractura ossis abscessum minetur, (*quem indicat sanies multa, qua vulneris magnitudini non respondeat, labia vulneris inuorsa, & caro hebes in vulnere generata*) considerandum an ossis frustulum sit magnum, aut paruum? si magnum, signa proposita erunt intensiora, si paruum, remissiora. 2. an abscessum à reliquo osse iam sit separatum, vel adhuc cum eo contineatur? Illud cognoscitur, quando æger vel ad eam rem intentus, tacitam quandam motionem, vel minimè attentus, dolorem pungitiuum percipit; Hoc, quando patiens neque latentem, neque manifestum sentit motum.

Fractura cum vulnere, ubi os nudatum non est, ossis tamen frustulum paruum recessurum expectatur.

Modus curandi, in fractura simplici adhibitus, nequaquam formidandus, sed, omissis ferulis, continuandus, laxiori saltem deligatione, & crebriore (de tertio scilicet in tertium) resolutione, opusque naturæ medicamentis quàm citissimè iuuandum, donec officulum omninò separatum vossella arripi, ac citra violentiam extrahi possit. Officulo extracto, ferulæ adhibeantur ad latera vulneris, donec consolidetur. Si vulnere ad cicatricem ducto, fractura nondum fuerit co. firmata, ferulæ undique erunt apponendæ, sicut in fractura simplici dictum.

Fractura cum vulnere, in qua os nudatum non est, magna tamen ossis portio, vel plures (ut vulneribus sclopetorum) recessura, vel statim, vel postea cognoscuntur.

Si statim, aliam & à superiore longè diuersam, pro citissima ossis separatione ligaturam exposcit, ut membrum quotidie deligati & solui queat, abique eo quod fractura moueatur. Probatissimus autem

rem deligandi modus est Hippocraticus, quo pus non intercluditur, fractura stabilitur, inflammatio arcetur, dolor non excitatur, & citissima ossis recessio procuratur. Ad hæc omnia præstanda, ex panno lineo parentur plagulæ duplicatæ, non angustiores, quàm ut labia vulneris sufficienter apprehendant, quoad longitudinem paulò longiores, quàm ut semel membrum circumneant, totq; numero sint, quot ad faciendam fasciam ascialem Tab. XXVII. Fig. X. opus erit. Hæc œnelæo, ex vino nimirum aultero & oleo rosarum composito, ut dolorem sedent, & inflammationem prohibeant, insuccatæ, apponuntur latiori linteo, eo ordine, ut media plagula sibi proximas, & hæc remotiorum medietatem contegant: His præparatis, fracturæ coaptata, vulnerique appposito suppuratorio, tetrapharmaco scilicet Galeni, linteum illud, unà cum dispositis plagulis, membro deligando subijciatur, ita ut media plagula sub fracturâ veniat; Tab. XXVIII. Fig. VIII. Deinde minister alterum mediæ plagulæ caput teutum detineat, alterum Medicus, quæ adducuntur, ut longè ab extremitatibus sese circulari modo inrerserent, & arctè, quantum in fracturis cum vulnere & particula ossis abscessura, licitum potius, quàm necesse est, partem læsam firment. Mediâ in circulum adducta, adducatur etiam superiorum prima, deinde secunda, postmodum tertia, & sic deinceps, donec ad partem illam peruentum sit, ad quam fasciâ prima Tab. XXIX. Fig. I. si vulnus non adesset, ascendere deberet. His superioribus apposis similiter adducatur inferiorum prima, deinde secunda, tertia, & quarta, & sic deinceps descendendo etiam usque ad partem sanam. Tab. XXX. Fig. II. Hæc medicamenta, cum sua ligatura, (*quotidie fascias cum œnelæo solum irrigando*) applicentur quousque tempus inflammationis præterierit, dein omni industriâ eo intendendum est, ut os recedens, quàm citissimè fieri potest, foras extrudatur, naturam adiuuando iniectione decocti diuini, & applicatione cerati sacri Galeni, supra vulnus, (ut eius tantum oras comprehendat) & diachalciteos circa partem affectam, *Nota*, inducatur ceratum diapalmæ splenijs septem (pluribus vel paucioribus) simplicibus & in circulum eorum capita adducantur, à medio incipiendo, ac postmodum ascendendo & descendendo, ut complagulis duplicatis fieri solet. Splenijs ex cerato adhibitis, plagulæ ex linteo duplicato confectæ & vino saltem aultero imbutæ, ut melius inter se cohereant, apponantur.

Ossis in conspectum detruso, eoque vossellâ, si citra violentiam fieri possit, extracto, vulnus cerato diuino consolidandum. Vulnere autem ad cicatricem ducto, membrum in quiete conseruandum, donec fractura confirmetur, apposis vndique ferulis. Obseruandum præterea, si fascias, ob eam duritiem vel immunditiem, remoueri

necesse est, vt membrum eicietur quidem, sed statim iterum deponatur supra latius linteum, cui ordinatim linteola ista duplicata iam fuerint apposita Tab. XXIX. Fig. VIII.

Si non statim, sed demum postea, os abscellurum appareat, deligatio (quæ tribus peragitur fascijs & splenis) mutetur in ascialem, modo descriptam, donec os abscellerit. Osse satis magno (qualia sunt illa Tab. XXVII. Fig. IV. & Tab. XXIX. Fig. IX. depicta) recesso, spleniorum circularis apparatus (Tab. XXVIII. Fig. VIII. in crure) in cruciformem (Tab. XXVII. Fig. I.) mutandus, deligatioque ab infima plagula incipienda, & suprema finienda, (Tab. XXVIII. Fig. X.) vt humiditates in cauitate ossis separari collectæ, quæ plagulis descendentibus deorsum trusæ sinum magnum efficerent, è vulnere exprimantur: Vulnere ad cicatricem ducto, pro confirmatione fracturæ, ferulæ apponi possunt.


Fractura cum vulnere, in qua os à periosio denudatum est, extra vulnus tamen non eminet.

C Vratur primò moderata membri extensione, secundò conuenienti coaptatione, terciò labiorum vulneris ad mutuum contactum adductione; quarto apta deligatione, & quinto congrua dispositione. In deligatione considerandum, an aliqua ossis portio sit recessura, vel nulla? Nulla abscedet, si os nudatum statim curis operculo fuerit reiectum: Aliqua recedit, si os diutius aëri fuerit expositum. Si nullum aut paruum os est abscellurum, deligatio tribus fascijs, & splenis, est peragenda, velut in fractura cum vulnere simplici, & in qua ossis parui expectatur separatio: si magnum est abscellurum, deligatione asciali pars affecta vincienda est, vt modò dictum in fractura cum osse magno abscelluro.

Fractura cum vulnere, in qua os extra vulnus eminet.

A Nequam reponantur, considerandum est; an os eminens in propriam cauitatem, beneficio debitæ extensionis, citra violentiam, & conuulsionis periculum, restitui possit, nec ne? Vnde, si potest citra periculum restitui, restituatur, sin minus, non restituatur. Periculosam restitutionem indicant, prominentia magna, inflammatio, & pars, ob musculorum contractionem, dura: Facilem, os eminens: paruum, absente tumoris phlegmonosi, & partis mollioris. Quod si ergo restitui nequit, è duobus malis minus eligendum, os (cum prædictione futura membri breuitatis, ne an chirurgi adscribatur error) eminens & nudum, fornice Tab. XX. Fig. I. præcedendum.

TABVLA XXIX



dum, & postea fractura, per modicam factam extensionem, coaptanda. Melius enim est membrum aliquantum breuius reddere, quam ossa non coaptata relinquere, vel violenter extendere, quorum utrumque ægrotanti conuulsionem, & mortem afferret. Si os immixtum modica manus extensione adhuc reponi nequeat, illa adiuvanda est extensio, iuxta Hippocratem, veste seu quodam scalpri incisorio, inter ossa fracta immisso Tab. XXVII. Fig. IX. Fractura coaptata, membrum deligetur, ut in fractura cum vulnere simplici dictum, sed fascijs & emplastris foramen supra vulnus incidatur, ad medicamenta vulneri magno quotidie applicanda. Ratio perforationis fasciarum hæc est: quia vulnus magnum, & ideo per secundam intentionem curandum, copiosam generat saniem, indeque crebram inspectionem requirit; os autem comminutum ob metum novæ musculorum contractionis, frequentiore membri elevatione, fasciarumque resolutionem prohibet, unde media via, ut vulneri & fracturæ satisfiat, incedendum.

Hoc deligandi modo per plures curavi; inter præcipuos superstes vivit iuuenis quidam, qui circa vigesimum ætatis annum, tempore nocturno ab alto cecidit, pedisque sinistri fistulam, & tibiā in medio cum eminentia ossis fibulæ magna fregit, quam nisi forfice Tab. XX. erute Fig. I. abscidissem, fracta ossa minimè componere potuissem. Hic patiens, ætate 4. mensium beneficio scipionis ambulare cepit, reliquo tempore ita incedens, quasi crus nunquam fregisset, aut nullam ossis portionem amisisset, quod probè observandum, quia raro contingit, ut æger ex duplici fractura cum vulnere, & deperditione ossis, restitutus non claudicat. Hæc ligandi ratio, quamvis magnā requirat diligentiam chirurgi, tamen non raro ingratos se exhibent curati: quare non semper vitio verti debet Medicis circumforaneis, qui quandoque curationem, iuxta Hipp. dictamen, à mercede exorciuntur, illamque exigant, dum dolor est, cum

—postquam pœna recessit,

Audent & sanus dicere, multa dedi.

Cum os eminens paruum, aliquando citra violentiam & periculum conuulsionis reponi possit, primo membrum extendatur moderate, deinde fractura componatur: quod si ossa sola extensione difficulter coaptari queant, ob timorem magni doloris & periculose conuulsionis, valdius ne fiat extensio, sed inter ossis divisi partes extensas, latius vestis extremum & tenuius imponatur, ut depressiori ossis parti subiectum, & eminentiori innixum, extensionem iuvet donec ossa è directo collocato videantur: deinde paulatim extensio relaxetur, & vestis extrahatur.

Si, fortè fortuna, os, quo innititur vestis idoneus, in superiore parte

multa

multa comminuta, vel aliquod acutum, habeat, vt vesti non detur commodus locus, illa scalpro rasorio, Tabul. VI. Fig. III. auferenda, hoc autem forfice, Tab. XX. Fig. I. præcidendum, vt vesti tuta sedes comparetur. Osse reposito, considerandum est, an aliquid de osse recessurum sit, nec nesi statim facta erit repositio, nihil recedet; si vero non statim, aliquid recedere potest. Si nihil est recessurum, pars affecta (vulneri appposito prius suppuratorio) deligetur, vt in fractura cum vulnere simplici dictum; Si vero aliquid recessurum expectatur, deligatio instituenda erit, iuxta modum in fractura cum magni ossis separatione adhibitum.

T A B V L A XXIX.

De apparatus ad deligandum crus fractum, & ipsa ratione deligandi Hippocratica in luxationibus & fracturis observanda.

L I T. A. ostendit vitrum vino austero, &c.

B. oleo rosato repletum.

C. tria oua.

D. agitationem albuminum ouorum.

E. F. duas fascias, de quibus Hippocrates de offic. Med. text. 3. Linteorum autem subligationes dux cū sint, vna ex loco in superiorem partem definit, altera F. ex parte affecta in inferiorē vergit.

G. Fasciam cum duobus capitibus.

H. Fasciarum madefactionem: lintea enim non arida, sed succo accommodato madentia sint oportet, Hippoc. de offic. Med. text. 16.

I. Plagulas quadruplicatas, & succo expressas.


K. Ferulas in vtraque extremitate firmas.

L. Habenas, quibus alligantur ferulæ.

Fig. I. monstrat, quomodo Hippocrates, dum membrum à duobus ministris tenetur extentum, fasciam E. versus dextram ter voluat circa partem affectam, deinde sursum dueat, vsque dum ad bonam membri partem, quatuor, quinque, vel pluribus circumuolutionibus perueniat.

Fig. II. docet quomodo fasciam secundam F. quæ priore duplo longior est, contrario modo inuoluat, (prior enim versus dextram & sursum, hæc versus sinistram, & deorsum) semel scilicet circa fracturam, deinde ter, quater aut sæpius, infra fracturam vsque ad aliquam membri partem: fasciæ reliquum, quod Chirurgus in sinistra manu habet, sursum versus circumuoluendum, quousque perueniat ad finem primæ fasciæ.

Fig. III. explicat, quomodo plagulas I. insuccatas per longitudi-





tudinem apponat circa fracturam (ita vt inter vnā & alterā, vnus digiti trāſuerſi ſpatium non excedat) & faſciā, duobus capitibus donata, G firmet: caput G * ſuſum voluendo, alterum verò G deorſum, poſtea ſuſum quouſque peruenerit, vbi illud terminatur.

Fig. IV. docet, quomodo poſt ſeptimā, qua plerumque timor inflammationis ceſſat, ſerulas plagulis, & ſuperligamini per faſciam G factō, imponat, lorifque tribus alliget. Hipp. enim de fract. tex. 23. his verbis fractorum curam deſcribit: Tum demum (*preparatis prius neceſſarijs, fractura coaptata, membroque adhuc in media figura exſtente*) linteo deligare oportet, initio *prima faſcia* ad fracturam injecto, ſic vt firmet quidem *fracturam*, non tamen vehementer comprimat. Vbi circa eundem locum, iterum atque tertio faſciam *primam* inuolueris, ſuſum feratur, quo ſanguinis affluxus retineatur, ibique deſinat, eamque *reſpectu ſecunda* minimè longam eſſe oportet.

Text. 27. Altera faſcia initio quidem ſupra fracturam injecta, ac ſemel circa eandem voluta, tū demum deorſum feratur; minusque comprimendo longiora ſpatia tranſcurrat, quo poſſit ad eum locum, in quo prior finiit, recurrere.

Text. 32. Poſthæc ſplenia, modico cerato (*vel alio conuenienti medicamento*) illita, ſuperiniſciēda, ſic enim leuius & firmitus hærebunt. Quæ ita deinde faſcijs (*faſcia autem duobus capitibus prædicta, trium faſciarum officia abſoluit*) alligare oportet, permutato ordine interſe, modò quidem in dextra, modò etiam in ſiniſtra ferantur, ac plurimum ſane ab inferiore parte ſuſum, interdum verò à ſuperiore deorſum ducantur.

Text. 41. Vbi verò (*poſt timorem inflammationis*) faſcias deligaris, ſerulæ ſunt apponendæ, & quam maximè laxis vinculis comprehendendæ, ita vt quieſcant, neque quicquam ſerularum appoſitio, ad membri compreſſionem addat.

Et hæc de curatione fracturæ & luxationis in genere dicta ſufficiant.

T A B V L A XXX.

De apparatu & modo fonticulum ſupra ſuturam coronalem inuendī & deligandi; vulnera capitis in cruceſem dilatandi, & rimulas cranij dubias abradendi.

Hæc quidem declarandum eſſet, an cauterij actualis ſupra coronalem cranij commiſſuram vſus ſit opportunus? quia tamen hanc quæſtionem Iulius Cæſar Claudianus 3. *Reſponſione Medicinali*, Thomas Fienus l. 3. *de cauterijs* c. 22 & Marcus Aurelius Seuerinus *pyrotechn. Chirurg.* l. 2. p. 2. c. 11. ventilant, actum non agam, ſed explicationem figurarum huius tabulæ aggrediar.

Fig.

Fig. I. & VII. monstrat *apparatum* eorum, quæ ante, in, & post operationem requiruntur; instrumenta scilicet varia, folium brassicæ, butyro recenti illitum, liuteum triplicatum, & fasciam quatuor capitibus præditam.

Fig. II. asteriscus designat *summa coronalis & sagittalis concursus*, quem capillitio, cute crassa, & membrana rectum, Chirurgus difficulter inuenit. Ad huius accuratissimam *inventionem*, tam veteres, quam recentiores Chirurghi varijs utebantur modis, quos omnes recenset Fabricius ab Aquap. *de operationibus Chir. fol. 6*. Ego modos Arabum Principis Auicennæ, & Latinorum Celsi in vnum reducere, suturarum coniunctionem inquiri, vt sequitur. Duco filum ab vna media aure ad alteram mediam, deinde aliud apicem narium ad verticem (Fig. III.) vsque, vbi fila crucem efficiunt, ibi fonticulorum locus, qui de rasis capillis, atramento scriptorio signandis, sicuti Fig. IV. ostendit.

Fig. V. docet *modum operandi*, vbi Chirurgus sinistra tenet instrumentum, *a*, minimè ignitum, quo cutim atramento notatam fortiter comprimit, ob rationes, quas supra Tab. I. Fig. I. adduxi: dextra verò manu instrumentum, *b*, optimè candens cannulæ, *a*, immittit, quod, cum simul vim incisoriæ habeat, si ad cranium peruenerit, circumuoluendum est. Circumuoluitur autem non solum, vt per poros ossis materiæ detur exitus, verùm etiam ne pericranij inflammationem concipiat, *qua facilis est, si instrumentum non circumuoluitur*.

Fig. VI. est *fascia quatuor capitibus*, cuius anteriora, *b. i.* sub mento connectuntur: posteriora verò, *K. l.* ad oeciput filo cõsueunda, *ne nodus, dum ager supinus iacet, compressione vigilas excitet, qua sapissimè inflammationem pericranij lethalem indicunt*.

Fig. VII. cernitur conueniens *fascia vsus*, & deligatio, pro retentione medicamentorum, quæ fonticulo supra suturarum concursum inusto applicantur.

Sed ad quid apparatus istæ figuræ primæ, si duo tantum instrumenta ad opetandum sufficiunt? seruit ad fallendum patientem. Curro afferri sellam humilem, & articulatam, vt Barbi tonsores in constrictis habent, vertendo alterutrum latus, siue dextrum siue sinistrum, versus lumen atque fenestras, dorsum verò versus ianuam, idque ob hanc rationem, *ne ager in hac desidens ferrum candens ex culina afferendum videre queat*. Ego rectè collocato, de promo supra discum ligneum, & in mensa depositum instrumenta, *c. d. e.*, *ferramentum vero, a, in sacco absconditum seruo*, instrumentum, *b*, famulus *clam* ancillæ patientis tradit, & mādatur ipsi, vt illud benè ignitum reddat, *nec afferat, donec carbonem vinctum apportare iussa fuerit*. His peractis

peractis, famulus pro necessitate capillos abradit. Figur. IV. Ego autem fasciam. Fig. VI. linteum duplicatum (f. Fig. I.) & reliqua post operationem necessaria præparo, loquens interea cum patiente, de huiusmodi Chirurgiæ præstantiâ, & (si discendi cupidus, ut non raro fieri solet) de instrumentorum qualitatibus & alijs, quæ animum ab ignis timore præseruare possint. His præparatis, famulo clarè præcipio, ut ambabus manibus tempora firmiter teneat (vid. Tab. XXXI. Fig. II.) ut à tergo patientis me sistens, futurarum unctarum fissis (Fig. III.) inuenire inuentamque (Fig. IV.) atramento notare possim. Dum locus signatur, voco ancillam, ut ignitabulum afferat, mensæ illud opponat, & vnum ex ferramentis, *c. d. e.*, moderatè tantum calefaciat; & à prætereunte, *adq. mensam pergens ancilla clam recipio instrumentum. b. opt. mè candens.* & ita ego vix animaduertente (credidit enim nondum calefactum esse ferramentum ad vrendum necessarium) *futura fonticulum coronalis paro.* Hic decipiendi modus etiam obseruandus in reliquis fonticulis, ad occultandum cauterium, & minuendum ignis timorem.

Fig. VIII. est *apparatus ad dilatanda capitis vulnera*, & abradendas rimas, quæ vitæque laminam non penetrant.

Fig. IX. In vulneribus capitis cum læsione cranij *ante omnia* capilli remoueantur, & caput abradatur, illud cum oleo rosarum humectando, *cum tali tamen cautela, ne pili aut oleum, quod vulneribus capitis non conuenit, vulnus ingrediasur*; deinde dilaretur vulnus in formam crucis, nisi futuræ prohibeant: altera post dilatationem die, sedes instrumenti atramento scriptorio dinigretur.

Fig. X. tertia post incisionem die *nigredo* ex atramento contracta, scalpris rasorijs abradatur. *Nota, quod in abrasione labia vulneris muniri debeant linteolis, velut in trepanatione Tab. XXXI. Fig. V.*

Fig. XI. ostendit *rimulam*, in medio sedis abrasæ, adhuc scalpris delendam. Si Chirurgus certus est, rimulam non penetrare, de rasionem non repetit, sed naturæ opus relinquit, *qua interdum squamam cum rimula, n. separare solet*; Si autem suspicio est, rimulam hanc penetrare, illam abradat, ut omnino euanescat, & cranium vbique æquale appareat, Figur. XII.

TABVLA XXXI.

*De apparatu & modo vulnera capitis in triangulum secandi,
cranium modioli perforandi, & caput fasciâ
cancro dictâ deligandi.*

FIG. I. est *apparatus* instrumentorum, ad capitis vulnera dilatanda, craniumque fractum perforandum, necessarius.

Fig. II. ostendit dilatationem vulneris in triangulum, scalpello Fig. I. a, *Cruciformem enim hic loci instituere sectionem prohibet futura coronalis, et musculus temporalis: sectio incipit à fröte, secus enim insista, incidantur musculi temporales: fibra transuersim.* Triangulus quæritur in latere fissuræ cranij dextro, quo modioli, quem futura coronalis lateris sinistri non admitteret, adhiberi possit: caput manibus tenetur, & puluinarî suffulcitur, vt firmum permaneat.

Fig. III. videtur *vulnus in triangulum dilatatum & cranium cura rima detectum angusta, per quam materia, quæ ad membranas descendit, euacuari nequit: ad rimæ igitur asterismo notatum latus, cranium trypano excidendum est, pro materiæ exitu.*

Perforaturus cranium accedat patientem instrumentis Fig. I. huius Tabulæ depictis, terebello scilicet, modiolo mare, b, scæminis duabus, c, d, specillis, e, f, volsella, h, & instrumento lenticulari cum vecte, i, instructus, deinde præparet, quæ disco Fig. IV. sunt apposita, & fasciam Fig. X.

Fig. IV. monstrat *vitrum aqua rosarum plenum, a, qua imbuuntur linteo labijs vulnerum apponenda; b, liuteolum sericum rubrum, oleo rosarum imbutum, & filo appensum, c, globulum, d, ex filamentis siccis, ad obturandum foramen modiolo faciendum, ne materia vulneris ad membranas cerebri descendat; globulos cranio denudato adhibendos, e, e, siccis enim conueniunt sicca; globulos item f, f, digestiuo g, illitos ad digerenda vulneris labia; linimentum simplex linteo inductum, h, & linteam triplex vel quadruplex: i, ossiculum, k, stylo ferreo, l, truditur ex modiolo scæmina.*

Fig. V. præparatis præparandis, suffulto capite, & labijs per linteo la munitis, Chyrurgus modiolum clauo præditum & asterismo Fig. III. notatum adhibeat, quo perforationem incipiat, quam scæminis finire debet. *Hic Chyrurgia tyrones Porralius admonet, cum secundum Hipp. Aph. 1. sect. 1. experientia sit periculosa, vt frequenter sese exercent in perforandis demortuorum cranij, supponentes, loco dura materis, cranio chartam papyraceam.*

Fig. VI. ostendit cranium ad rimæ latus modioli excisum.

Fig.








Fig. VII. Ora foraminis lævigantur scalpro lenticulari.

Fig. VIII. monstrat linteolum oleo imbutum, quomodo supra membranam demittatur *filo alligatum*, ut extrahi possit, extracto substituitur nouum quotidie.

Fig. IX est *fascia* quæ *cancer* dicitur, in vulneribus capitis *ad continendum omnium optima & accommodatissima*, in medio lata A. & in utroque latere quatuor habens capita, quorum duo incipiunt à temporibus, & desinunt in occipite consuenda D. duo oriuntur ab occipite, & combinantur in syncipite B. duo post C. & totidem ante aures E. deflectuntur, & sub mento colligantur.

Fig. X. est *caput fasciæ* cancro *obligatum*: combinantur 1. capita D. in occipite, 2. C. sub mento, 3. D. in syncipite supra frontem, & 4. E. sub mento: ligetur tamen caput delicate, *ita ut fascia quidem contineat, sed non comprimat.*

T A B V L A XXXII.

De ratione eleuandi vectibus cranium depressum, abruptendi forcipibus ossicula membranas cerebri pungentia, excidendi ferrâ versatili foraminum modiolis fractorum interstitia, & generali vulnerum capitis medela.

FIG. I. Depressiones cranij quando ob rimæ angustiam eleuari nequeunt vectibus, Tab. II. Fig. VII. & Tab. III. Fig. II. III. B. & IV. tunc ad rimæ latus sanum caluaria bis *vel quoties necessarium erit*, modio perforatur, deinde foraminum interstitia ferra Tab. V. versatili exciduntur, ut vectis necessarium genus cranio submitti possit.

Fig. II. Attollitur depressio cranij, triploidis (Tab. III. Fig. III. A.) cerebra.

Fig. III. IV. & V. monstratur vsus forcipum, quibus abscinduntur partim, & partim abruptuntur ossicula, quæ cerebri membranas pungere possint. *vid. infra obseru. Martini Kunzij & Michaelis Schneideri.*

Fig. VI. ossiculo forcipibus abscindendo *membrana custos* submittitur, ne ijs lædantur membranz cerebrum inuestientes.

Fig. VII. eleuatur cranium depressum vecte Parzi submisso.

Fig. VIII. Quod si forcipes superiores ad manum Chirurgus non habet, ossiculum etiam hac ruzo adprehenditur, & abscinditur forcice, submisso prius membranarum custode, ut Fig. V. cernitur.

Fig. IX. ferra versatili nondum instructus, duorum foraminum interstitium hac ferrula intercideret & eximere solitus sum.

Fig.

Fig. X. Interstitio foraminum exciso, omne vestis genus crabbio eleuando submiri potest: eligitur autem illud, quod magis est idoneum. *Ad hanc tabulam pertinet etiam fig. I. tabula sequentis, quæ indicat vsum terebelli, quo deletur punctura cranium non penetrans, vel adhuc dubia.*

Vt autem huius & præcedentis tabulæ figuræ, quæ de vulneribus capitis agunt, melius intelligantur, earum vsum breuiter ordine recolligam, morbos solucæ vnitatis in cranio, membranis & cerebro percurrans.

De vulnere capitis simplicissimo.

Vulnera capitis ex sola & simplici cutis incisione ad pericranium, *absque tamen huius detrimento*, deducta, omnique symptomate destituta, *vel uniuntur*, vnitæque conseruantur, aut futura, aut medicamento agglutinante, *vel per carnis repletionem curantur*: Posterior curandi modus priori tutior esse videtur, quoniam cute per integrum incisâ, ferè impossibile est, quin etiam lædatur pericranium.

De vulnere capitis cum offensione pericranij, alteratione cranij, & sede instrumenti.

Reliqua vulnera cum læsione pericranij, aut sede instrumenti, per carnis generationem curari debent: illa non consuuntur, nec agglutinantur turdò, ob tres causas, quas Hyer. Fabrit. ab Aquap. l. 2. *pentateuch.* c. 16. adducit; non hæc, vt operationes manuaræ, si fortè fuerint necessariæ, absque dolore institui possint. Cum igitur, prima læsionis hora, ad vulneratum, ex sola pericranij incisione, vocatus fuerit Medicus, vulnus *statim*, globulis ex stuppâ cannabinâ confectis, & albumine ouorum conuassato imbutis, dilater, quo sanguinis fluxus comprimatur, vulnerisque labia disiuncta teneantur, inungat etiam partes vicinas cum oleis adstringentibus calefactis, *ad præcauendam inflammationem*, applicetq; conuenientem fasciam (quæ cancer dicitur Tab. XXXI. Fig. IX. & X.) cum linteo triplici, ne partes læsæ ab aëre ambiente, qui vulneribus capitis est aduersus, magis lædantur; aut medicamenta vulneri apposita decendant: De fascia hic notandum, quod eius capita D. in occipite colliganda *debent consui, quoniam nodus aliàs multum ladit, et cum vigilijs dolores excitat.*

Secunda post offensionem dte, stuppam omniaque extranea remoueat, & constrictio sanguine, capillisque in arcem abrasis, vulnus linteamen-

ceramentis carptis, in globulos formaris, & digestiuo illitis, tractet, de super applicando ceratum diapalmæ forcipe perforatum, & vnguentum linimenti simplicis obductum, plagulam ex linteis triplici, & fasciam, non-neglectis etiam inunctionibus prædictis: atque ita pergendum, donec pus appareat bonum, *quod est album & non sætidum*.

Eo apparente, pro vulneris mundificatione digestiuo aliquid detergentis *quosdam* immisceat, donec omnino mundum fuerit, continuando vltim linteis triplicis, & fasciæ, cum inunctionibus.

Vulnere à sordibus deterfo, carnis generationi studeat, quapropter super labia vnguentum sarcoticum (*non oleum rosarum, quod quidam imperiti barbi-tonsoribus vtuntur*) filamentis aridis inductum apponat, desuper ceratum diapalmæ solum, dein linteum triplex, in vino rubro, vel decoctionis adstringentium expressum, & fasciam. His vtendum vsque ad perfectam carnis generationem.

Quod si os detectum ab aëre ambiente, vel alteretur tantum, *si per duas ei horas modo exponatur* vel etiam nigrescat, *si diutius ei expositum fuerit* tunc demum vndique abradendum, vel ad imitationem coloris, vel donec sanguis ex eo dimanet, *quando scilicet appareat pus bonum, & vulnus deterfum*. Hoc tempus si obseruet Chirurgus, vni ea vice derafum pulueribusq; cephalicis inspersum & filamentis aridis tractatum os; altera post derafactionem die, carne obrectū inueniet. Neque enim audiendus est Iacob Berengarius Carpenus, qui *Lib. de fractur. cran. c. 42.* singulis diebus os superficialiter alteratum, raspatório abradere præcipit: *quoniam derafio dicto tempore peracta est sufficiens, ante tempus vero debitum instituta sapius repeti debet non sine agri periculo*; quia hac ratione ferè ad diploidem paulatim deuenit raspatorium. Timidiore, desquamationem ossis alterati naturæ negotio relinquunt, sed curationem protrahunt.

Vulnus carne repletum tandem cicatrice est obducendum, aut linamentis aridis solum, aut etiam superimposito cerato diuino. Hoc curandi modo turissimo patiter, ac certissimo, præmissis tamen vniuersalibus & regimine rerum non naturalium benè obseruato, innumeros felicissime restitui. Ex quorum ordine adhuc in viuis sunt, Iohannes Petrus Vvils Vlmensis, qui An. 1643. die 13. Martij præter aliquot fracturas cranij, tria pericranij vulnera ex fustibus accepit: Dn. Ioh. Rudolph. Straus à Kasenburg, generosus, Comiris à Vvinsteyn Oeconomus, cuius pericranium propè futuram corqualem transversim incisum reperi, Anno 1645. die 13. Augusti Melch. Frick Fustlo Vlmensis, eodem anno & die vulneratus: Ioh. Bucher. Rusticus Achstettenis, qui propè musculum temporalem anno 1642. die 13. Martij vulnus pericranij accepit, & Erhardus Vvelfeker Bibergerensis, Oeconomus Domini Præfecti. N. Sals, qui anno 1645. Mense Junio

in cap. te latus, à me apud Larrunculatorem Olmensem tandem curatus adiuvante Matthæo Stœlzlin.

Apparens instrumenti sedes statim post vulneris dilationem, quæ scalpello fit, abradatur: deinde vulnus dilatatum, & cranium scalpbris deraſum medicamentis idoneis tractetur.

Vulnus capitis cum denudatione cranij, & rima capillari non penetrante.

QUod si Medicus prudens ad curandum vulnus capitis breue, cum denudatione cranij vocatus fuerit, quàm primum capillos abradat oleo communi humectatos, & ossis statim quam diligentissimè perquirat, *vel stylo exploratorio, vel oculis, vel utriusque simul*, & si fracturam seu rimam inuenerit, aut, ex antecedentibus & præsentibus symptomatis, fracturæ suspicionem habuerit, aut saltem de fractura dubitarit, vulnus statim, *contra vulgarem Barbisonorum consuetudinem*, scalpello recto (Tab. II. Fig. II.) in crucem (Tab. XXX. Fig. IX.) aut formam trianguli (Tab. XXXI. Fig. II.) ubi scilicet suturæ & muscoli, *temporales præsertim*, sectionem cruciformem prohibent dilaret, ut os nudatum operationes manuum necessarias (tuto & citra partium sensibilibus læsionem) per scalpra aut cerebram, admittat. *Si tamen abrasio cranij aut perforatio necessaria, sine vulneris per ferrum dilatione institui poterit, à sectione tunc plane abstinendum erit.*

Vulnere artificiosè dilatato; Medicus quamprimum eius labia & pericranium simul, *ungue pollicis & indicis digiti manus dextra*, à calvariæ substantia separet, super os filamenta arida ponat, vulnusq; reliquum globulis ex stuppa cannabina confectis, cui albumine madidis, & puluere stegnorico aspersis impleat, non solum ut sanguinem sistat, verùm etiam ne vulnus concidat, sed in proximam diem nullo negotio optimè pateat. Desuper mittat linimentum simplex paruo linieo inductum (*ut vulneris labia tantum comprehendat*) supra hoc Emplastrum seu cataplasma Hippocratis, cum decenti per cancyum deligatura, & partium vicinarum ex oleis adstringentibus inunctione, ad præcauendam inflammationem.

Alterâ die, remota stuppa, constricto sanguine, & expurgato vulnere ab omnibus extraneis, super rimam penna atramentum scriptoriû ducat, cranium filamentis aridis tractet, labijs verò digestiui quodam illitis, desuper applicito linimento simplici, Emplastro Hippocratis & fasciâ cancer dicta, cum prædictâ inunctione.

Tertiâ visitatione, religato vulnere, artibus ægri, *iuxta quasdam* lana oppilatis, cuiusque capite bene collocato, & puluinari fulcito, rimam, quæ atramentum scriptorium, aut potius typographorum, (quod

(quod Iul. Cæsar. Arantius *comm. in Hipp. de vulnerib. capitis*, ſcrip-
tario propter calcauthū, quod mordax eſt, præfert, labſorſit, ſcalpris
raſpatorijs abradat Tab. XXX. Fig. X. ſecundum longitudinem, à la-
tiori ſcalpro incipiendo, ac per gradus ad ſtriſtius, inde ad anguſtius
procedendo, donec rima penitus abdita ſit, & os ſub ea ad album &
ſanū appareat, quod certiffimum & demonſtratum ſignum eſt, rimā
deſaſam non penetraviſſe. Inter operandum ſcobeſcē ſæpius detrahāt à
ſcalpris, & cautus ſit, ne ijs cutim aut pericranium ledat: quod cui-
tabit, ſi caput patientis ſub operatione quietum perſtiterit, labiaque
vulneris per lintecola parua vndiq; munita fuerint. Tab. XXXI. Fig.
V. Alij raſpatoria ſæpius oleo roſarum imbuunt, quo facilius curāt:
at quia huiusmodi inuēſtio ſcalproſij acie retundit, illa mutare ſoleo.

Oſſi decenter & ſufficienter deſaſo filamēta arida apponēda (*cra-
nio enim nudato & deſaſo non convenit digeſtium, nec vnguentum
aut pingue quicquam*) labijſq; digeſtium linamentis carptis illitum
admoûdum, deſuper linimentum ſimplex, cataplaſma Hip. & ſaſcia
cancer dicta, cum ſolita inuēſtione ex oleis, fluxionem atcentibꝯ.

Apparente pure laudabili, digeſtuo aliquod detergens immiſcep-
dum, hunc omnino purum euadat vulnus. Vulnere deterſo, tunc
oſſi deſaſo pulueres cephalici inſpergendi, filamentaque arida adhi-
bēda, labijs verò vnguentum ſarcoticum cum cerato diapalme, li-
nteo triplici in vino decoctionis roborantiū expreſſo & ſaſcia, *omiffis
oleis*. Vulnus carne repletum, per epuloſica nota, cicatrice obducen-
dū. Hoc modo tractatus, & curatus fuit Ioh. Rudolphus Straus à Ka-
ſenſburg, & Caſparus Mirſh, molitor Xenodochij Ulmenſis, qui rimā
capillarem non penetrantem paſſi ſunt, propè ſuturam coronalem.

Vulnus capitis cum fractura Calvaria capillari penetrante.

Cum autem, dum tentatiuè ſic ſcalpris operatur Medicus, inuē-
niat rimam, quæ ſecundam laminam peſſetret, eam nequaquam
raſpatorijs temere tentet (*quoniam ijs membrana cerebrum inueſtien-
tes facile offendi poſſunt*) ſed relicta omni Chirurgia, procedat exſic-
cantibus, quibus ſolis ſæpiſſimè agrotantes curantur; nec enim ſi
maturè inſtituitur deſaſio, timendum eſt, qui in natura materia, quæ
per rimulam ad craſſam cerebri membranam (*dubio procul in parua
quantitate*) deſcendit, poſſit reſoluere; neque etiam poſt deſaſionem,
dura mater per rimulam in ſecunda lamina remanentem quidquam
recipit, quoniam excrementa vulne riſ ad deſluxum apta, filamentis
aridis quotidie exſiccantur.

Interdum oſ ſcalpris deſaſum, & exſiccantibus tractatum ſqua-
mam ſeparat, et via, pro materiæ ſupra membranam collectæ exitu,

sit sufficiens. Hanc separationem obseruauit in *Georgio Oturzel*, qui Anno 1639. in dextro sincipite rimam capillarem, *qua tamen utramque cranij tabulam penetravit*, perpeßus, post deraßionem rimæ ad internam vsque laminam, & spontaneam desquamationem, felicissimè curatus fuit, in Nosocomio patrio.

Quod si symptomata grauiora rimam in secunda lamina comitantur, quæ materiæ copiosam inter crassam membranam & cranium collectam arguunt, *remotis scalpbris, cranium incuruenter* trypano perforandum est, iuxta Hipp. dictum text. 2. de vulneribus capitis; postquam scalpro os deraßeris, si tibi exigere sectionem videtur, secare debes, neque pati, vt res tertium diem excedat, priusquam seces, sed intra id spatium secabis.

Vulnus capitis cum evidente, sed angusta cranij rima.

Q Vando ictus ratione, ex instrumenti qualitate, & accidentibus superuenientibus, certum est fissuram penetrare, tunc *magna sane diligentia* exploret Chirurgus & consideret, an rima sit satis lata pro euacuatione materiæ, quæ per ipsam ad membranam cerebri crassam defluxit, nec ne? non satis lata Chirurgiam trypano instituendam exipit. Medicus igitur ante omnia *predicat periculum, ut sermones stolidorum vitentur*; angustiores enim cranij fracturæ maius habent periculum quàm latiores; nam rima stricta materiæ exitum prohibet. Deinde statim vulnus ad operationem in cranio peragendam, nimis angustum scalpello in formam crucis, aut trianguli (*eam scilicet quam locus affectus permittit*) dilatet, labia vulneris, panniculumque cranij vnguibus ab osse diuellat; quo facto, ossi linamenta sicca, labijs verò itegnotico imbuta apponat, & in reliquis procedat, *veluti in curatione vulneris pericranij*.

Secunda, *vel ad summum* tertia post læsionem die *in punctura præsertim dura matris ab ossiculo* cranium modiolis, dum vires adhuc constant, perforandum: post triduum enim, & quamdiu adest aut imminet inflammatio, modiolorum vsus est periculosus; neque audiendi sunt, qui iuxta sententiam *Pauli l. 6. c. 90.* æstate diè septimã, & hyeme decimam quartam expectant, quoniam eo tempore iustituta perforatio quandoque serum præbet auxilium, vires enim tunc debiles & suspicari licet, cerebri panniculos à materia iam infectos. Quare Chirurgus in principio vocatus, acceleret (*sagiendo saltem*) iuxta quosdam plenilunium, quoniam in eo cerebrum augmentatur, & cranium appropinquat, ita vt Chirurgus modiolis *ab æstatis* non instructu, sillud cum membranis faciliè lædere possit) operationem (*maxime verò in compressione & punctione panniculorū*; quia ad ista citis-

ciriffimè fequuntur apoftemata, & acci dentia mala, monente Guido-
ne de Cauliac *de vulnerib. c.*) remotis è vulnere remouendis, capite
immobili reddito, labijsque per linteola *artificiofè* contectis Tabul.
XXXI. Fig. V. (*ne vel ab ambiente aère refrigerentur, vel ab instru-
mentorum contectu offendantur,*) cranium aperiendum, & terebra
propè rimam Tab. XXXII Fig. III. in loco decliuore (nifi cum pro-
hibeat futura, quæ cercis de caufis, quantum fieri poterit fugienda
eft,) pro faciliiori exitu materiæ fupra crallam membranam collectæ.
Primò autem adhibendus modiolorum mas, in cuius medio clauus
eft, & debitè circum voluendus, donec tale cranio imprefferit *ve-
figium, vt ei modiolus famina firmiter infiftere poffit.* Dein remoto
mare, trypani vertibulo modiolus fœmina dictus eft adaptandus, què
fortiter & aqualiter, vt mafculus circum voluendus (donec ad lami-
nam vitream deueneris) & per interualla commutandus, ne circum-
ductione nimium incalefeat. Immerfionem modiolorum in oleo an-
tiquam recentiores reprehendunt, eo quod oleofa offibus fint inimi-
ca, & instrumentorum aciem obrundant. Cum ad vitream peruene-
rit, non folùm cautius & mitius terebra comprimat, verùm etiam
fapius eximatur ad coniectandum, quantum offis perforandi adhuc
fuperfit. Nec imitandus Glandorpius, qui perforando pergit, donec
excifa pars cranij trypano adhæreat: fed fi os ferè excifum vacillare
incipit, Chirurgus vècte omnium minimo, & debiliſſimo Tabul. II.
Fig. VII. (*inter os vacillans & firmum miſſo*) illud hinc indè moueat,
& voſellæ parte dentata extrahat.

Nota, propter fanguinem inter operandum ex diploide proma-
nantem, operatio non eft differenda, *ſed cauè acceleranda.* Sanguis
enim poſt perforationem & officuli detracti onem, fupra membra-
nam delapſus goſſipio ſpecilli cochleæ circumuoluto leuiter abſter-
gendus, foramenque modiolis factum globulo ex filamentis aridis
obſtruendum, & ſtatim fluxus iſte ſiſtetur.

Finita perforatione, & fanguine firmiter ſubſiſtente, aſperitas fora-
minis instrumento lenticulari leuiganda Tab. XXXI. Fig. VII. Si v-
num foramen modiolò paratum nouum videtur ſufficiens, & alte-
rū erit faciendū: vt ex *Hiſtoria Happelij, Hebiehri & Schneideri in-
fra patebit.* His ritè peractis, fupra membranam duram per foramen
demittatur linteolum ex ſerico rubro, vel lineo albo, inſtar orbis ro-
tundū, filo alligatū (*vt extrahi poſſit*) oleoq; roſarum completo & ca-
lefacto immerſum Tab. XXXI. Fig. IIX. vt materiam deſcendentem
in pus conuertat, & membranas ob motum, ab illiſione offis deſedat.
Linteolo immiſſo, foramini globulus ex filamentis ſiccis inſedus, ne
pus in vulnere genitum ad membranam cerebri deſcendat: offi dete-
cto linamenta arida, labijs digeſtiuo quodam illita adhibedāz deſuper

linimentum simplex (ne pus includat) perioratum cataplasma & fasciâ, cum inunctione partium vulnere proximarum, ex oleis repellentibus, ad arcendam phlegmonem. Hic medendi modus strictè observandus, donec periculum inflammationis deficiat; & *admonendus* æger, ut quotidie, religato vulnere, materiæ ad membranas cerebri defluxæ egressum, expiratione per narces, ore clauso, promoveat.

Apparante pure laudabili, supra membranam crassam, loco olei rosati, mel rosaceum colatum, cum liurcolo, quod filo alligatur, est demittendum, ossi filamenta, sicca, & labijs digestivo quodam detergente imbuta apponenda, pro mundificatione membranæ crassæ & vulnertis: externè continuandus etiam vsus linimenti simplicis, emplastri Hippocratici, fasciæ & olcorum adstringentium.

Si vulnus mundum, & membrana à sordibus deterla, conspicitur, *omisso serico, vel lineo lineto & melle rosaceo*, foramini globulus ex filamentis aridis indendus, os detectum pulvere cephalico aspergendum; ossi præterea filamenta arida, & labijs vnguento quodam sarcootico illita admouenda, atque desuper ceratum diapalmæ cum linreo triplici, ex vino decoctionis capitalium subro expresso, & conuenienti ligaturâ apponenda sunt. His petgendum, donec os carne bonè tectum, & vulnus ea repletum fuerit. Tandem epuloticis cicatrix inducenda est. Hanc medendi rationem optimam inueni in Georgio Seiz Rustico Idelhusano: de quo vide Gregor. Hostij observationem Chirurgicam XX.

Vulnus capitis cum fissura cranij penetrante, & satis hianse.

SI fissura hiât, ut pus per eam liberè possit expurgari, neq; perforatione cranij, neq; dilatatione vulnertis per scalpellu, (*qua propterea vnicè instituitur*) opus est: Vnde eos animaduersione & reprehensione dignos rectè iudicat Chalmetæus, qui non tantum in parua cranij fissura (*tametsi non penetret*) etiam etiam in maxima rima *satis audacter* modiolum adhibent; quo errore nō mediocri, curationi in longissimum tempus protrahitur, cum summo *agrotantis damno*, & *fama Medici naufragio*: quæ incommoda, an ignorantie, an auaritiæ medentium adscribi debeant, anceps hæreo. Cum igitur fissura magna modiolum reijciat, quid *M: dico cordato & prudenti*, in simili casu, tentandum erit? sequatur *strictè* curationem fissuræ angustæ, post modiolorum vsu necessariam, & (*omisso tamē trepāno tanquā superuacaneo & noxio*) supra membranam crassam demittat linetolum oblongum, magnitudini fissuræ respondens, filo alligatum, & oleo rosaceo imbutum &c. Hunc curandi processum extollet, adhuc superstes Iohannes Vnmander, Ratiarius Kirchdorfsensis, in cuius finistro syncipitis latere (anno 1633. Mense Ianuario) fissuram inueni (*tam latam, ut digitū maiori proximū facillimè imponere possis*) cum

enim ingenti duræ matris inflammatione, quæ præmissis vniuersalibus, ex olei rosati, cum linteolo serico tepide admoti, & cataplasmatibus Hippocratici diligentissimo vsu, post triduum euauit.

Vulnus capitis, cum læsione dura matris.

Supra vulnus duræ matris, cum rima cranij satis hiance, demittitur pariter linteum sericum, oblongum, filo alligatum & oleo rosarum imbutum: apparente pure bono, linteum nouum melle il-linendum rosaceo, & supra membranam demittendum, quâ detersâ, vulnus eius vnguento de betonica liquefacto, & per foramem tepidè infuso incarnandum. *Ceterum os & vulnus externum tractetur, vti supra in fissura cranij penetrantis, & satis hiantis cura indicabam.* Cam verò fissura fuerit angusta, vt solutæ membranæ crassæ topica applicati nequeant, tunc vulnus scalpello debitè dilatetur, caluariâ inodiolo perforetur, omniaque obseruentur, quæ supra de curatione rime angustæ leguntur.

Vulnus capitis cum læsione pia matris & substantia cerebri.

Vulnera piæ matri vix infliguntur, absque offensione sibi subie-cti cerebri, quare abstinendum ab omnibus oleosis & pinguibus medicamentis, propter quâ substantiam cerebri faciliè putrescere verè scribunt: quidam etiam mæl rosaceum, ob suam aerimoniam & calorem, reijciunt, & ipsi syrupum ex rosis substituunt: in huiusmodi tamen vulneribus, & syrupo & melle rosaceo sapius, & nunquam cum noxâ aliqua vsus sum. Præ reliquis tamen remedijs non satis laudare possum illud vnguentum, quod Hieron. Fabricius ab Aquap. li. 2. sui Pentateuchi c. 20. describit, & felici successu sæpius adhibuit: cuius & ego virtutem expertus sum in Michaele Schneidero, de quo infra singularis extat obseruatio. *Vulneri & rima prospiciendum, sicut in vulnere dura matris monitum.*

Vulnus musculi temporalis, cum læsione pericranij & vasorum.

Vulnerum capitis periculosissima sunt ea, quæ musculi tempo-rale patiuntur: velantur enim externa sui parte pericranio, quod super ipsos vehitur & inuoluit: in interna verò parte nudi sunt, & nudo immediatè accumbunt ossi: Undè probè obseruandum si pericranium (quod dictos musculos inuoluit, ab interna cerebri crassa membrana, per suturas cranij ortum) vel leuiter saltem inflammabitur, quod statim in consensum trahit membranam cras-

sam & tenuem, ipsiq; subiectam cerebrum; periculosa etiam sunt musculorum temporalium vulnera, ob sanguinis profusum, ex arterijs incis, quod selectissima & nunquam vix sinit stegnotica. In simili casu nihil præstantius inueni emplastro Galeni (cuius encomium videatur apud Zacharum L. primum Prax. Med. admirant. li. 1. obseru. 85) ex aloë, thure, pili-leporinis exactissimè trituras, & cum oui canthido mixtis, quo vulnus impletur, ad obturandas arterias: quo pretiosissimo remedio si sanguis non supprimeretur, ob erupulam aut furorem, valdè ebulliens optimo successu exhibentur gregiij. spermoli compositi Crollij, & circa collum applicatur emplastrum (cuius mentionem facit Censlon s in sua Idea Medicina, c. de Hamorrhag. narium) ex argilla furnacea, cum aceto rosarum acerrimo compositum, & fasciæ quatuor digitos transuersos latæ inductæ, & quoties exsiccatur renouatum, donec sanguinis fluxus, serè post horum dimidiam, vel etiam citius, mirabiliter consistat. Hæc tria autem remedia hic obiter annotare placuit, quoniam non solum insistent. lo temporum sanguinis fluxu miram vim exerunt, verùm etiã deploratam natium, vel gingivarum hæmorrhagiam, quæ extractione dentis violentam sequitur, infallibiliter compescit, vt testabitur Iohann. Iacobus Maner, textor Vlmenfis, & Gallos Breittinger, Rusticus & caupo Dornenstattenfis. Pulvis ore assumptus sanguinis ebullitionem refrenat, Emplastrum vulnere impositum, vasorum incisiones congruat, & illud collo applicitum sanguinis ad caput fluxum intercipit. Hoc vulnus (vt & profundiores plagæ absque tamen læsione cranij) consistente sanguine per primam intentionem curari minimè debet, sed, contra Vesalium, carne impleri, & dein cicatrice obduci, summopere cauendo, ne ipsi inflammatio superueniat, quæ emplastro Hippocratis archeda & deprellenda.

Vulnus Musculi temporalis superficiale.

Primò sanguis sistendus stuppis oui albumine imbutis, & pulvere Galeni adstringente aspersis: altera die ablatis stuppis, labia vulneris ad mutuum contactum vnienda linteolis, cerato diapalmæ obductis, & in crucem applicatis, & partes circumcirca inungendæ oleo rosarum, ad arcendum phlegmonem: supra linteola emplastica etiam, ne decidant, ponendum est medicamentum, quod facultatem habet reprimendi homores (quale est linimentum simplex, vel album coctum) & fascia cancer dicta.

Vulnus musculi temporalis, cum cranij rima angusta.

CVM autem cranium sub musculo temporali rimam conceperit, non statim conuenit carnem producere, sed rimæ quantitas expendenda, an sit lata, vel angusta, aut capillaris? Si capillaris est rima, & vulnus angustum, tunc illud globulis ex spongia paratis, *si modo possibile*, prout opus, dilateretur: sin minus possibile, cutis scalpello vsque ad os cranij incidenda est, *causè tamen, ne aut vasa aut musculi fibra per transversum incidantur*. Si igitur Chirurgus vulnus in tempore dilatandum, cum rima cranij capillari, occurrat, statim prædicat inflammationem & conuulsionem partis oppositæ, dein illud (*frustra prius tentata d. latatione per spongiam*) secundum fibrarum seriem incidat, *ne accidentia prædicta, si forte supernenerint, artificiali vulneris dilatationi adscribantur*: quæ prognosis, in Germania præsertim, ubi Chirurgicæ operationes, non sunt adeò consuetæ, sicut in Italia & Gallia, *diligentissime observanda*. Vulnere itaque secundum fibrarum ductus dilatato, carne musculosa ab osse separata rimaque diligenter derafa, in reliquis procedat Chirurgus *vti supra in curatione vulneris, cum rima capillari & angusta, didicit*.

*Vulnus musculi temporalis, cum rima cranij
satis patente.*

CVM sub musculo temporali rima cranij satis hiat, vt materia, quæ ad duram membranam delapsa, sufficienter possit expurgari, *tunc neque vulnus scalpri deradendum, neq; cranium ad latus rima modiolis perforandum*. Recedit enim operationes (ob rationes supra, in cura fissuræ magnæ, allatas) in rima magna reprobantur.

*Contusio capitis sine laceratione cutis introcessione cranij,
& suspitione alicuius fissuræ.*

MIRABILI successu curatur recens mactatorum animalium pelli-
bus, præsertim verò canis vel muris, quæ contusiones, dum adhuc calent, adhibetæ, & *per viginti vel plures horas relicta* egregiè dissoluunt. Si contusio vnica pelle in totum non discuriatur, altera ipsi admouenda. Cum verò non cuiusvis sit canem excoriare, semper elegi *pellem agninam*, quæ omnibus ferè horis potest acquiri, & reliquis parem digerendi facultatem obtinet.

Hoc vnico, & expertissimo (*nunquam enim sefellit*) remedio, præter multos pueros & adultos, curavi puellam fabri lignarij 4. au-
notum

norum, quæ ob casum ab alto, magnam supra bregma contusionem passa est, quam Medicus quidam obuacula aperuisset, nisi ego ipsi adiunctus apertionem dissuasissem *ex Hippocratis sect. 8. Aph. 7.* quo implicitè docet, nullum affectum requirere chirurgiam, nisi medicamentâ ipsi frustra fuerint applicitâ. Cum igitur symptomata sectionem virgettia absuissent, nec vllum remedium topicum adhuc frustra applicitum, ille, spreta Chirurgia, pellem agnitam apposuit, eiusque miram efficaciam (*non solum in hac puella, verum etiam posthac in adultis non raro*) expertus, mihi sæpissimè gratias retulit maximas, pro dato consilio & auxilio. *Quapropter adhortor chirurgi tyrones, ut nunquam contusiones, aliosue tumores, scalpellis aperiant, nisi eis topicis rebelles immaniant.*

Depressio cranij simplex, sub integra cute, in pueris.

OB contusiones cranij, integro sub corio, patitur nonnunquam depressionem simplicem, & citrà rimam; interdum fissuram solam, quandoque fissuram & depressionem simul. Depressio citrà fracturam in solis contingit pueris; rimâ verò tam simplex, quam cum introcessione, adultis sæpissimè euenit.

Cranium in pueris sub illâ integumentis, & citrà diuisionem expressum, ita vt tangētibz vel inuentibus sœuea mediocris (& *quam nulla praua sequuntur symptomata*) appareat, Paræus l. 9. c. 3. cucurbita communi in suum situm naturalem optimè reducit. Ingeniosissimus noster Hildanus, in eundem finem excogitauit duò præsidia, cucurbitam nimirum cornéam, & Emplastrum, quibus nihil conferētibz, ad sectionem cutis, & eleuationem ossis, per suam triplidis cerebram, veniendum esse censet *ren. 2. obs. 5.* quæ duæ tamen operationes mihi neque necessariæ, neque fructuosæ, videntur. *Non sunt necessaria*, quoniam depressiones in pueris tales, quæ cerebrum eiusque ventriculos comprimunt, quò minus spiritus animales elaborari, elaboratique in totum corpus distribui possint, sunt incurabiles, *Non fructifera sunt*; quoniam primo, *secte Hippocratis*, vulneri capitis simplicia, & ex sola cutis incisione, *Medici negotium, & ægrorum periculum*, afferunt: absque autem dubio negotium illud, & periculum angebitur, quaiidò, præter cutim, etiam perierantium & os, & *infinitum*, intudieat. Quia secundo, dum eleuatissimum centro depressionis intelligitur, *fores cranij facile intrescit*: Quia tertio, cum torcular cranij adhuc *reuerit* & *muti*, ad diuisidē vsque vi quadam debeat infigi, certè timendum erit *hydrothoracem* eleuatorij triplidis torcular *aperturam* non esse interna cranij tabulam perforet, & cuspide membranam crassam lēdat: Quia quarto, os tenerum adri exponitur,

etur, unde higrædinem concipit, quæ corruptionis nota est: quæ corruptio si naturæ separanda relinquitur, nõ ra tõ interiora versus serpit, ita vt deratione per scalpra vel excisionem eum modiolis in hoc casu periculosam expostulet: neglecta autem Chirurgia vulneris curatio, cum periculo patientis, producitur. Qui autem os cranij puerilis depressum superficialiter corruptum scalpri abradere sibi proponunt, incrementum foveæ expectent; Hinc sapientis est medici, omne potius operã manualemente omittere, quam nihil prodesse possit, quã rationales Medica artis administrationes aliqua insania nota afficere.

His ego rationibus motus, in depressionibus puerorum, sine rima & scæuis accidentibus, ab omni Chirurgia abstineo, & crebra experientia suffultus, circa depressionem capillos abradi euro, & pellem agni calidam, cum decenti fasciæ cancer dictæ ligatura, adhibeo, inunctis partibus vicinis, collo & temporibus præsertim, eum oleis adstringentibus, ad impediendum humorum influxum, & præcauendam inflammationem. Si prima vice pellis tumorem non cõsumpserit, aliam applico, relinquendo eam per diem iterũ naturalem; Discusso tumore, si fovea sacta parua deprehenditur, nullaque symptomata grauia adfunt, quæ partium sub cranio noxam portendant, pellis agninae eeratum diapalmę Galeni linteo latiori inductum substituo, pro corroboratione partis affectæ. Hanc medendi rationem tutissimam esse, pluries mecum obseruarunt chirurgi illi, qui mihi in eiusmodi casibus sæpissimè adstiterunt, inter præcipuos Vlmæ sunt, peritissimi præ cæteris Chirurgi Georg. Riedlin, & Nicol. Reutte, quos testimonij causa nominare placuit. Modum quoque medicamentis tuto, nec magno quidem negotio, graues collisiones puerorum feliciter ad sanitatem restituendi, inuenient Chirurgiæ Tyrones apud Iulium Cæsarem Arantium, ad calcem doctissimi sui commentarij in Hipp. librum de vulneribus capitis &c:

*Contusio capitis cum depressione, sed sine rima cranij,
sub integra cute in adultis.*

IN adultioribus eiusmodi foveæ sub integra cute, rarissime (in ijs nimirum, quibus natura molle dedit cranium) vel certe nunquam sine rima, in cranio reperiuntur: si enim post dissectionem cutis rima in externa cranij lamina non apparet, timendum erit, ne interior tabula fissuram patiatur, per quam materia ab eerebrum quidem descendere, sed iterum per eam euacuari minimè potest. Huiusmodi fracturam obseruaui Anno 1632. Vlmæ in milite Suecico, qui ob depressionem cranij, secundo decubitus die, mortuus est. Ego sciendi cupidus, quæ tam citæ mortis causa extiterit, cranium ferrà di-

uisi,

uifi, & inueni eius interna laminam non solum fissam, sed etiam ossiculum (quod absque dubio cerebri matres assidue pupugit) de se remittentem, integra existente externi cranij lamina. Quoties igitur in adultorum capitibus talis apparet fouea, certissimum est caluariam esse diuisam: Nisi enim fissum esset cranium, inquit Hipp. medium desiderare nequirit. *Sed posito, nondum tamen simpliciter concessa*, dari introcessionem cranij sicciotis sine rima, illa soli naturæ negotio (*ut Felix Viriarius precipit*) committenda non est, sed cutis statim scalpello in triangulum, vel crucis formam, incidenda, pericranium à cranio separandum, vulnusque hians globulis conseruandum, non solum ut Medicus certior fiat, an cranium sit fissum, verum etiam, ut si depressionem comitetur rima (*quod maximè timendum*) vectis conuenientis instrumentum adhibere possit.

Altera, post incisionem cutis vsque ad cranium, die (*si rima nulla in externa lamina oculis conspicitur, nulloque specilli globuloprehenditur, nec aliquam, ob symptomata suspicari licet, hac integra existente, internam caluariæ tabulam esse fractam*) sumatur Terebelli (Tab III. Fig. I.) pars triangularis, alterismo notata, qua cranium in centro depressionis, modo non ultra laminam externam leniter perforetur. Facto per terebellum foramine, terebra triploidis paulo altius est infigenda, beneficioque superioris cochleæ tandiù circumuoluenda, donec infigatur parùm internæ laminæ. Deinde cranium depressum, inferiorem triploidis instrumenti cochleam deorsum uoluendo, perpendiculariter erigendum. Cranio, quod erat depressum, eleuato, instrumentum triploidis remouendum, vulnusque tractandum, *ut supra de cura vulnerum capitis, cum denudatione cranij & sede instrumenti legitur.*

*Contusio capitis in adultis, cum depressione cranij & fractura
lamina interna, circa vulnus cutis & rimam
lamina externa.*

Cum, cute capitis artificiosè incisa, exterior lamina apparet integra, & depressionem mala comitantur accidentia, dubitandum non est, quin tabula interior aliquam patiatur noxam: quare cranium in medio depressæ terebræ triploidis affixum non erigatur, sed ad latus depressionis trepano perforetur, ut materia, quæ, per fissuram laminæ internæ occultam, ad cerebri crassam membranam defluxit, exitum habeat, & cranium, quod introcessit, necessarij vectis operâ eleuari possit.

In contusionibus capitis, cum fouea, in homine adulto, cutis integra in crucem, vel triangulum, incidatur, aut eius vulnus, pro trepano

pano & vecte adhibendo non satis latum, scalpello dilatetur. In contusionibus vero sine fouea, neque scalpello, neque trypano, neque vectibus quidquam est tentandum, sed sola pellis agnina contusioni apponenda, nisi symptomata superueniant, quæ fracturam cranij indicant, scalpro vel modiolis opus habentem.

Introcessio cranij, cum rima in medio depressionis lata.

SI depressioni calvaria iungitur rima (quæ, nisi sit satis hians, cranij denudationem à pericranio requirit) evidens, ea est vel in medio depressionis, vel ad latus. Quæ in medio depressionis, ea vel est lata, vel angusta. Si rima est lata, & depressio modica, cranium eleuetur vecte, Tab. II. Fig. VII: quando rima lata, & depressio modica maior apparet, submittatur vectis robustior Tab. III. Fig. II. Quod si, cum rima lata, multum introcessit calvaria, tunc allegati vectes parum valent, quare triploidis eleuatorio Tab. III. Fig. III. B. erigenda est.

Introcessio cranij, cum rima in medio depressionis angusta.

AD depressionis terminos, cranium modiolis excidatur, dein duorum foraminum interstitium *ferrula mea versatili* Tabul. V. sine omni lisionis metu, auferatur, non solum, ut prædictorum vectium aliquis cranio submitti, verum etiam, ut ossicula, quæ interdum ab interna cranij lamina separantur, & instar aculei crassam, vel etiam tenuem, cerebri membranam pungunt, vossella eximiqueant.

Introcessio cranij cum rima, ad latus depressionis lata, & angusta.

Rima in medio depressionis vel est lata, vel angusta. Si lata, tunc vectis conueniens cranio submittatur. Si angusta, similiter ad rimæ latus sanum & detectum calvaria modiololo perforent, & vectium beneficio erigatur. Si vectis per vnum foramen sub iussu, cranium attollere nequit, paretur etiam foramen secundum, dein foraminum interstitium *ferrula versatili* separetur, ut in quorunque fissuræ dilatatæ loco necessarium vectis instrumentum applicari, eoque cranium reduci possit.

Vulnus capitis cum dedolatione cranij.

NUllum operationem manualementem exposcit, sed carne obducenda ut caluaria scalpri recens derafa: vid. infra obseruat. Alphons. Schadzi, Faticij, Vlmenfis.

Contraffissura.

QUam Hippocrates *calamitatem* appellat, inuenta curatur, ut contusio cranij cum fractura, sub integra cute; incisione nimirum cutis per scalpellum, separatione pericranij ab osse, & (si rima penetrans fuerit angusta) cranij perforatione, per modiolos, &c.

[*Punctura cranij non penetrans, & penetrans.*]

Terebellis videatur Tab. XXXIII. Fig. I. punctura quæ non penetrat. Cum verò utramque perforat laminam, cranium modiolis aperiatur, adhibendo ipsi puncto clauum modioli maris, donec vestigium aderit, cui forminx possint insistere: quæ duæ operationes ut citò, tutò & iucundè peragantur, pericranium ab osse separandum est.

Traditus curandi modus fracturas & vulnera capitis, certè præstantior est eo, quem Felix Vvürtzius *l. de curat. varior. vuln. c. 7. & 9.* commendat, nostrique passim in Germania barbitonfores, tanquam Apollinis oraculum sequuntur, non raro tamen cum magno & grotantium vitæ periculo. Neq; miror, quod curatio votis sepius non respondeat, cū citatus Vvürtzij locus multos errores contineat, quos tyrones animaduertent, si breuem, & Hippocraticam operandi & curandi rationem, cum Vvürtziana, vel obiter saltem, cõtulerint.

T A B V L A XXXIII.

De abrasione punctura cranij, sectione vasorum temporalium, curatione ancyloblephari, suffusionis persellæ, & ei-gilepis, ratione firmandi oculum.

FIG. I. ostendit, quomodo punctura cranium non penetrans, post sectionem cutis & detectionem ossis, Terebello, Tab. III. Fig. I. deletur.

Fig. II. digitus, pilis derafis, locum sectionis, vasorum temporalium, qua sit inter verticem, musculumq; temporalem & frontis, inquit: explorat etiam, an vas ipsi subiectum sit vena, vel arteria. Si maxilla inferiore mora digito præsentitur musculorũ temporalium motus,

in

TABVLA XXXIII





in altiore loco vena vel arteria querenda est : vas est arteria, si percipitur pulsus, vana si nullus.

Altera manu curatur *ancycloblepharon*. Palpebræ autem vel inter se, vel cum alba, aut cornea, aut vtraque oculi tunica, coalescunt. Palpebrarum coalitus inter se curatio, peragitur scalpelli falcari (Tab. VIII. Figur. VIII. cuius apici annexus est pusillus & acutus ex argento globulus) operâ, qui immittitur ab interiore angulo, ubi nunquam ferè cohærent, inter oculum & palpebras (irâ vt partem retusam oculo, & secantem palpebrarum commissurâ opponat) vsque ad exteriorem: deinde digito locus incidendus pertentetur, antequam secatur, quo percepro palpebrarum commissura incidatur. Sectione factâ, inter vtramque palpebram lincimentum interponatur, ne denuò coalescant.

Vbi palpebræ tunicis oculorum adhærent, aduersus scalpellum (*qui nihil aliud est quàm latior specilli pars* Tab. VIII. Fig. VI.) magna moderatione inter palpebram & tunicam oculi immittatur, quo separantur ea, quæ cohærent, sine læsione, si fieri potest, vtriusque partis. Si tamen aliquam lædere fuerit necesse, potius palpebra adnata, quàm oculus incisionem pariat. Post liberationem verò oculi à palpebra, interponatur etiam lincum mundum, ne iterum inuicem glutinentur.

FIG. III. in dextro oculo exhibet suffusionem in Figur. IV. acu deponendam; insuper tuberculum tunicatum, inter nasum & sinistri oculi maiorem Angulum, subortum, & ad interiora ruptum (quod *ægyloperon* vocant) curari medicamentis nequit, vnde tuberculum vossellæ dentibus apprehenditur, & in fundo circumciditur scalpello (Tab. II. Fig. I.) ita tamen, vt aliquid de caruncula (spongiola) relinquatur, secus enim perpetuum sequeretur lachrymarum profluuium per genas.

FIG. IV. docet, quomodo antè depositionem suffusionis perfectæ, oculus sanus gossipio & fascia claudatur; locum quoque ubi apponitur acus, (Tabul. VIII. Fig. IV.) quem describit Albucasis l. 2. c. 23. *segg. verbis*: pone acus extremitatem propè tunicam corneam, per crassitrem radij (seu specilli obtusi) in ipsa albedine oculi, quæ respicit minorem seu externum angulum.

De suffusione.

Cataractæ perfectâ, maturâ & consummatâ, quæ in pelliculam vt vocant, concreuit hanc ab ambitu pupillæ, cui accreuit, secer-
nere, immissa acu per tunicam corneam, vltimum est remedium: quod si feliciter succedat, eo momento, quo fractio facta est, visus restituitur, *Antequam verò incipiat operatio, Oculista consideret.*

an unus, vel uterq; oculus, patiatur. Quod si utroque oculo obducto, patientes cæci penitus exsistant, faciliior sit ad opetaudum, quoniam peius metuendum non est, licet non benè succedat operatio. *Vnico* verò tantū laeso, cum sanus ad visionē sufficiat; minus temere opus tentandū, præferim si pellicula seu tela non omnino concreta, qua interdu trīū, quatuor, quinque aut pluriū annorum spatio vix perficitur. Neque tamen materia pelliculam efficiens, vilo modo incrassanda, veluti hanc quæstionem Iohann. Baptista Siluaticus Controu. 56. elegantissimè decidit Et licet plerique Authores requirant mediocrem humoris concretionem, experientia tamen constat, *cataractam* facilius deponi, quando perfecte concreueris. Nam quæ immatura est, mollis & mucosa adhuc, apici acus non resistit, nec integra remoueri potest, sed scissa rursus concrescit, vel callosior facta, vel aqueo humore perflusa facit, vt ægri non tantum nihil videant, sed & omnis spes sanationis, per reiteratam operationem (qua si bis instituat; certe frustra sit) ipsis adempta, quod etiam accidere solet, si instrumenti acuminis, humor vel crystallinus vel vitreus, eorumque tunica, offeudantur, vel solūm vena in ambitu pupillæ laceretur. Ex quibus patet, quod hoc remedij genus valdè anceps sit & dubium, & ob eiusdem summam difficultatem, facilè error it remediabilis committi possit, vnde sanitas temerè, vt consueuerunt circumlocuti (qui pudore, licet promissa non præstent, minime erubescunt, dummodo eos spes aliat lucri) nunquā est promittenda patienti, sed diligentia. Ego; vt rem fatear, hanc chirurgiā nunquam tentavi, quamvis instrumenta parata habuerim, sed eam vidi bis ab Italo, bono successu administrari in vno oculo Nobilis cuiusdam Patauini, & Monachi Veronensis. Operator autem, qui erat Patauinus, Chirurgiam sequenti instituit modo. Præparato corpore, & implorato Numinis Diuini auxilio, elegit couclauē aliquod mediocri lumine perflusum, & diē sereno ac tranquillo, tribus horis ante prandium, ægrum adhuc ieiunum, in sella propè lectū collocauit (à cuius tergo erat aliquod fulcimen & puluinar) ita vt versus lucem spectaret; ex opposito sedili Chirurgus ægrum, diductis cruribus, cum sella exceperit; illiusque manus vtrinque femoribus suis inuidentes sustinuit: à tergo ægri minister (caput patientis erectum & firmum ambabus manibus tenens) oculum dextrum, qui sanus erat, gossipio & fascia obuoluit, Tabul. huius Fig. IV. Quo facto, inter Chirurgum & patientem puluillos posuit minister, vt operantis brachiū firmius sustineri possit. Vid. apud Guilh. Fabr. Hild. cent. 4. obs. XVI. instrumentum, cui cubitus Chirurgi, veluti basi aut colūna, firmissimè incumbit. Hoc pariter paracto, Chirurgus pollice dextro fricuit oculum affectū (palpebras claudendo, moxq; recludendo) & masticato prius sarpiculo, halitu eius souit:

fuit: Postea fumpfit acum auream (quoniam suffusio deponēda fuit alba, argenteum verò instrumentum requiritur, cum humor concretus fuerit niger, vel alterius coloris) quæ longa, manubrio striato & intorto ad firmiorem apprehensionem, versuſque cuspīdem acutissima, & sensum attenuata sit. Tab. IIX. Fig. IV. Hanc itaque manu sinistra, propē oculi sedem, innixa in latere oculi externo, in albo partē ab iride distante, paulò altiore sede quàm in medio, impressit, & quidem non violenter, sed sensum eam contorquendo, donec corneam, & tunicam penetraret, intruſit: quod æger facillè tulit, cum minimo doloris sensu: sic intruſam acum mox verſus pupillæ foramen, vbi tela accreuit, direxit, & vſque ad pelliculæ interiorem sedem paulatim propulſit, quod commodius fiebat, cum per corneam acus aurea videri potuiſſet. Eò blandè adacta, & vt telam ab ambitu foraminis remoueret, aliquoties surſum & deorſum ducta (*cum prima vice non ſemper ſuccedat*) depreſſit, & alicubi liberatam pelliculam, acu penitus, vbi adhærebat, ſeparauit, ac deorſum, in infimam ſcilicet, & obſcuram oculi ſedem, depoſuit. Cum pellicula infra pupillæ regionem deueniſſet, Chirurgus oculum clauſit, & acum per quadrantem horæ reliquit, vt tela in parte inferiore, in quam decuſſa eſt, permaneret, quod cognoscitur, ſi ex oculi commotione pellicula non redeat. *Interim cauendum, ne in depoſitione cataractæ, illa in plures partes ſcindatur:* portiones enim illæ, licet depreſſæ fuerint, facillè tamen rursus in pupillæ ſedem deferuntur, & illic fluitando viſum obſcurant. His omniſus ritè peractis, etiam benè ſuccellit depoſitio, pupilla iterum nigra apparuit, & æger mox videre cœpit. Tandem palpebrà depreſſa, oculoque clauſo, acum ſenſim rursus extraxit, ne materia, ſuffuſionem quæ fecit, in priſtinam ſedem reſlueret, aut humor vitreus, ſeu cryſtallinus, læderetur. Nec eſt aquei humoris effluſus metuendus, cum foramen in craſſa hac tunica factum, ſtatim poſt acus exemptionem, rursus collabatur.

Operatione ſic finita, oculo reſtituto & ſano, attamen vtroque clauſo per 6. dierum ſpatium, quotidie, ter aut quater, appoſuit goſſipium ex vna parte imbutum aquà roſarum & ſcœniculi, cui modicū croci & pulueris ſcœniculi addidit, pro corroboratione: ad præcauendam verò inflammationem, fronti applicuit linteum vnguento illitum ex oui albumine conquaſſato, & pulueribus Galeni adſtringentibus, ſupra goſſipium & deſenſuum modò dictum, aliud linteum, & faſciam alligauit. Ab eo tempore, ægri victus ratio non fuit libera, ſed tenuis ſolū concessa. Et ne viſus, luce multa nondum aſſuetus, obruatur, vt in tenebris, obſeratis vndique ſeneſtris ligneis, aliquandiu moram traheret æger, & ſenſim luci aſueſceret, præcipit. Vt etiam ſpiritus nulla vi ad oculos ferrentur, præcauit omnem vehementem motum

H

vrpote

utpote tussim, sternutationem, clamorem conarumque magnum in reddendis excrementis alui & vesicæ. Supinus cibum & potum sumpsit, neque surrexit ad aluum deonerandum; sed vas ex ligno recipiens ano submisit: atque ita æger pristinam lucem adeptus, diligentius prohyalætorum usu, & gestatione fonticuli brachio inuisti, per plures annos incolumis vixit. In utroque oculo suffusionem iuxta Celsum, me præsentem, felici quoque successu deposuit Vlmæ 1637. Mense Decembr. Domino Tobiz Neubronnero, & Dominæ Kazenbœckin Ophthalmiater insignis N. Marianus origine Romanus. Atque hæc de suffusione, feliciter deposita, dicta sufficiant: quæ ex obseruatoricina mea ideo transtuli, ut Medicinæ studiosi, si circumforanei, quibus hodie ut plurimum curandi conceduntur, ipsis præsentibus non rite procedant, haberent quod corrigere possint. Et cum suffusionis Chirurgia omnium subtilissima sit, eam Cels. l. 7. c. 7. de natura oculorum & eorum suffusione luculentissimè proposuit, quem consulat lector, & qui plura desiderat, adeat Platerum, vel Georgium Bartisch Oculistam Dresdensem. Pro discussione cataractarum incipientium, multæ reperiuntur apud Autores collyriorum descriptiones, quibus præstantissimi effectus ab ijs tribuuntur: ego expertum habeo Fel Lucij piscis modico sacchari mistum, quod post purgationem totius, & adhibitum vesicatorium retro aures, sinistro oculo ex fratre nepotis instillatum, septimanæ spatio suffusionem in principio existentem, resoluit: quod remedium sæpius feliciter usurpauit adrianus Spigelius, qui præter hoc mihi valdè commendauit oleum hepatis mustulæ fluuiatilis, de quo vid. Foresti l. 1. obseru. 35. & aquâ Martin. Rulandi Ophthalmicam, & illam socialem, utpote valdè utilem & Neapoli in magno usu. Hanc descripsit Ioh. Angelicus in practica sua, quam Rosam Angelicam appellat eiusque mentionem facit Sennertus Pr. l. 1. p. 1. sect. 2. omisâ tamen descriptione, quæ talis est: R. Foen. Rut. Euphr. Verben. Torment. Beron. Ros. Endiæ sylu. Calitr. Anag. Pimpin. Chelid. Papyri, pæon. Fol. vitis, Apij, Agrim. Caprif. ana p. æq. Terantur & prid. ponantur trita in vino albô: Secunda die in vrina pueri venerem non experti: Tertia, in lacte mulietis; & quarta in melle optimo, quo tempore destillentur, & ad usum referuentur. Ambas has aq. in usum nunquam reuocaui, easdem tamen iuuenturi studiosæ, præter institutum, proponere volui, ut effectus earum, quæ mihi à celeberrimo Medico summoperè commendatæ fuerunt, datâ occasione, explorarent.

Fig. V. monstrat foramen post excisionem tumoris in angulo maiore tunicatis: supra hoc foramen ponitur cannula, a. Tab. I. Fig. I. ut oculum defendat, & compressionem cutis vicinæ sensum obtundat, dum os nudatum vel cariosum, ferramento obuari, b. Tab. XIX. Fig.





VI. candente, per cannulam immisso, adurit. Offi adusto filamenta carpta opponantur, donec squama ossis abscedat, dein sinus fistulosus spongiola, vino aluminoso expressa, & instrumento umbellato compressus, agglutinetur, quo agglutinato, vlcus sarcoticis, & vltimo epuloticis tractandum.

Fig. VI. monstrat oculum dextrum annulo, c. Tab. VIII. Fig. V. fixatum, polypum de nare dextra propendentem, & sectionem tumoris sub cute tunicati in maxilla superiore exorti: cuius folliculum imprudenter adamante, d, ruptum, euacuatà materià specillo lato acute, & subiecti musculis, separavi vsque ad radicem, quem scalpello (Tab. XII. Fig. II.) præscidi, & ostiolum cauterio actuali. (Tab. XIX. Fig. VII.) optimè candente terigi: quo facto, vulnus lincolis emplasticis ad murum contactum adduxi.

Fig. VII. exhibet vasculum vitreum c. Tab. VIII. Fig. X. oculo alligatum, per cuius infundibulum oculo affecto collyria guttatim instillantur, dein modum extrahendi è naribus polypum instrumenta ab Hieron. Fabrit. ab Aquap. inuento: polypum insuper forcipe comprehensum, & extra forcipem collocatum. Matthæus Glandorpius elegantissimum tractatum conscripsit de natura & curatione polypi, quem eius curatores summo cum fructu perlegent.

Fig. VIII. ostendit, quomodo inter excisionem tumoris tunicati, qui inter musculos, superioris labij, ad magnitudinem oui gallinaei, subortus, honestissimam & pulcherrimam matronam, non sine dolore, planè deformem reddiderit, labia pro excisione tumoris à se inuicem, hamulis duobus, fuerint diducta, vid, infra sing. Histor.

Fig. VIII. Monstrat excrescentiam carnis instar fungi, in anteriore palati parte, retrò dentes incisivos, exortam, quæ magnitudine nuce iuglandem superauit, & quories digito, vel etiam lingua leuiter saltem, tangebatur, magnam sanguinis copiam profudit: de quo casta vid, infr. singul. obs.

T A B V L A XXXIV.

De abscissione vulæ corrupta, perforatione aspera arteria, inaffione occipitis & modo parandi acu ignita setaceum in nucha, & auricola lobo.

FIG. I. ostendit medietatem vulæ sphacelo tentatam, quæ antequam corruptio serpat, & integram vuulam, cū vicinis partibus, afficiat, filo per anulum, a. Tab. IX. Fig. VII. admoto & constructo præcidenda est.

H 2 Fig.

Fig. II. præparato annulo (a Tab. IX. Fig. VII.) minister speculor oris (Tab. XI. Fig. IV.) linguam deprimat (Tab. XXXVI. Fig. VII.) Chirurgus verò partem vuulæ corruptam, annulo apprehendat, dextraque siue sinistra filum, b, notatum vehementer attrahat, & sic vuulam arctissime constiugat. Facto ad vuulam nodo, filum, c, forcipe abscindat, & extracto instrumento, vtrumque filum extra os propendere relinquat, donec vuula, secundo vel tertio die, decidat.

Si vuula ob influxam pituitam relaxabitur, optimo successu pulvis, ex alumine crudo & pipere albo mistus, iustatur. Modus autem eiusmodi puluerem inflaudi talis est: Lingua, speculo oris (quod Chirurgus sinistra teneat vel potius spatula perforata) depressa, mox dextra cohlear, b, puluere repletum vuulæ admoueat, deinde fistulæ basin, c, ore arripiat, & inflando puluerem in cohleari admotum vuulæ vndique aspergat *Vid. Guilh. Fabrit. Hildan. cons. 2. ob serv. 21. de vulua relaxata curatione.*

FIG. III. *aspera arteria* in affectibus laryngis, qui suffocationem minatur, Chirurgus Anatomix non ignaro *tutissime perforatur*, modo sequenti: inclinato ægrotantis capite retrorsum, non solum vt aspera arteria reddatur conspicua, verum etiam vt longior fiat, & eius interstitia membranosa magis appareant, atramento ducenda est linea, per mediam & anteriorem colli longitudinem, ferè vsque ad iuguli cavitatem. Deinde digitis tangendum est caput asperæ arteriæ, hinc ex anteriori parte exactè digito finis laryngis inquirendus, quo inuento descendere oportet, vsque quo tres aut quatuor asperæ arteriæ annuli præteriti sint (tres quidem breui, quatuor collo longo præditi, quem terminum cognoscimus vel sensu vel ratione: sensu in collo excarni; ratione verò, imaginantes conijcipientesque latitudinem trium circulorum, quo in casu contulerit, asperam arteriam alicuius sani videre.) vt ibi sectio fiat, non autem statim sub larynge, ne inflammatio, sectioni facilè superueniens, laryngi communicetur, antea plusquam satis occlusæ. Inuentus ita locus membraneus, inter duos circulos cartilagineos medius, atramento signandus est secundum latitudinem colli: postea cutis cum subiecta membrana carnosa, hinc inde digitis ministri, pollice scilicet & indice vtriusque manus, apprehensa per longitudinem lineæ à larynge ad iugulum factæ (sic enim nullum periculum est, vt vasa, nervus aut musculus, lœdatur) scalpello falcato, f, secanda, ita vt transversa linea in medio sectionis sit, & ipsa sectio tam longa facienda, vt dilatata pollicis transversæ latitudinem contineat, & scalpelli ancipitis, g, vltimum admittat.

Fig. IV. Sectione factâ, digitis labia vulneris diducenda, & sanguis spongiâ, i, abstergendus, vt musculi duo, qui asperæ arteriæ
immo

immediate incumbunt, & iternohyoides appellantur, apparent. Tum muscoli, quos alba quædam distinguit linea, per longitudinem manubrio scalpelli, h, ut asperæ arteriæ corpus in conspectum veniat, diducendi sunt.

Figur. V. Arteriâ apparente, spatium retuso hinc inde hamulo conseruandum, donec sectio per aciem spathæ dimidiæ, g, inter vnâ & alteram cartilagineam fiat transuersa. Scalpellus autem, tam altè immittendus, vt ad cauitatem asperæ arteriæ penetret: cuius penetrationis indicium erit, si spiritus cum murmure per vulnus exibat. Hinc cannula, k, argentea, foraminata, incuruata, magnitudine vulneri arteriæ exactè respondens, brevis, ne interna arteriæ latera attingat, alata, ne à spiritu intrò trahatur, filisque duobus alligata, vt extrahi & firmari possit, vulneri arteriæ factò immittenda, in eoque tam diu relinquenda, donec metus inflammationis præterierit. Postea extrahatur cannula, & renouato, si opus fuerit, cutis & membranz catuolæ vulnere per scarificationem, labia adducantur suturâ, adductaque conseruentur lintheolis emplasticis, & decenti ligatura.

Fig. VI. *Ostendit setaceum auricula sinistra lobo induitum*, pro interceptione materiæ, quæ illinc per venam, acu nunc perforatam & adustam, quotidie fluxit, ad nutriendum, & augendum tumorem, qui ex crassiore basi de collo propendens, ob venas iugulares, & arteriæ carotidis internum ramum, neque amputati, neque à cute separari potuit. Esccharâ butyro ablata, setaceo immixti annulum primò plumbeum, donec illud vndique consolidaretur: quo factò, plumbeo substitui aureum, & margaritâ pulcherrimâ adornatum, qualem hodie mulieres Arabum in vtroque aurium lobo gestare decorum existimant. Hâc annellatione non modò fuit impeditum tumoris incrementum, verum etiam per accidens in tantum decreuit, vt patiens nobilis, thorace induto, ipsum facili negotio occultare poterit. De excisione & amputatione tumorum cum folliculo, vid. Tabul. XXXV. Fig. II.

Fig. VII. *monstrat inustionem occipitis* adultorum ferramento candente & rotundo, vbi apoplexiæ, aliorumque soporosis affectuum est periculum. Solet autem occipitis cavitates ferramento candente aduri, potissimum in infantibus nuperrimè natis, & pueris lætentibus, quos grauissimus ille morbus, quem comitalem vocant, frequentissimè in festat, ob eorum cerebri temperiem frigidam & humidam. Pro huius morbi tam curatione, quàm præseruatione, Medicina præsentaneum inuenit auxilium, nempe occipitis inustionem, quæ vt tutissima est, ita etiam humores pituitosos, qui caput aggrauant, sæpè numero, cum manifestâ vtilitate, refellit, detrahit, &

euacuat. Hinc etiam occipitis inustio, in quibusdam locis, tam frequens est, ut Florentiæ nulli, vel certè paucissimi, inueniantur pueri, qui eam non statim post baptismum sustinuerint. Abrasit igitur capillis ferramentum occipitis cauitari, quæ est inter primam & secundam colli vertebra, respondens, o. tale & oblongum (Tab. VII.) candefiat, quo cauitas in exiguo periculo tenellæ ætate, & extra paroxysmum, semel & leuiter saltem tangitur. In maiori verò periculo, profectiore ætate, ipso paroxysmo, & ubi per multos dies locus apertus conseruandus est, ferramentum, bis vel ter, altius adigatur. Postea loco adusto applicetur, vel butyrum cum diapalma, vel triapharmacum, ut eschara decidat, quæ ablata, vlcus per necessarium tempus detineatur apertum, & fluens cerato Sacro aut diacholon, vltimò cicatrice obducatur cerato de cerussa, vel alio epulotico.

In eodem loco *setaceum* tribus instrumentis, forcipe nimirum, aculeo ignita, & setone paratum, euacuat humores, qui caput replent, reuellendo ab oculis ad ceruicem; deriuat, qui ad partes oris & pectus defluunt; & intercipit, qui ad spinalem medullam artuumque iuncturas destillant. Cum autem tanta sit setacei utilitas, visum est eius inducendi rationem & modum, in studioforum gratiam, verbis & figuris aliquot subijcere.

Æger scabello humili insideat, & Medicus digito indice locum pro setaceo aptum, seu cauitatem illam, quæ est inter primam, & secundam colli vertebra, inquirat. Quæ præcepta, capilli statim deradantur, & locus perforandus atramento scriptorio per longitudinem notetur, ita ut linea in media cauitate fiat: ne autem medius ille locus fallat, æger rectam ceruicem Chirurgus offerat. Mox Chirurgus ambo foramina adhuc facienda, tum à dextris, tum à sinistris, similiter atramento scriptorio signet, ut vtriusque signi interstitium sit vnius & dimidij transuersi digiti, plus minusue, prout ægri cutis crassa, aut tenuis fuerit.

Fig. VIII. Loco signato, atramentoque exsiccato, æger caput retrorsum ita inclinet, ut cutis panniculusque carnosus laxentur: hinc Chirurgus cutem, & membranam carnosam, digitis primò à musculis subiectis abducit, dictorumque inregumentorum, quàm plurimum fieri potest (intactis tamen ceruicis musculis, ob conuulsionis, aliorumque accidentium malorum, timorem) tenaculâ (l. vel m. Tab. VIII. Fig. I. II & III.) idoneâ comprehendat, ad se trahat, & arctè constringat, ad bonam laborantis tolerantiam, vel potius ad dolorem, ut sic constrictis neruis pars perforanda quasi obtupescat & patiens sensum pyrotici, aliàs satis dolorifici, minus percipiat. Eâ autem ratione, cutem & membranam, forcipe apprehendat, ut antèrius linea per longitudinem cauitatis ducta, & vtriusque foraminum

notæ

notæ, per forcipis foramina oculi odijciantur. Deinde acum, n. Tab. VII Fig. IV. optimè ignitam, vt facilius & citius penetret, per utrūque forcipis foramen, ictu quasi oculi traijciat, iterumque extrahat.

Fig. IX. Postea immotà forcipe, puntale, quod in vna extremitate globulum obtinet cereum, in altera sericum funiculum habet adnexum (Tab. VII. Fig. V.) transmittat, funiculumque, oui albumine imbutum, trahat vsque ad medietatem, butyro recenti illitum, ibique immotum relinquat.

Fig. X. His factis vtrumque serici extremum ad anteriora colli & pectus ducat, & partem linteo quadruplici aquà rosarum & albo oui, ad prohibenda inflammationem, expresso, atque conuenienti fascià deligat. Sequentibus, plerumque vsque ad sextam, diebus, antequam funiculum, nunc ad dextram, nunc ad sinistram, paululum ducit, eam funiculi partem, quæ curi submittenda, aliquo digestiuo oblinat, & extra adiploma quadruplex, dicto medicamento expressum apponiat, quousque vlcus bonum generet pus, & timor inflammationis præterijt. Tunc funiculum submittendum sequenti, vel simili, vnguento illinat.

R. Terebinth. Venet. in ac. malv. lot. ʒj.

Syrup. ros. ʒss.

Pulu. turbeth. & rhab. ana ʒis. M. pro Vng.

Et desuper emplastrum ad fonticulos Tab. vltima Litt. L. descriptum, applicet, quam diu vlcus apertum tenere est animus. Vltimò funiculum, sensim & sensim, extrahat, & cutim musculis subiectis adglutinet, imposito cerato diuino, plumaceolo quadruplici & ligaturâ compressiua.

TABVLA XXXV.


De sectione setacei, euulsione pilorum oculos irritantium, excisione tumorum cum folliculo, curatione palpebra superioris, quando nimirum vel relaxatur, vel contrahitur, Staphylomatis, & pterygij, vulneris labiorum in gena mediantibus plagulis emplastificis ad mutuū contactum adductionis, & eris leporini correctionis.

FIG. I. est modus parandi setaceum cum foreipe, Tabul. VII. Fig. X. & scalpello, Tab. XVIII Fig. VI. depicto, quem Guil. Fabr. Hild. cent. 1. obs. 40. describit, & priori, qui sit ferro candente, præferendum censet, propterea quod ignis tum partem desiccet & roboret, tum etiam ægrotantibus dolorem, & horrorem inferat. Quoniam vero siccitas illa butyro recenti corrigitur, dein calor & dolor mediocris, ad attrahendos peccantes humores, multum valent, ægrique à sectione æque abhorrent, quàm ab inuisione, neglectis Hildani rationibus, quã plurimis setaceum inuissi optimo etiam successu, rationem decipiendi ægrum obseruans, quem Tabul. XXX. Fig. VII. tradidi.

FIG. II. monstrat 1. *Euulsionem pilorum* in palpebris Paulinam: Palpebra digitis in vertatur, pili oculum pungentes & irritantes vel sella extrahantur, cutisque globulo specilli cadente comburatur, ut condensetur, ne pili in eà iterum renascantur 2. *Excisionem Atheromatis*, quod in medio frontis enatum, magnitudine nucem iuglandem superauit: Inciditur in hac figura cutis, quæ atheromatis folliculum tegit, per transversum, scalpello falcato, in quarta verò figura per longitudinem, ut integer abscessus cum sua tunica, separari possit: incisionem frontis transversam aliàs considerabilem sequuntur affectus. Incisus namque per transversum fibræ musculorum frontis, supercilia dependent, & palpebrarum apertionem impediunt: succedit etiam paralytis palpebrarum incurabilis, ob incisionem neruorum: quod expertus est Adrianus Spigelius, in leui tantum vulnere nerui frontis, ut annotauit in *Fabr. corp. hum. l. 7. c. 2.* Quia tamen huiusmodi tumor in medio musculorum frontis oriebatur, sectioque transversa paucissimas musculorum fibras lædebat, eam nulla sequebatur aut paralytis, aut aliud vitium, quod palpebrarum eleuationem impediret. Ut autem atheromatis huius excisio melius intelligatur, tumorum tunicarum curam hic breuissimis describam verbis.

Fas I

II



Tumores tunicati, ut meliceris, atheroma, & steatoma, aut velut ex tenui pedunculo ficus propendent Tab. XXXIII. Fig. II. *aus latiore basi partibus quibusvis inhærent*, Propenduli non exciduntur, sed amputantur ad imum in pusillanimis, si lo ad stuporem partis restricto, & relicto donec tumor decideret in cordatis scalpello. Quod si, post tumoris propenduli abscissionem, sanguis copiose profluat, aut filum aliquid de radice relinquat, tunc, ne recidiva sit metuenda, locus ferro candente leuiter tangatur, escharæque ablata, cicatrice obducatur. Hic Chyrurgiæ modus expeditissimus est, & ob vlcus paruum ac æquale, curatio compendio transigetur. Qui latiore basi partibus incumbunt, vel sunt exigui, vel mediocres, vel maiores, vel maximi: exigui nucem auellanam, mediocres iuglandem, maiores ouum gallinaceum, & maximi peponem magnitudine æquant. Maximi, ob venas & arterias, separari nequeunt, hinc amputandi sunt. Amputatio autem, seu abscisso, iuxta Hier. Fabrit. ab Aquap fit forcipe, qui recipit & constringit totum abscessum, ad eius radices, qui postmodum, ad euitandum sanguinis profluuium, scalpellis incidentibus ignitis, præsecatur totus supra forcipem (qualem depingit Guilh. Fabr. Hil d cent. 1. obs. 2.) absque eo, quod cutis à folliculo diducatur. Locus deinde concoquentibus, mundificantibus, sarcoticis, & epuloticis tractetur. Reliqui exciduntur, non amputantur. Excisio autem fit hoc modo.

Primò patiens, tum ad lumen illustre, tum ad Chyrurgum, quæ commodissimè vel in sella, vel in lecto, collocandus est; & si timidus sit, siue puer, siue sœmina, siue alius pusillanimis, manibus ad dorsum retractis religandus, ne vel doloris impatiens sectorem in agendo variè manibus impediat, aut pauens quoquo versum agitur, ut ex Hippocr. de offic. Medic. Marcus Aurel. Seuerin. l. de abscissib. anom. c. 23. monet. Collocato ægro, capilli (si tumor est in capite, aliàs opus non est) deradantur, atramentoque signetur sectionis longitudo, quæ tanta sit, quanta est tumoris rotunditas. Interdum tumor postulat duplicem & cruciformem cutis incisionem, & tunc incisio prima longior sit, quàm secunda. Fit vnica incisio supra tumorem exiguum & mediocre, præsertim cum musculo frontis, vel temporalis inhæret, ne transversim lædantur eorum fibræ, aut vasa. Cruciformem sectionem requirit medioeri proximus & maior: eam etiam admittit tumor capillis rectus. In simplici & cruciformi tamen incisione cauendum, ne folliculus subiectus incidatur, in meliceride præsertim, euacuatur enim humor, & concidit tumor, ut folliculus difficulter separari possit. Necessè enim est, tunicam, quæ materiam melli vel puliculæ similem continet, integram auferri: nam si vel minima illius portio relinquantur, renascendi illius occasione

spem præbebit. In steatmate autem, cum adiposa illa pinguedo, vel solidior sæui substantia, difficulter effluat, in folliculi læsione usque adeò vrgens periculum non est; quod si etiam concidat abscessus, leui occasione tunica potest diduci. Debet igitur scalpellus falcatus, quo sola incidatur cutis, aciem exterius recuruatam habere. Fig. II. Facta sectione, vel vna per longitudinem, vel duplici per crucem, latior specilli pars Tab. VIII. Fig. VI. inter cutim & folliculum, qui diuersum à cute habet colorem, immittatur, qua sensim folliculus apprehensus à cute diducatur, quod facile fiet, quoniam folliculus cuti non valdè adhæret. Quod si folliculus in circuitu cuti magis adhæreat scalpelli obliqua manu detenti acie (Tab. II. Fig. I.) & subter manubriolo scalpelli Tab. II. Fig. IV. separatur. Inter separandum sanguis effluens sæpissimè spongia abstergendus, ne sectorem tuitet. Si chirurgus ad fundum folliculi peruenerit, venam, tumori nutrimentum afferentem, scalpelli acie, per transuersum oportet incidere, ne vel minima relinquantur folliculi portio, & tumor regeneretur. Hoc peracto & folliculo ad vnguem extracto, vulneris labia (si laxiora prius cutim redundantem reseceat) deinde coniungat (dimissa ob patientes multis doloribus iam pertæsos futura) linteolis emplasticis in crucem appositis. Hac ratione duo atheromata, ad magnitudinem oui asnerini accedentia, in genu religiosi cuiusdam felicissimè curauimus.

Quod si folliculus iam sit ruptus, vel per se, vel per chirurgi incuriam, tum necesse est, vt vel tumor reuertatur, vel remaneat vlcus fædum, & ferè incurabile. Vbi considerandum tempus ruptionis. Si modò sit ruptus, immittatur, inter cutem & folliculum, latior specilli pars, vel scalpelli manubriolum, donec membrana tumoris intotum fuerit separata. Quod si multò ante sit ruptus, is vel septicis consumendus in timidioribus, vel ferramentis candentibus in fortioribus: quo consumpto vulnus concoquendum, mundificandum, carne replendum, & cicatrice obducendum, vid. Aetium Terrab. 4. ferm. 3. cap. 7. & 8. & Celsum l. 7. c. 6. de cura meliceridis, steatomatis, & atheromatis manuali, quam his verbis describit. Omnia derafa ante, si capillis conteguntur, per medium in longitudinem, vel crucem oportet incidere: sed steatomatis tunica quoque secanda est, vt effundatur quicquid intrus coijt, quia nò faciliè à cute, & subiecta musculorū carne, ea tunica separatur. In cæteris, vt meliceride, & atheromate, ipsa tunica inuiolata seruanda est. Procinus autè cute incisa, tunica alba & intensa se ostendit. Tum, scalpelli manubriolo, tunica diducenda à cute & carne est, ei jciendaque cum eo, quod intus continet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus firmiter adhæsit, ne is lædatur, superior pars illius tunica forficula decidenda, alia,

alia, vel reliqua portio, ibi relinquenda. Vbi tota tunica exempta est, oræ vulneris committenda, fibulaque *sem futura*, (modo eam admittas ager) his iniicienda, & *desuper* medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel dimidia, qua musculo firmiter inhaeret; vel aliquid ex ea relictum est, post erodentia, vel leuiculus ingrem, pus mouentia adhibenda sunt.

Fig. III. ostendit, in dextro oculo, palpebræ superioris relaxationem, & in sinistro eiusdem curationem: quam Hieron. Fabricius ab Aquap. crudeli & obsoletæ celsi Chyrurgix præferre, & sequentibus verbis commendare videtur: Ego autem, quando oculum superior palpebra operit, pono vnum glutinum (*sem linteum glutino meo imbutum*,

℞. Sang. Dracon.

Thuris.

Sarcocoll.

Mastich ana 3j. F. Puluis, & cum oui albumine agitato fiat mixtura, instar mellis, crassa.)

cum duabus vel tribus habenis supra totam superiorem palpebram, alterum verò simile *priori linteo*, quoad habenas, supra supercilium in frontem, cum ambas, vel omnes tres habenulas superiores attractas inferioribus *habenulis* alligo. Et ita aperitur oculus; fit quoque, ut spatio temporis congruo, curetur palpebra relaxata, beneficio dicti glutinis adstringentis & siccantis, & palpebram ac frontem contrahentis. Hæc curandi ratio optimè succedit, quia non tantum exsiccat quod influxit, verum etiam nouum humoris affluxum prohibet, quam expertus sum, in nobili quadam foemina, teste Iohan. Georgio Baulero, qui huic fidem adhibere noluit, donec ipse effectum, cum admiratione, viderit.

Fig. IV. ostendit in fronte sectionem cutis cruciformem supra atheromatis folliculum, de quo supra Fig. II. Sectione per scalpellum falcatum, cutis facta, eam, si specillo separari nequit, Chyrurgus à folliculo diducere incipiat scalpello Tab. II. Fig. I. quod ut rectè assequatur, cautè incedat, culttrumque transtuerim potius quàm rectum adhibeat: *rectus enim nimis velociter incidit, & folliculum necessario ladic*.

In dextro oculo vitium ἡ λυωτῆραλμα (quod est, quando palpebræ superior oculum contegere nescit,) exhibet, in sinistro curationem, ab Aquapend. inuentam & propositam, quæ mitissima est, & si continuatur, felicissima. Applicetur linteum glutino imbutum, tribusque habenulis appensum superiori palpebræ, 1, & aliud genæ, ita ut superiori linteo ex aduerso, cum suis habenulis, respondeat, 2, Glutino exiccato linteisque cui firmiter adhærentibus, eorum habe-

habenulæ inuicem alligentur valenterque subindè adstringantur. Quod si hæc duo lineæ non sufficiant, tertium cum suis habenulis, applicetur fronti supercilium 3, & quartum genæ infra secundum, & tertio ex aduerso respondens 4, apponatur, quibus similiter agglutinatis, habenulæ colligantur, nodoque duplici adstringantur, sic fiet, vt palpebra superior distendatur, adque inferiorem perducatur palpebram, & oculum tegat. *Hunc curandi modum ipse nunquam sum expertus, sed administrari sapius vidi.*

Fig. V. docet *staphylomatis* (quod interdum latiorem habet basin, b, quàm sit eius corpus reliquum, quandoque angustiore, a, reliquo,) *curationem*, quæ fit per constrictionem appellatam. Si staphyloma fuerit in dextro oculo, commodissimè eger ad pedes Chyrurgi collocatur, capiteque reflexo ipsius genibus innititur: Si vitium in sinistro, patiens sellæ Chyrurgi aduersæ insideat.

Staphylomatis, quod angustum obtinet fundum, constrictionem Celsus lib 7. cap. 7. describit. *Diductis palpebris* ad ipsas radices, per medium *staphylomatis fundum* transuersè (ab eo angulo, qui manui dextra est commodus, ad alterum) acu duo lina, seu filum duplicatū, ducēte; deinde *medio fili duplicati inciso, acuiq; remotā*, vniuslini, seu *fili simplicis*, duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore strenue adstringere inter se oportet, quæ paulatim secando id excidunt. Chyrurgia autem hæc, & sequens, adhibetur, non vt visus iam perditus reuocetur, (hoc enim impossibile est) sed vt moderatus decor ægrotanti reparetur.

Staphylomatis, quod latiorem habet basin, curationem Paulus Ægineta lib. 6. de re Medic. cap. 19. tradit: Acum igitur *sine filo*, ab infernis sursum, per staphylomatis fundum traicere, & alteram acum, duplex filum ducentem, ab oculi angulo, qui ad manum est dextram, ad alterum, per staphylomatis fundum transigere, & manente priore acu, *qua traicta suis sine filo*, fili ansam seu medium secare & ablata acu, alteram staphylomatis partem ad superna, alteram ad inferna, per fila deligare oportet. Hieronymus Fabritius ab Aquapendente, in utroque staphylomate, vitur filo serico, simplici & non torto, atque etiam rubro, quoniam tinctura etiam strictionem atque sectionem adiuuat. Filis in utroque vitio constrictis album oui concutitur, lanaque exceptum oculo imponatur, ad arcedendam inflammationem. Altera die, post solutionem fasciæ, oculus lenibus medicamentis tractetur, donec fila, vna cum staphylomate decidant.

Fig. VI. ostendit curationem pterygij, quod ab interno oculi angulo obortum, ultra pupillam se extendit, & visum impediens, operam requirit Chyrurgicam, quæ quinque manibus peracta optimè

optimè succedit, si eo, qui indicabitur, modo instituat. *Agro*, vt in staphylomatis remotione dictum, rectè collocato, Chirurgus palpebræ, tum superiori tum inferiori, linteum applicet lutinatorium, quorum vtrumque habenulam longam habeat, quam ministri manus ab oculo longè distans apprehendat, adque se trahat, vt palpebræ diducantur, & absque incommodo Chirurgi operantis, diductæ conseruentur. Alius ministri oculum annulo Tab. VIII. Fig. V. firmiter applicito. Palpebris hac ratione diductis, oculoque per annulum firmato, Chirurgus hamulum, mucrone suo modicè incuruat Tab. VIII. Fig. IX. pterygio eleuando circa medium pupillæ cautius submittat, ne corneam oculi tunicam lædat; deinde actum modicè inflexam, quæ filum ex serico simplex, rubro colore tinctum habet transmissum, sub pterygio, per hamulum submissum, eleuato traijciat, fili ambo capita manu sinistra apprehendat, & pterygium, filo distentum, manubrio scalpelli Tab. XII. Fig. IV. in dextra detento, à medio vsque ad extremum, sensim & sensim separet. Quo facto, filum remoueat, & partem vnguis separatam hamulo apprehendat, apprehensam distendat, & separationem pterygij manubriolo scalpelli continuet, donec ad maiorem oculi preuenit angulum, vbi vnguis scalpello Tab. XII. Fig. II. tam accuratè excidendus, vt neque ex eo aliquid relinquatur, quod viceratus vix vllam recipiat curationem; neque ex caruncula aliquid detrahatur, ne affectus, quem *psada* vocant, exciretur. Hac expleta Chirurgia, apponantur oculo exsiccantia, de quibus vid. Sennert. Fabric. ab Aquap. & Celsum.

Fig. VII. ostendit vulnus genæ dextræ cæsum inflictum, & labium superius in medio ad dentes incisivos, instar ossis leporini, fissum.

Fig. VIII. monstrat dictorum affectuum curationem. Vulneris labia ad mutuam contractum ducuntur, & oppositis linteis Emplastice adducta conseruantur, donec consolidentur. *Os verò leporinum sequenti modo corrigatur*: Labium fissum in vtraque parte hamulis apprehendatur, & à gingiuis scalpello idoneo Tab. II. Fig. I. separetur; deinde linteum inter gingiuas & labium, ne rursus inuicem agglutinentur, immitatur, & glutinum vtrinque, cum habenulis applicetur: quo facto, labia fissuræ forfice renouentur, & renouata ad mutuam contractum adducantur suturis, quæ, ne tam citò abrumpantur, attractis glutini habenulis conseruentur, donec labia in totum, beneficio Balsami Hispanici, coalescant.

T A B V L A XXXVI.

De dentis cariosi adustione, buccam offendentis excisione, agrotantium, ore valide cōstrictio, nutritione foraminis palato p.n. facti obstructione liquoris in aures periculosa infusione, dentium cōstrictorum deductione, maxilla inferioris depressione, vinculi sub lingua incisione, faucibusque inherentium exemptione.

FIG. I. docet quomodo dentes cariosi & perforati, ad cariem standam ferramentis candentibus (*ex Tabul. XIX. petitis*) & in toramen adaectis adurantur.

Fig. II. monstrat, quomodo *dens* in alieno loco genitus, & *buccam offendens*, ferramento, Tab. XI. Fig. II. excidatur.

Fig. III. exhibet applicationem infundibuli. Tab. X. Fig. XI. delineati & descripti, cuius extremitas intra gingivas extremas immittitur angusta, latior cibum liquidum excipit, & per angustam ad oesophagum eorum, qui valde cōstrictos habent dentes, dimittit.

Fig. IV. monstrat palatum ex lue Gallicā erosum adeo; vt foramen illud in nasi etiā cavitatē penetraret, & vocem articularem pronunciari prohiberet: quod instrumento aureo, cui spongiosa fuit adnexa obturavi, vt patiens verba articulata & distincte proferre potuerit. Post usum decocti, foramen illud ferramentis candentibus tetigi, quod natum, separatis prius aliquot ossiculis, carne replevit: vlcus carne repletū, collutionibus oris, & errhinis exiccantibus, cicatrice obdixi.

Fig. V. admonet Chirurgiæ tyrones, vt in curandis aurium affectibus liquores convenientes blandē potius instilent, quam per siphonem auricularum violenter immittant, ne membrana tympani rumpatur, & incurabilis auditus grauitas subsequatur.

Fig. VI. dentes cōstrictos, validēque cōmissos ducit instrumento dilatatorio Tab. IX. Fig. IX. adumbrato, ne æger fame pareat: vbi dilatatorij vsus non conceditur, felicissimo successu clysteres nutriētes in anum infundūtur, quod expertus sum in Melchioro Irith qui ob vulnus ventriculi per 14. dies solis clysteribus fuit nutritus.

Fig. VII. ostendit applicationem speculi oris, ad explorandos faucium affectus summē necessarij Tab. XI. Fig. IV. deprimit prædictum instrumentum non solum linguam, sed etiam maxillam inferiorem depressam conservat, donec loco affecto penitus perfecto medicamenta fuerit adhibita: *spatula* ad latus posita, pluribusque perforata foraminibus, sola phærumque deprimitur lingua, vt oris vitia innoēscant: spatula *annulo*, qui acie præditus, obstergantur crassiora linguæ excrementa, quæ ipsi, in febribus ardentioribus vt plurimum tenaciter in hærent.

Fig.





Fig. VIII. docet modum incidendi vinculum sub lingua nimis strictum, & loquelam, vt putant, impediens: quod obstetrices passim vngue, & barbitonsores nostri imprudenter phlebotomo dilacerare solent, nō raro cum magno sanguinis profluio, & dolore, qui aliorum postea malorum causa existit, quæ Hier. Fabr. ab Aquap. cum annexo Chirurgiam hanc debite ad ministrandi modo, verbis sequentibus recenset *Præter linguæ depressionē, & desersionem*, cetera linguæ chirurgia est, vt administretur, quando subiectum linguæ vinculum inciditur, de qua antequam dico, vos admonitios velim, de obstetricum *ubique locorū* temeritate, quæ passim, & *sine aīscrimine*, in quocunque recens nato infante, *digitis indicis* vngue, quæ paratum & acutum ad id perpetuo gestant, incidunt, sub eorum lingua ligamentum; quod *incisionis* opus nisi præstarent, posse *in futurū* loqui infantem nequaquam credere possunt: quasi verò natura (ò admirabilem & *nondū satis deploratam obstetricum serdē omniū* inscitiam) non possit loqui homo, qui locutionem, tanquam hominis propriam actionem, obstat, sine alicuius satuz mulierculæ operâ, quæ ipsi auxilietur, & præsidio sit. Et ego vidi infantem nuperimè natum, qui dum diutius detinebatur, vt expectaret secundinas, neque plorabat, nec quicquam molestum sentiebat, postquam verò obstetrix vinculum sub lingua imprudenter indicit vngue, statim ex dolore ploravit. Sed hoc minimum est, illud certè longè maioris momenti est, videlicet propter eam vnguium Chirurgiam, inflammatione oborta sæpè numero infantes *pupillam genitricis vel nutricis cōducta*, apprehendere nequeunt, neque lac fugere, propter quam causam sæpissimè moriuntur infantes, aut lactantibus intumescunt mammae, quod adhuc longè pessimum est, *parentes etiam* potius vel in partum *immatursi ac difficilioris* vel in simplice impotentiam apprehendendi papillam, vel in quocunque alio *visum*, quam in veram obstetricis *imperia* culpari reiiciunt. Quæ cum verissima miror valdè, quod lege sancitum cautumque non sit, vt prohibeatur infantum neces, *ab obstetricibus sæpissimè illata*. Vos igitur moneo, vt præcipiatis, ne vngquam obstetrices filios, prolemque vestram aut aliorum, *unguibus ad linguam* attingant. Quod si vinculū illud in lingua maius fuerit, poterit quocunque *asatis* tempore excindi, quod ligamento tamen huic raro, imò rarissimè, accidit, quia natura non hominem conderet ad loquendum idoneum, nisi etiam instrumenta ad id aptissima, construeret concederetque. Quod si ex centum millibus vnus nascitur *infans*, cum ligamento *maiore*, quod Chyrurgiam expostulet, nihil interest; *sine statim post partum siue post lactationis tempus siue postea*, à Chirurgo *excisato incidatur*. Quod si hoc eueniat, solemus præcipere, vt æger

ager linguam extra dentes exerat, quam Celsus quidem volsellæ dentata parte, sed nos forcipe apprehendimus. Interdum neque volsellâ, neque forcipe apprehendere possumus, vt in infatibus aut pueris, qui linguâ exerere aut nesciunt, aut nolunt. In his curandum vt plorent, deinde posito inter duos digitos, pollicem nimirum & indicem sinistræ manus, linteo quodam tenui & aspero, quo lingua apprehendatur, foras trahatur, sursum reuellatur & incuruetur vt vinculum appareat, quod dextra tandem manu excidimus. Sumptoque (nō phlebotomo barbitonfori vulgaris & inepto, sed) scalpello ad culpidem modice recutuoatō vinculū linguæ, si maius, quàm par sit, transuersè secamus, semel, bis, iterumque, donec vniuersum sit dissectum, magnâ cutâ adhibitâ, ne subiecta vasa, (quorum incisionē sequitur sanguinis fluxus, huncq; aut suffocatio, aut ad minimū viriū, in tam tenerrima, atare, dispendiū) violētur, quod sub perito Anatomix Chirurgo euenire non potest, qui vasa sub lingua exactissimè nouit, & scalpello falcato euitat. Huc vsque Hier. Fabrit. ad Aquap.

Fig. IX. docet, quomodo spina piscij, vel ossiculum angulatum, vel aliud inter comedendum faucibus inhærens, nec in ventriculū descendēs, conuenientibus instrumentis extrahatur, vel in ventriculū depellatur. Eximuntur hæc extranea varijs modis. Si sint in cōspectu, volsellâ Tab. IV. Fig. I. rectâ apprehenduntur, & è faucibus extrahuntur, adhibito interim oris speculo. Quod si spina, ossiculum, vel alia, hiante ore & lingua speculo oris depressa, in cōspectum non veniant, cum altius in guttur descenderint: tunc volsella recuruata Tab. X. Fig. I. apprehensa verò instrumento Tab. X. Fig. II. sæpius gulæ immisso, impacta educantur. Alij, à cibo, ventriculū digitis, vel pennis oleo amygdalarum dulcium inunctis, & in fauces demissis, ad vomendum irritant, vt vnâ cum cibo spina, vel quodcunque extraneum per os expellatur. Verùm cum dictis modis & instrumentis, sæpè frustra spinarum & ossiculorum extractio tentatur, Hieron. Fab. ab Aquap. sumit candelam, ex cera alba ad crassitiem digiti minimi confectam, & nonnihil incuruatam patietis tradit, vt ipse eam in fauces demittat, donec impulsū corpus extraneum in ventriculū descendat.

Nounulli, in eundem finem, maiores deglutire bolos iubent. Aliqui globulum plumbeū filo fortiter alligant, quo sæpius deglutito & retracto illud, quod gulæ firmiter inhæret, in ventriculū detru-diur. Cum res gulæ infixâ nec instrumentis per os eximi, nec alijs modis in ventriculū descendere potest, Fabritius ab Aquap. ex Paulo & Leonide, totum negotium naturæ & tempori committit.





ager linguam extra dentes exeret, quam Celsus quidem volsellæ dentata parte, sed nos forcipe apprehendimus. Interdum neque volsellâ, neque forcipe apprehendere possumus, ut in infatibus aut pueris, qui linguâ exerere aut nesciunt, aut nolunt. In his curandum ut plerent, deinde posito inter duos digitos, pollicem *nimirum* & indicem sinistræ manus, linteo quodam tenui & aspero, quo lingua apprehendatur, foras trahatur, sursum reuellatur & incuruetur ut viuiculum appareat, quod dextra tandem manu excidimus. Sumptoque (*nō phlebotomo barbisonforū vulgari & inepto, sed*) scalpello ad cuspidem modice recuruato vinculū linguæ, *si maius, quàm par sit*, transuersè secamus, semel, bis, iterumque, donec vniuersum sit dissectum, magnâ cutâ adhibitâ, ne subiecta vasa, (*quorum incisione sequitur sanguinis fluxus, huncq; aut suffocatio, aut ad minimū viriū, in tam tenerrima, atare, dispendiū*) violētur, quod sub perito Anatomix Chirurgus euenire non potest, qui vasa sub lingua exactissimè nouit, & scalpello falcato euitat. *Huc vsque Hier. Fabric. ad Aquap.*

Fig. IX. docet, quomodo spina piscij, vel ossiculum angulare, vel aliud inter comedendum faucibus inhærens, nec in ventriculum descendēs, conuenientibus instrumentis extrahatur, vel in ventriculum depellatur. Eximuntur hæc extranea varijs modis. Si sint in cōspectu, volsellâ Tab. IV. Fig. I. rectâ apprehenduntur, & è faucibus extrahuntur, adhibito interim oris speculo. Quod si spina, ossiculum, vel alia, hiant ore & lingua speculo oris depresso, in cōspectum non veniant, cum altius in guttur descenderint: tunc volsella recuruata Tab. X. Fig. I. apprehensa verò instrumento Tab. X. Fig. II. sæpius gulæ immisso, impacta educantur. Alij, à cibo, ventriculum digitis, vel pennis oleo amygdalarum dulcium inunctis, & in fauces demissis, ad vomendum irritant, ut vnâ cum cibo spina, vel quodcunque extraneum per os expellatur. Verùm cum dictis modis & instrumentis, sæpè frustra spinatum & ossiculorum extractio tentatur, Hieron. Fab. ab Aquap. sumit candelam, ex cera alba ad crassitiem digiti minimi confectam, & nonnihil incuruatam patietis tradit, ut ipse eam in fauces demittat, donec impulsus corpus extraneum in ventriculum descendat.

Nonnulli, in eundem finem, maiores deglutire bolos inbent. Aliqui globulum plumbeū filo fortiter alligant, quo sæpius deglutito & retracto illud, quod gulæ firmiter inhæret, in ventriculum detruditur. Cum res gulæ infixæ nec instrumentis per os eximi, nec alijs modis in ventriculū descendere potest, *Fabritius ab Aquap. ex Paulo & Leonide*, totum negotium naturæ & tempori committit.





T A B V L A XXXVII.

De inuisione narium in ozæna præsertim & post excisionem polypi & ratione instituendi paracenthesin thoracis Paulinam & Hippocraticam dilatandi & curandi vulnera thoracis, pectoris & abdominis, atque prouocandi papillas lactantium.

FIG. I. quomodo nares exulceratæ solùm, vel cum corruptione ossis, ferramentis candentibus, & per cannulas immisissis, adurantur, docet. His adiungantur ea, quæ supra Tabul. XI. Figur. III. IV. V. & VI. dicta sunt. Curani fartorem Patauinum ozæna Gallica domi detentum, quæ etiam, post internum decocti ex ligno guaiacino usum, per duos annos continuos, à barbitonfore eiusdem loci primario, fuit tractata medicamentis ex antimonio & mercurio præparatis. His tamen nihil conferentibus, patiens per chirurgum, D. Spigelij consilium & operam petiit. Spigelius autem eo tempore valetudinarius, domo exire, ægrumque visitare non potuit, unde me Chirurgus illi ordinario adiunxit, mihi quæ præcepit, vt turundam ex linteo puro conficerem, eamque nari læsæ immitterem, ibique per diem naturalem relinquerem, vt ozænae situs, quantitas & qualitas addisci posset. Mandatis obtemperaui & turundam extraxi, quam ferè in apice, ac in dextro latere, velut in orbem maculatâ, summæque fortentem inueni, & Spigelio monstrauit, qui hanc subitò arque vidit, dixit vlcus esse in summo ferè naris loco, supra scilicet partem cartilagineam, idque in latere dextro, non adeo quidem magnum, sed cum ossis corruptione coniunctum, quod inuisionem postulet. Quærenti rationem dictorum, dedit sequentem: quia turunda ferè in apice est contraminata, vlcus situm habet in summitate naris: quia eadem exterius est solùm commaculata, necessariò sinistrum duntaxat latus afficitur; vlcere non adeo magno, quoniam macula est parua; cum osse tamen corrupto, quia turunda est nigra, & valde foetet; Chirurgia opus habet, quoniam huic affectui, vsque in præsens tempus, medicamenta talia fuerunt incassum adhibita, quæ si os corruptum non fuisset, vlcus iam pridem ad cicatricem duxissent. Quam chirurgiam, seu inuisionem naris, per cannulam mihi perficiendam reliquit, vt potè facilem, quæ meorum operationum prima fuit. Quare cannulam elegi (varias enim habebat Spigelius) idoneam, (eam scilicet, quæ in latere foramen habuit. Tab. VII. Fig. IV. delineata) illamque linteo, quod vino nigro austero erat expressum, pro illæsarum partium defensione, inuolui, ac nari exulceratæ immisi, vt foramen dictæ cannulæ vlcus æquaret; præparatâ & nari immisâ cannulâ, recepi ferrum, Tabul. IX. Figur. VI. optimè candens, quod per cannulam immisi vsque ad locum affe-

I

ctum

etum, idem quæ statim retraxit, repetendo ityli candentis immisionem & retractionem ad summum quater vel quinquies, *quam citissime tamen, unde ad minimum duo, ferramenta ignita, ut loco citato monui, requiruntur*: Post inustionem natura (mitigato prius dolore, & eschara ablata.) medicamentis a liura, intra 14. dies particulam ossis separavit, & vlcus, applicitis exsiccantibus, fuit cicatrice obdusum.

Hanc chirurgiam posthac in pluribus felici cum successu expertus sum, (quamvis Germani, & præcipue Vlmenses, ab inustionibus quibusvis maxime abhorreant) utroque ægrotantium oculo, ad eundem instrumenti igniti aspectum, gossipio, & fasciâ clauso.

Ozæna narium, cum vel sine venereæ luis suspitione, absque tamen ossis carie, si medicamentis curari nequit, exposcit cannulam omnino solidam Tab. IX. Figur. V. quam tamen nunquam, ut verum fatear, adhibui, neque unquam adhibere vidi. Mihi autem narrauit studiosus quidam Mediolanensis, se inustionem per cannulam omnino solidam ab Excell. Hieron. Fabric. ab Aquap. adhibitam felicissimo successu admisisse.

Modus absque dubio fuit iste, quem Author ipse describit. Immittenda cannula ferrea, (*Omnino solida. Tab. IX. Fig. V. nec linteo involuta, sed albumine oui probe agitata, oblinita.*) tam longa, ut vlcis longitudinem adæquet, nariumque cavitatem æmuletur, & per ipsam ferramentum candens indendum, quod tamen non nisi cannulam attingat. Sic fiet ut ferrum candens calefaciat cannulam, & hæc nares & ozænam: nolo autem, ut nares ex hoc calore doleant, sed locus exulceratus citra dolorem calefiat, ad bonam laborantis tolerantiam, qua perspecta, tunc cannula è naribus è vestigo eximenda, rursumque immittenda, totiesque ferramentum candens, quod tantum calefaciat, repetendum, quousque exsiccata sufficienter pars extiterit: ex pluribus enim iteratis vicibus fit, ut sine dolore iterata calefactio suppleat vicem adustionis, partem scilicet exsiccando, & corroborando & tumores digerendo, atque ita vlcus sanando.

Fig. II. ostendit costas thoracis detectas, ut ea, quæ infra de perforatione thoracis dicentur, chirurgiæ tyrones melius intelligant: Q. igitur locum Paulinum; @ Paulino inferiorem; & H. Hippocrat. Locis enim assignatis thorax in quavis épyematis specie solet aperiri.

Fig. III. Q. monstrat filum triplicatum, quo Paulinus ipsoque inferior locus invenitur: H. incisionem solius cutis supra musculos intercostales, quæ fit *σκολοτομα χαίριω*.

Figur. IV. monstrat 1, quomodo in vulneribus in thoracis cavitatem penetrantibus, sanguis per canalem (A. Tabul. XII. Figur. IX.) descriptam, extrahatur. 2. Qualis, post sectionem thoracis

can-

cannula (B. Tab. XII. Fig. XII. &c.) pileolus argenteus (C. Tab. XII. Fig. VIII.) (spongia D. & siphon pro iniiciendis in thoracem idoneis li. quoribus necessarius. (E. Tab. XII. Fig. II.) sit adhibendus. 3. Quomodo thorax perforandus, & quid post thoracis apertionem, siue Paulinam, siue Hippocraticam, agendum. Ante apertionem verò thoracis quatuor consideranda sunt. 1. An Chirurgia sit facienda nec ne? 2. quo tempore. 3. quo in loco. 4. quo pacto. *An sit facienda significabunt quatuor, 1. morbus, 2. anni tempus, 3. vires ægri, & 4. magnitudo mali, seu quantitatis humoris euacuandi.*

I. Morbus, si scilicet in capacitate thoracis, vel pus ex vomica peripneumoniz aut pleuritide, vel biliosus ichor ex erysipelate pulmonum, vel aquosus humor ex hydropse thoracis, vel sanies cruenta, loturæ carniū similis, vel sanguis ex vulnere in thoracem fluens. Hanc collectionem materiæ dignoscimus primò ex respiratione, quæ tantum est difficilis in inspiratione, ob pulmones liberè, propter materiam collectam, sese expandere non valentes: non verò in expiratione, cum materia suo pondere pulmones comprimat. Secundò ex pulsibus celeribus vehementioribus, frequentibus, parvis, inæqualibus, & inordinatis. Tertiò ex prægressa febre, cum accidentibus vehementioribus. Quartò, ex decubitu in sanum latus difficili, quod materia peccans pulmonibus incumbat, & eos grauet, ne liberè huc vel illuc moueri possint. Quintò ab inundatione in thoracis cauo percepta. Quibus sextò adili potest tussis, quæ tamen non est semper in omni empyemate, sed tunc saltem, quando materia in bronchijs pulmonum continetur, quæ interiorem aspectu arteriæ tunicam & eius caput, *partes exquisito præditas sensu,* suâ vel copiâ vel actimonia irritat, atque ita tussim excitat.

II. Anni tempus, Hippocrates solstitium hyemale & æstiuum euitate iubet, quod ijs temporibus maxima & quasi repentina fiat aeris permutatio: vel cum semper post sectionem aliquid aeris thoracem ingrediatur, præsertim verò dum euacuatur materia per vulnus recens factum, tempora dicta quantum possibile erunt fugienda.

III. Vires. Nisi enim vires bene aut mediocriter content, intermittere debet hæc manualis operatio, ne scilicet nobilissimum aliàs perforationis præsidium, ægro mortuo, diffametur. Vires autem inueniuntur Medici plerumq; a pulsibus, qui tamen illos in hoc casu decipere possunt, quod talis materia in thorace collecta pulsus faciat paruos, celeres, frequentes & inordinatos. Certissimum autem earum, si constante, signum est, cum ægri vel sedere, vel ambulare queunt, beneque naturæ benevalentis, aut subsidio scipionis alius cuius.

IV. Quantitas. Si enim pauca materia in thorace fuerit, non opus est apertione. Natura enim ipsam aut digeret, aut per urinarias vias,

aliaque loca, secernit: Si vero copiosa, sine mora & incunctanter institienda est apertio, ne quantitate materię suffocetur æger, aut eius qualitate prava corrumpantur pulmones.

Sed quo tempore? Id nobis insinuasſe videtur Hippocrates l. 6. Epid. f. 7. text. 9. inquires: hydropicos in thorace *ἰδρωσὶν* secare oportet, tabescentis verò *ὑδρωσὶν* vrere. Interpretes vtrumque vocabulum verterunt statim, sed *ὑδρωσὶν* hic minus significat, quasi Hippocrates dicat, hydropicos minus citò, tabescentes verò citissimè & statim secandos esse, aut vrendos. Ratio est, quia Hydropicis, cum materia colligatur sensim in thorace, non opus est, vt ab initio statim fiat operatio: quia tùm demùm nocet collectio illa, vbi in magna quantitate fuerit: At tabescentes & empyematici, materiam vnico quafi tractu, rupta vomica, colligunt, vnde statim thorax aperiendus. 1. ne patiens suffocetur propter dilatationem pulmonum, à materię purulente quantitate, impeditam. 2. ne ab erodente pure, vel in pulmonibus, vel in alia thoracis parte, vlcus aliquod nascatur, quod aut difficillimè, aut nullius postmodum sit curationis.

Quo loco? Debet esse locus talis, in quo tutissimè apertio fieri potest. Loca autem sunt multiplicia, anterius, posterius, ad latus, inferius, & superius. Sed anterius & posterius neque bene neque turò fit thoracis apertio, propter musculum pectoralem, & musculos dorsi admodum nervosos, qui valdè periculosè inciduntur. Ergo restat, vt apertio instituitur ad latus, & vel superius vel inferius, nam in hoc musculi pectori non ita adhærent. Anterius tamen aliquando, in regione scilicet sterni, si materia inter mediastinum fuerit collecta, fieri solet apertio. Paulus ergò lib. 6. c. 44. in superiori lateris parte; Hippocrates vero lib. 2. de morbis in inferiore thoracem aperit. In superiore quidem inter 5. & 6. costam numerando à supernis. Tabul. XXXVII. Fig. II. Q in inferiore inter 3, & 3. numerando ab infernis, XXXVII. Fig. II. R.

Paulus locum suum inuenit, numeratis vertebra thoracis, à supernis incipiendo, inter 5. & 6. vertebra filum imponit in apice spinæ dorsi, & ad medium sternum deducit: deinde tertiam fili partem, eaque à sterno ad spinā demetit, & quo extremitas fili triplicati pertingit, locum atramento signat: qui ita signatus rectam & perpendicularem cum papilla mamarum facit lineam Tab. XXXVII. Fig. III. Hippocrates inter 3. & 4. costam pectus aperit numerando ab infernis, & causa est, quia hac ratione prius, aliaque in thorace contenta materia, melius effluit; & eligit locum, vbi est eminentia illa & flexura costarum, quibus musculi adnascuntur, non tamen super illam, aut retrouersus deorsum, cò quod ibi musculi nervosi apertionem impedian, sed paulò anterius versus sternum. Tab. XXXVII. Fig.

Fig. II. *U*. Videtur quidem in hoc loco periculum esse propter diaphragma, ne lædatur, nullum tamen est, quia diaphragma, ubi costis adhæret, ràm altè non ascendit (copia enim materia deprimitur) vt lædi possit. Vbi ergò materia collecta fuerit, ibi apertio molienda est. Si in parte sinistra, in latere sinistro aperiatur thorax: si in dextra, in dextro; si in utroque, utrobique. Ex his tamen recensitis locis, Hippocraticus eligendus, quod pus, vel aliena materia in thorace collecta, ob decliniorè apertionis situm, melius euacuetur, quàm in Paulino. Hic tamen non simpliciter contemnendus, siquidem si re paulò diligentius consideratà, in latere dextro sit administranda apertio, locus Paulinus Hippocratico præferendus, quod in dextro latere hepar gibba sui parte diaphragma sursum pellat; in sinistro verò Hippocraticus, quod diaphragma, ob humiliorem lienis sedem, & copiam materię, ad inferiora detrudi possit; Vnde Hipp. lib. 2. de morb. inquit, optandum esset, vt in sinistra parte materia euacuanda semper decubebet, vel Paulino inferior, scilicet inter costam 6. & 7. *Θ*. Tabul. XXXVII. Figur. II. In viuus namque non ita altè ascendit diaphragma, vt in mortuis. His igitur in locis thorax aperitur sine offensione pericardij, pulmonem, & sepi transuersi.

Modus autem hic est. Thoracis apertio fit vel sectione, vel vstione, vel perforatione. Sectionis & vstionis mentionem facit Hipp. *sect. 7. aph. 47.* dum inquit, quicumque suppurati vruntur vel secantur, &c. vstionis verò lib. 2. de morbis. In omnibus tribus modis consideranda sunt ægri decubitus, respiratio, instrumenta & operatio. *Quod decubitus attinet*, ægri corpus & brachium lateris aperiendi mediam habeant figuram, ne muscoli nimium contrahantur: Vnde in modo Pauli supinus iaceat æger, in Hippocratis autem pronus. *Respirationem* quod concernit, in modo Hippocratico æger debet expirare, pulmones concidant; in Paulino autem spiritum continere, vt diaphragma deprimatur. *Instrumenta* pro diuerso operandi modo variant. In sectione Hippocr. vtitur scalpello. Tab. II. Fig. I. descripto, & spatha dicto. Paulus verò thoracè apertit *σκολόπομαχαρπίω* gladiolo scilicet longo, & ad cuspidem paulùm recuruato, Tabul. XII. Fig. I. *Recentiores utroque scalpello.* In vstione verò Hippocrates vsurpat ferrum oblongum, nec admodùm crassum, eo quod post iniustionem foramen maius fiat, quàm instrumenti est crassities. Hippocrates etiam costam terebrà cauà, in cochleæ formam fabrefacta (non solida, qualem habent sutores, dum perforant calceorum soleas ad filum trahendū.) perforat. Hę tres operationes, pro diuersitate materię in thorace contentę, sunt adhibendę, nā cum alia materia crassa sit, & alia tenuis: illa foramen maius, hæc verò minus requirit. In crassa itaque, ubi pus collectum est, debet fieri sectio, in tenui verò &

aquosa, veluti in hydrophe thoracis, vel vitione musculorum vel perforatione costæ pectus aperiendum censet Paulus, & Hippocrates. Recentiores vitioni & perforationi præferunt sectionem, quam minorem faciunt in hydrophe thoracis, maiorem in suppuratis, & maximam in materia pituitosæ collectione.

Section thoracis ita peragitur: inuento loco, attamentoq; notato, & ger in medio collocetur litus: deinde cutis scalpello Tab. XII. Fig. I. & Tab. huius Fig. III. obliquè postetiora & superiora versus incidatur: hinc scalpellus (Tab. II. Fig. I.) panniculo albo obligatus (ita ut summa ipsius pars saltem ad unguis magni digiti mensuram expediat) estes, ne altius, quam par est, intramissis aliquid ledat) musculisq; intercostalibus externis adhibitis, seculum & paulatim adigatur, donec in cauitatem thotacis penetret. Tab. huius Fig. IV. ♂. Quod si vulnus hoc præter spem angustius fuerit, & materia crassior, tunc vel illud scalpello, Tab. XII. Fig. I. & Tab. huius Fig. V. E. quod pulmones propter obstaculum in extremitate positum offendere nequit, dilatandum: vel aut materia liquidior reddatur, aqua mulla per siphonem, Tab. huius Fig. IV. ☉ infundenda est in thoracem. *Facta sectione, emittatur quidem materia in thorace contenta* (non tamen tota unica vice, ne vires ægro deficient, aut maius malum succedat. Si unica vice velimus euacuare, tunc natura, collectæ materiæ quasi assueta, præsentit aliquod vacuum, pro quo euitando, in subsidium mittit omnes in toto corpore cõtētos humores, vnde maius empyema, quam fuit antea, orietur) *quotidiè ad 3. vj. vel ʒ. j. vel quantum vires ferunt.* Hac materiæ quantitate emissâ, vulnus rurunda ex stippe, vel lino crudo confecta, & filo alligata, singulis diebus obturetur vsque in decimum diem: vbi materia fere omnis euacuata est, per quinque dies vinum & oleum tepefactum per fistulam (Tabul. huius Fig. IV. ☉) infundatur; ne pulmones humectari soliti de repente exsiccantur; deinde cannula argentea Tab. huius Fig. IV. B. indatur, ut liquor, manè vel vespere infusus, emitti possit: *quod enim mane in thoracem infunditur, ad vespem euacuetur; quod verò vespere, manè.* Post decimum quintum sectionis diem, cannulæ argenteæ substituatutur tutunda ex linceo cerâ albâ oblinito, caua, ne vulnus in fistulam immedicabilem degeneret, aut materia in thorace remaneat. Quando thorax omninò exsiccatus est, penicillus ex linceo incerato cauius, in crassitiè & longitudine quotidie minuatur, donec vulnus carne repletum, cicatrice possit obduci. In materia tamen aquosa, vel pure tenui, statim post apertionem thoracis, foramini imponatur cannula exactè respondens, & cannulæ penicillus filo alligatus, ne aqua vel pus tenue vniuersim effluat, & ægri moriantur (monente Hipp. sect. 6. aphor. 27.) sed ut tantum materiæ, quantum virium

ratio

ratio permittit, euacuetur. Quod si ob aeris frigiditatem, aliamque causam, consultum non est, ut quotidie semel vel bis materiae detur exitus, cannulae spongiola Tab. huius Fig. IV. D. imponatur, pilcolusque Tab. huius Fig. IV. C. addatur, ut materia omni-quasi momento per eius foramina, paulatim & citra virium iacturam, transudet.

Fig. V. Vulnerum thoracis & abdominis dilationem exhibet, quae scalpellis peragitur.

Vulnus cuicunque thoracis loco inflictum vel penetrat & pleuram perforat; vel non perforat, & eam minimè pertundit. Illud iterum vel est angustum vel latum, & utrumque vel cum partium internarum lésione, vel sine ea.

Vulnus thoracis infra 6. constam acceptum, in cavitatem penetrans, & sine partium internarum lésione satis latum, nunquam cõsuatur, aut per primam intentionem curetur, ne materiae, quae in cavitatem thoracis fluxit, cum ægrotantis vitæ periculo, præcludatur exitus: sed immittatur primum turunda ex lino crudo parata, filo alligata (ne inspiratione in thoracem rapiatur) & sanguinem sistentibus imbuta, ut apertum maneat vulnus. Secundo, & reliquis diebus, vulnus turunda ex linteo parùm detrito confecta, & medicamento pus mouente oblinita digeratur, & apertum conseruetur, ut materia collecta liberè possit exire.

Quod si materia intra thoracem collecta fuerit crassa, atque ad exitum per vulnus inepta, illa attenuetur iniectionis per aliquot dies lauacris, ex decoctione hordei, passularum & melle rosato, & vulnere imponatur cannula argentea, Tab. huius Fig. IV. B. digestiuo oblinita, spongia eiusdem Tab. Fig. IV. D. obrurata, & pilcolo, ibidem C. cooperta, ut pus iniectione decoctionis sensim & sensim expurgatur. Quando purulenta materia conuenienter expurgata fuerit, loco cannulae ex argento alatae, vulnere immittatur turunda ex linteo incerato caua, sarcoticoque imbuta, quae quotidie, ut suprà dictum, minor & breuior fiat, ne carnis generationem impediat: Quando prædictum vulnus fuerit angustum, statim scalpello, E Fig. V. huius Tab. dilatetur ad materiam expurgandam.

Vulnere supra quintam thoracis costam penetrante, siue lato, siue angusto, turunda foramen, stegnotico imbuta, & filo alligata, apertum teneatur, ut eodem, vel sequente die, sanguis in thorace nondum concretus, per applicitum canalem, Tab. huius Figur. IV. A. extrahi possit.

Quod si materia ob sui crassitiem, vel sublimiorem vulnere situm, per hunc canalem haud effluat, apertio thoracis maturè proponatur, eaque ab ægro vel adstantibus consanguineis concessa, peragatur; modo sub explicatione Fig. III. & IV. huius Tab. fufius traditur.


Hæc præsidio Chirurgiæ præsentaneo non admissio, cum materia per vulneris orificium, vel ex se satis latum, vel scalpello frustra dilatatum, effluere nequeat, illa prædicto viri ægrotantis periculo, diureticis potius per os exhibitis tentetur euacuari, quam eclegmatibus expectorari.

In vulneribus thoracis cum parua pulmonum, vel diaphragmatis ad partem carnosam iucisione, non solum procuretur materiæ vel per vulnus ex se latum, aut scalpello dilatatum, vel per foramen nouum, vel per vias vrinarias exclusio, verum etiam per Siphonem in thoracem infundatur, primò decoctum venas sanguinem fundentes constringens, secundo materiam crassam attenuans, tertio vulnus internum detergens, & denique quartò illud consolidans.

Ex *vulnere abdominis* penetrante, vel prolabitur omentum, vel intestina. Si omentum prolapsum sit, considerandum erit, an sanum adhuc sit, vel putrefactum. Si sanum, tunc statim, vino calido lotum, blâdè manuum digitis intro pellendum; deinde vulneris labia ad mutuum contactum ducenda, adductaque futuris, Tabul. XXXIX. Figur. V. delineatis, conseruanda. Quod si omentum putrefactum sit, erit extrahendum, & filo, ex serico simplici & rubeo, fortissimè constringendum; tum verò portio corrupta supra filum adstrictum, scalpello amputanda, reliquum verò, quod sanum est, vino calido abluendum, blandèque in abdomen reducendum, filo longo extorsum propendens: deinde vulnus futuris modò citatis coniungendum, sic tamen, vt aliquod spatium, vbi filum propendet, relinquatur. Quod si intestina fuerint prolapsa, statim & atequam flatibus repleantur, digitis citra violentiam impulsæ, in abdomen recondantur. Si foramen, seu vulnus abdominis sit angustum, & intestinum prolapsum, & ob longam extra ventrem moram, à frigidi aëris contactu, flatibus repletum, & adeo turgidum, vt manuum opera ipsum intromittere impossibile sit, tunc diu foueatur spongia vino albo & calenti expressa, *aut massa lini crudi in lixivio acri decocta*, vt status diffundatur, deinde reducatur, & vulnus abdominis debitè consuatur. Si hæc ratione intestini prolapsi reductio non succedat, vulnus syringotomo G & F. dilatetur, vt intestinum intromitti, & vulnus dilatatum, iuxta Galeni regulam, consui queat.

Fig. VI. H. Quod si sub vulnere abdominis penetrante, *intestina crassiora casim vulnerata* sint, tunc blandè protrahantur & *consuantur* eo modo, quo pelliones pelles consue solent, relicta apertione fili ex lino contorti, vt extra vulnus abdominis propendeat; postea vino calenti abluantur, & sensim in suum locum reponantur; Vltimo repositorum futuræ inspergantur pulueres ex thure, mastiche, pyrethro, &c, vulnusque abdominis fibulis vniendum.

Papilla



Papilla lactantium I. non rarò intra mammas ita occultantur, vt ipſas infans recens natus neque ore apprehendere, neque ex ijs lac fugere valeat. In ſimili caſu vel nutritrix infantis vitri, Tab. XVI. Fig. V. depiſti baſin admoueat papillæ occultatæ, & oriſicium fiſtulæ ore apprehendat, ſuctuque papillam extrahat: vel natu grandior vitrum oblongum K. papillæ applicet, & ſaſcia mamillæ alliget. Quo facto, anguſtiorẽ vitri partem labijs apprehendat, pariterque ſugendo papillam euocet latentem. Amatus Luſitanus vitrum anguſtioris oriſicij L. ſeruenti aquà implet, quam, eo impenſè calefacto, rurfus effundit, vitrique oriſicium ſtatim papillæ admouet: hoc namque ſubito papillæ firmiter adhæret, eamque tam validè extrahit, vt ore infantis facillimè apprehendi poſſit. Dicta instrumenta non ſolùm papillas, verùm etiam lac euocant. Quod ſi igitur necèſſe non eſt, vt ſimul cum papillis lac extrahatur, ratiſſimè papillis extrahendis applicatur digitale, ex ligno hederæ paratum.

T A B V L A XXXVIII.

De abſciſſione mamma carcinomate exulcerato affectæ, perforatione fundi fiſtularum ſubter coſtas reptantium, conſtrictione umbilici Celfina, & cingulo umbilicali.

FIG. I. oſtendit mamma dextræ carcinomate exulcerato affectæ baſin duabus acubus Tab. XII. Fig. VIII. quæ ſilum ex lino contortum trahunt, *traieſtam*.

Fig. II. monſtrat, quomodo Chirurgus ſilorum tranſmiſſorum capita collecta, manu ſiniſtra apprehendat, & dextrâ ſcalpellum, Tab. XII. Fig. VII. adigat, eoque *cancrum radicibus abſcindat*.

Fig. III. exhibet *cancrum à pectore abſciſſum*, qui ſex libras Medicinales pendit.

Fig. IV. docet, quomodo Chirurgus, poſt abſciſſionem mammæ exulceratæ, locum ſerramento candente leniter adurat (vid. inf. ſing. hiſtor.) (ſaltem pro corroboratione partis.

Fig. V. eſt *inſtrumentum Hieron. Fabr. ab Aquap. quo pertunditur fiſtula thoracis*, quæ à ſpatio intercoſtali ſuperiore ſubtus coſtâ vnâ vel alteram, vel etiam plures, ſeſe inſinuat, videlicet inter pleuram & coſtas, donec in aliquod coſtarum ſubiectarum ſpatium terminetur. Immittitur cannulæ argenteæ & incuruatæ, a, extremitas, vſque ad fiſtulæ fundum, vt exterius ſpectet: dein per cannulam fiſtulæ immiſſam impellitur acus, b, longa (quæ longè à cuſpide foramen habet, & ſilum ducit) vt fiſtulæ fundus perforetur, & ſilum per ſuperiorem & inferiorem ſinus portam exeat. Perforato fiſtulæ fundo, eximatur acus per nouū ſinus foramen, & ſili extremitates colligantur,

ut fistulæ foramina teneantur aperta, & materia purulenta per in-
fusus effluat, donec sinus subtercostalis, vel carne repleatur, vel agglu-
tinetur: de reliquis thoracis fistulis vid. infra Tab. XXXIX. Fig. IV.

Fig. VI. est Sistrati vinculum, quod maximè conuenit, vbi pectus
morbo afficitur, qui deligationem requirit. Hanc Galen. l. de fascijs,
c. 81. describit. Maximè conuenit, vbi medium pectus, vel dorsum, aut
latera seu thoracem, ob *vulnus præcipue thoracis, aut fracturam co-*
stæ volumus deuincere: duas igitur fasciolas, tres digitos latas iustæ
lōgitudinis *summis* humerorum capitibus iniicimus, earumq; *ambo*
capita recta sinimus dependere: deinde fascia glomerata, *vel vnius*
capitis thoracem totum & latera, vt contegantur, extremamque fas-
ciam modo alligamus, capita verò, quæ&ā priori & posteriori parte
pendebant, fasciæ circuitibus assuimus, ac si longiora fuerint, sursum
conuersa, qua iugulum cum lato scapularum osse committitur, inter
se colligimus.

Fig. VII. ostendit, quomodo *Celsus prominentiam umbilici Chy-*
urgiam curet. Resupinato corpore ægrotantis (vt siue intestinum, siue
omentum, siue vtrumque per umbilicum plerumq; dilatatum prola-
bitur, recondatur) umbilicum forcipe apprehendit, ad se trahit, & ad
basin acu (quæ duo fila setica, simplicia & infecta, ducit) traiecit: po-
stea filorum ansam scalpello incidit, & colligatis vtriusque fili extre-
mitatibus umbilici exaleati basin validissimè constringit, vt id, quod
supra vinculum est, emoriatur, & decidat. Quia tamen dictam Celsi
Chyrturgiam tam faciliè non admittunt ægri, mitiorem & à me sæ-
pius expertam excogitauit Hieron. Fabr. ab Aquapendente, quam
administram medicamento & cingulo sequentis Figuræ.

Occasione huius materiæ, rarissimam in infante, umbilici relatio-
nem, & intestinorum extra corpus propendentium. p. n. prolapsum,
ex matris repentinâ imaginationis impressione, mihi 14. Ian. 1643.
à Clarissimo Domino Doctore Iohann. Georgio Cockelio, Reipubl.
nostræ Physico ordinario Medicoque assiduo, & Collega meo pluri-
mum honorando, acceptam, non immeritò hic inferere placuit. Vil-
lica (ita sonabant verba) quædam Berenstattenfis, Vlmanz ditionis,
Iacobi Hockerii coniux, præcedenti messis tempore, sed primis ge-
stationis mensibus, suburbanis rusticisque operationibus incumbens,
& frumenti per agrum hinc inde sparso manipulos colligens, sub
seruandæ vno, reptatium viperarum aceruam subito animadvertit;
harumque & motum & figuram, umbilicali regioni superimpositâ
manu, ita strenuè sibi imaginata est, vt toto quidem quo vtero gere-
bat tempore, vtcunque benè habuerit, ac heri, circa crepusculum ve-
spertinum, filiam, sacrâ mox vndâ Barbaram initiatam, quoad reli-
qua vigiliam quidem peperit, sed, ex radicatâ illa imaginatione, non
benè

benè formatam, adeò vt omnia natæ huius intestina, aliàs, secundum naturam, in inferiorie ventre occultanda, hic, præter naturam, per relaxatum vmbilicum, extra corpus, tanquam magno in culeo recondita, soloque peritonæo inuestita, conspicienda se brent; quæ etiam extra iam vterum posita (materno videlicet & salutari calore destituta, à circumstante insuper æris frigidiorie læsa, & coarctata,) nec hypocausti calidioris beneficio, non tegumentis, non vilo Medico & artificio, & auxilio, in suo naturali statu conseruari potuerunt. Hinc elapso biduo, & sequenti Dominico die, vix huic ingressa, Mundum, ad beatorum sedes migravit.

Fig. VIII. A. est *cingulum vmbilicale* ex linteo duplici gossipino paratum, quod ea parte E, qua vmbilicum contegit, scutum, veluti placentam, duriusculum obtinet, in cuius centro globulus ex adstricto linteo est, qui in vmbilici dilatationem sese insinuet, vt intestinum, aut omentum, vel vtrumque, rursus exire prohibeat: sed prius ceratum cõstrictiuum super alutum extensum, debet opponi, postea, cingulo applicato, abdomen constringi. Aliqui cingulo vmbilicali A. addunt fascias scapulares B. C. quæ tribus transuersis linteis D. colliganrur & cingulum humeris annectunt, ne descendat, sed firmiter regioni vmbilicali inhæreat. Sed eę necessariæ non sunt, quoniam ossa illi descensionem cinguli, subligamina F. G. verò eiusdem ascensionem, prohibent.

T A B V L A XXXIX.

De cingulo prominentia vmbilici applicito, & modo perforandi abdomen, incidendi fistulas thoracis externas, suendi vulnera abdominis, applicandi brachierium, & enocandi urinam suppressam.

FIG. I. ostendit *cingulum vmbilicale*, Tab. præced. Fig. VIII. *vir applicitum*: quo solo plurimas mediocris vmbilici prominentias tam in viris quam feminis, cum in adultis tum pueris, curauim, & maiores, ne creuerint, prohibui.

Fig. II. & III. monstrat locum, modum & instrumenta paracentesicos, in abdomine hydropicorum peractæ. Circa hanc operationem chirurgicam etiam quatuor consideranda sunt, primò an sit faciēda? secunda quo tempore? tertio quo in loco? quarto quo modo? An faciēda, significabant morbus & ægri vires. Morbus est Ascites tantum aut cum reliquis hydropis speciebus aqua permixta est: si scilicet tumor abdominis, à copiosissimo præsertim aquæ potu, breui temporis spatio ad insignem magnitudinem peruenit, & medicamenta per os exhibita non iuuant, eo quod virtus eorum, calore naturali humoris copia oppresso, in actum deduci minime possit. Vires constantes sunt

sint oportet, quas cognoscimus, quando æger adhuc erectus stare; aut sedili sine incommodo assidere potest. In malo itaque inueterato, viriumque debilitate (quam indicant senium, pueritia, tussis, ventris fluxus, chachexia, febris ardens prægressa, viscerumque schirrhus & corruptela) operatio nullum habet locum. *Tempus* est statim, antequam scilicet in abdomine conclusus humor, visceribus & cæteris interioribus partibus noxam notabilem inferat. *Locus*, in quo fit paracenthesis, vel est in umbilico, vel sub umbilico, tribus aut quatuor digitis ægri transuersis interpositis, idque vel in dextra, vel in sinistra, nunquam media abdominis parte ad lineam albam. Vbi umbilicus ita laxatus est aut tumens, vt inter exteriorē partem, ac internam cavitatem & aquam, tenuissima tantum cutis intercedat, quæ vel ipso tactu, digitique compressione & perspicuitate deprehenditur, commodissimè in umbilico aperitur. Verum si laxitas illa umbilici non appareat, tum abdominis pars umbilico inferior, & dextra perforetur cum lienis vitio, sinistra, si hepatis culpa ascites orta fuerit. *Modus* comprehendit situm patientis, instrumenta, & operandi rationem. *Æger*, qui propter aquam abdomen valdè tumidum & distentum habet, supinus in lecto collocetur, vel scabello infideat. Instrumenta, quibus hydropicorum venter commodissimè aperitur, sunt duplicia, videlicet vel instrumentum ex cannula alata H & acu I. compositum, Tab. XII. Fig. XVII. pro perforatione umbilici: vel scalpellus K ad cuspidem parumper recuruatus, & ex vna tantum parte aciem habens Tab. XII. Fig. I. pro apertione abdominis infra umbilicū. Umbilicus tutissimè perforatur, si instrumentum Tab. XII. Fig. XVII. cannulatum fasciæ assuatur, illudque in medio ipsius adigatur L vsque ad cannulæ asterismum, postea acutè cannula exsimatur, & cannula vsque ad alam abdomini immittatur, ibique relinquatur. Sectio infra umbilicum necessaria variat. Fallopius sectionem administrat hac ratione. Secat prius cutem per transuersum abdominis ad pollicis magnitudinem, gladiolo falcato, & ex altera parte obtuso, qua incisa, reliquum caute perforat scalpello, quo Germani venas ad emittendum sanguinem incidunt, phlebotomo nimirum vulgari. Hieron. Fabric. ab Aquap. eodem vtitur gladiolo, quo Fallopius, sed illud quadantenus oblique incutem demittit, donec ad cauam vsque regionem penetrauerit, & peritonæum etiam perforarit. Ad cavitatem scalpellum penetrasse, non solum aquæ exitus indicio est, verum etiam dignoscitur à Chirurgo in sectione abscessum excitato, quando prementi nihil renititur. Sectione facta, gladiolum extrahit, & cannulam argenteam, tersam, alatam, à lateribus perforatam, longiorem prima vice (in posterum breuiorem N quæ eandemmodò in cavitatem perstringat) ad extremum, obliquam scalpello

pello exactè respondentem, & fasciæ annexam, ne extra foramen labi possit. O. per hanc cannulam humorem serosum non confertim, sed tantum emittit, quantum vires qui expulsu rectissimè & certissimè cognoscuntur, concedunt. Sero in debita quantitate euacuato, cannulam non extrahit, sed in abdomine relinquit, & turunda ex linteo claudit, P. postea aquam iterum educiturus. Hydropici perforati diligenter custodiantur, ne ipsis inscijs soluantur fasciæ, procidat cannula, vnica vice effundatur aqua, & cum patientis interitu, tanti morbi aliàs vnicum semè auxilium infametur. Ad imitationem Fabricij Anno 1625. die 7. Augusti aperui Vlmæ abdomen Nobilissimæ virginis, quæ Ascite, Anasarca & tympanitide laborauit, & annum vnum & dimidium à perforatione integerrimè vixit, postea syncera tympanitide affecta obiit.

Fig. IV. ostendit *incisionem fistulæ thoracis citissimam & quasi momentaneam*, quæ fit syringotomo, quod in altera extremitate habet aciem Q Tab. XIV. Fig. I. circa cuspidem globulo cereo R obuolutam quominus in immisione carnes laceret. Hinc in fistulam immittitur, & vbi ad fundum eius pertingit, per carnem & cutem superincumbentem dextrâ adigitur, vt globulo cereo in vlcere remanente cuspis syringotomi per foramen factum exeat, qua digitis sinistræ apprehensa, amborum foraminum interstitium, vno quasi ictu, inciditur. Monstrat præterea vulnus abdominis pro repositione intestinorum dilatatum, quod in sequenti figura, iuxta Gal. l. 6. *meth. med. c. 4.* sententiam, consuitur, peritonæum scilicet cum musculis, & musculi vicissim cum peritonæo.

Fig. V. docet *modum, quo labia vulneris in abdomine ad mutuum contactum ducantur*, adductaque suturis seu fibulis conseruentur. Repositis intestinis Minister manibus apprehendat vulneris labia, & Chirurgus tantam vulneris partem porrigat, quanta ad consuevendum est necessaria. Infigit autem, 1, acum quæ filum trahit ex lino contortum ab internis & externis, u, introrsum per cutem, a, & musculos, b, subiectos, ad peritonæum, c, vsq; postea in tacto peritonæo, c, huius partis, per alterius partis peritonæum, atque etiam per musculos, ab internis ad extra, acum transmittit, post, exempta acu, ambo filo capita constringit, facitque punctum. Hinc, 2, interiecto spatium vnus digiti transversum, per abdomen eiusdem partis, à supernis & externis, x, introrsum, intacto peritonæo acum transigit, postea per peritonæum, musculos & cutim, ab internis ad extra, acum transmittit, facitque punctum, & ita deinceps pergit, modò perforando modò prætereundo peritonæum, donec tot fiant puncta, b, quot sunt necessaria ad perfectam abdominis suturam.

Hic modus suendi etiam observandus, quando abdomen, post partum caesareum fibulis unendum est.

Fig.

Fig. VI. est *bracherium*, seu *retinaculum hernia*, *inguini Adultorum* sinistro applicandum. Bracherij cingulum, *a*, & subligaculum, *b*, multis foraminibus pertusum; ut claudi rursusque aperiri possit, conficitur è corio leui aut linteo xylyno duplicato. Scutum, *c*, pilis capreoli impletur, ut duriusculum fiat, & intestini, vel omenti prolapsum impediatur; habeat quoque pronexum, *d*, ne transmissum subligaculum ab eo vacillet.

Fig. VII. est *bracherium pueris adhibendum*, quod ex eadem materia concionatum est, ex qua superius differt tamen in eo, quod huius cingulum non in latere, neq; subligaculum anterius, sed vtrumque ad posteriora claudi debeat, ne tam facile aperiri possit pueris.

Fig. VIII. monstrat *bracherium inguini sinistro applicisum*. Repositis reponendis & adhibito cerato super locum affectum idoneo, scutum seu piluullus pilis capreoli, aut lana, duorum vel trium digitorum altitudine infractus apponitur, qui ut firmiter hæreat, nec loco facile moueri queat, cingulo anterius inguini per lumborum regionem cincto & constricto ad latus *a*, nec non subligaculo latiusculo *b*, (quod posterius cingulo annexum, deorsumque ductum, sub scutum diuisione sursum denuo reflexum, per scuti medium permeans & pronexum illum, qui *sento propterea adiungitur, ne subligaculum ab eo declinet, penetrans, cingulo anterius arctè alligatur*) comprimitur.

Ratio curandi enterocolem, à me sapissimè experta.

HÆc consistit in tribus, 1. repositione intestini intra abdomen; 2. conseruatione repositi, ne rursus per inguina ad scrotum descendat; & 3. peritonei, vel relaxati conuictione, vel disrupti consolidatione.

Ante repositionem chirurgus exercitatus diligentissimè consideret, an hernia sit parua, vel magna? an recens, vel phlegmone correpta? an etiam intestinum adhuc flaccidum, vel materia aliqua repletum?

Si hernia parua sit, & recens, intestinumque vacuum, facillimè reduceretur, si ager supinus in lecto collocetur, capite paulum decliu, & pedibus eleuatis, quoniam hac ratione intestina ad septum transversum ruerunt, secum trahunt id, quod ad scrotum descendit.

Si autem hernia *magna sit & recens*, chirurgum oportet intestinum nulla materia distentum digitis tractare, & illud, capite prius patientis decliuus posito, sensim & sensim, tam diu molliter circumagere, donec paulatim rursus abdomen ingrediatur. Quod si chirurgus manu lassus fuerit, opus est, ut ministrum habeat cordatum, &

in huiusmodi operatione optimè instructum, qui ipsum adiunget, & intestinum digitis similiter tractet.

Hermæ cum associatur aut inflammatio, quam indicat dolor, calor, & febris; *aut flatus*, quorum indicium est rugitus, & dolor extendens sine gravitate; *aut faeces*, quæ cognoscuntur ex biduana vel tri-duana alui suppressione, magna scroti duritie, & dolore gravissimo: tunc à reductione intestini desistendum est, tam diu, donec inflammatio abierit, faeces egressæ, & flatus dissipati fuerint.

Inflammationi *conferat seq. cataplasma.*

℞. Farin: hord. ℥j.

Furfur, tritic. ℥. ss.

Gl. ros. compl. ℥iij.

Vini rubr. q. s. Misc.

Quod *calidè* scroto & inguini impositum valdè digerit, humores modicè repellit & partes efficacissimè roborat. Si post 24. horas non recesserit inflammatio, cataplasma toties renouetur, & applicetur, quoties ad curandum phlegmonem opus videbitur. Cataplasmati, ob caloris vehementiam, nimis exsiccat, atque idèò separatu difficili, affundatur Oenelæm calidum. Inflammatus quoque locus pari utilitate *ex Fallopio* fouetur lixiuo calido, in quo cineres ex ligno fagino ebullierint. Accipiātur igitur duæ fili crudi (*quod suam dirigendi vim lotura fullonum nondum amisit*) massæ, indantur cacabo, & coquantur cū manipulo dimidio seminū cymini in lixiuo acris: deinde massarū vna extrahatur, inter duos discos exprimatur, expansa calidè, quantū ferre potest eger, circa scrotū apponatur, tepescens remouearur, & alia substituatur, eaq; repetatur, donec inflammatio omninò sublata fuerit. *Cum dolor inflammationem comitatur ingens, tunc cataplasmati, vel fomento, aliqua vel maior portio addatur olei rosati.*

Si *cum inflammatione concurrant faeces*, quæ repositionem intestini impediant, casus quidem est maximè desperatus: nihilominus tamen (*omissis purgantibus per os exhibitis, quæ maiorem aliàs humorum ad partem affectam affluxum causarent, & ut ipsa mors, teste Fallopio, agrotantibus acceleretur.*) scæcum tentetur educio, balneis aut fomentis distensionem relaxantibus, & clysteribus lenientibus, moderata quantitate iniectis. Vitetur scæcium interim generatio; exhibitis patienti cibis boni succi & pauci excrementi, quales sunt iuscula carniū tenuia, contusa, oua forbilia &c.

Flatus etiam sæpissimè absque inflammatione intestinum replent, quo in casu nihil præstantius est fomento, quod ex decoctione lixiuij acris, seminibus cymini & filo crudo, atque pauca additione vini maluatici potentis paratur. Inflammatione curata, scæcibus excretis, & flatibus dissipatis, reponatur intestinum in propriam sedem digitis sensim ac sensim impellendo.

Post

Post repositionem intestini, ob relaxationem peritonæi, in scrotum prolapsi, ceratum constrictiuum ab Hier. Fabr. ab Aquap. commendatum, quod

℞. Boli Armen.

Sanguin. Dracon.

Mastic..

Sarcocoll. ana. ʒj.

Bisling.

Tegul. pulu. ana. ʒiij.

Resin. pin. ʒj. f.

Oni album.

Ceræ. ana. q. s. M. f. Ceratum.

extendatur super corium tenue & molle, & magnitudinem loci affecti, ut cum non multum excedat, ac, derasis prius inguini pilis, applicetur, nec renouetur, nisi amplius curi adhærescere nolit. Apposito cerato, bracherium Fig. VI. inguini rectè adalligetur Fig. IIX. ut foramen peritonæi, per quod intestina prorumpunt, comprimat.

Si propter *disruptionem peritonæi*, intestina ad scrotum dilabuntur, adstringentibus glutinantia immisceantur, ut

℞. Cerat. constrict. Hier. Fabr. ab Aquap.

Empl. Apostolicon. Nicol. ana. p. xq.

M. & malax. cum ol. masticin.

extendatur in corio, & cum bracherio inguini applicetur, pro conservatione intestini in suo loco & cōsolidatione aperturæ, per quam sibi viam ad scrotum parat intestinum. Præcipua enim cura consistit in remedijs externis, & exquisito subligaculo.

His non conferentibus, necessaria est vniuersa corporis expurgatio, ab humoribus serosis præsertim & pituitosis, qui peritonæi, vel rupti, vel dilati, consolidationem ac constrictionem, ex se difficilem impediunt: adde etiam, quod cum necessarium sit, non modò externis uti adstrictorijs, verum etiam internis, si omiſſa vniuersalium administratione corpus excrementitijs humoribus scateret, obstructionibus viscerum inde enatis, in febres, aut alia mala, incidere posset. *Expurgatio autem fiat blandis medicamentis.* Præmissis vniuersalibus, confugiendum erit ad constringentia interna & externa. Inter assumenda expertissimum habeo sequens Electuarium.

℞. Conseru. Symp. ʒij.

Roſ. antiq. ʒj.

Cortic. citr. cond.

Arantior. cond. ana ʒß.

Pulu. herb. persfol.

Herniar.

Ling.

Ling. serpent.

Rad. consol. mai. ana. ʒjss.

Semin. plantag. ʒiv.

Cichor.

Fœnicul. ana. ʒj.

Corall. rubr. præp. ʒjss.

Marg. præp. ʒß.

Lapid. chrysol. præp. ʒj.

Syrup. myrtin. vel corall. q s.

M. F. Electuar.

De quo patiens, quatuor horis ante prandium, & tribus ante coenam, deglutiat quantitatem nucis iuglandis, & superbibat scyphum vini rubri austeri, aut albi, in quo infusus sit sequens sacculus.

℞ Herb. Fragar.

Consol. med.

Vinc. peruin.

Equiseti.

Ling. serpent.

Perfol. ana. Mj.

Rad. sigill. Salom. ʒjss.

Conf. l. Maj. ʒj.

Semin. plantag. ʒß.

Cichor. ʒ ij.

Fœnicul. ʒ. ij.

Cumin. ʒj.

Incis. & contus. Misc. ad sacculum, qui in tribus mens. vin. alb. infund.

Si febris ratione vinum non conceditur merum, aqua illud diluatur, & folijs alchimillæ alteretur. In infantibus etiam præstantissimus est pulvis sequens.

℞ Rad. consol. mai.

Herb. ling. serpent.

Perfoliat.

Herniar. ana. ʒj.

Semin. plantag. ʒiv.

Fœnicul.

Cichor. ana. ʒj.

Corall. rubr. præp. ʒij.

Marg. præp. ʒj.

Lapid. Chrysol. præp. ʒß.

Sacch. ros. tab. q. s. ad grat. sapor.

M. F. pulvis

de quo, manè & vesperi, exhibeatur cochlear paruum in pulmento.
Assumpto pulvere infans bibat de hac mixtura, vel sequente deco-
cto.

℞. Aquæ plantag.
Fragariæ ana ʒ vj. M.
& si lubet, edulcor. saccharo. vel
℞. Radic. consol. maj.
Herb. vinc. peruinc.
Consol. med.
Semin. plantag. ana. ʒ ij.
Inesf. Miscæ ad chartam
pro decocto.

Inter vsum remediorum internorum, ceratula etiam idoneum, *sub bracherio accommodato*, inguini applicetur, & quotiescunque renouandum, locus affectus (*dum patiens resupinus in lecta decum-
bit.*) foveatur seq. decocto.

℞. Rad. consol. maior.
Tormentill. ana. ʒ j. ʒ.
Herb. vinc. peruinc.
Fragar.
Ling. serpentin.
Bisting.
Herniar.
Perfol. ana. Mj.
Flor. ros. rub.
Bakustior. ana M ʒ.
Cortic. granat.
Cupul. gland.
Semin. Sumach. ana. ʒ ij.

Inesf. decoq. in vin. rubr.

nouum postea ceratum apponatur, & relinquatur, donec eui am-
plius non adhæreat. Hæc autem cerati mutatio, locique affecti fo-
mentatio tam diu repetatur, quousque peritonæi vel dilatio, vel
ruptura constricta, aut adglutinata fuerit. Hæc etiam, tam interna
quàm externa remedia, minimè proderunt, nisi recta victus ratio ob-
seruetur. Euitanda igitur edulia quæcunque dulcia, sterculenta, &
prauis succi, è quorum numero sunt omnes herbæ crudæ, legumina,
fructus horarij, lacticia, & his similia: Vitendum pane probe cocto,
addito anisi vel cumini semine. Vescendum præterea carnibus siccis
ad constringendum, & viscidis ad consolidandum: illas suppeditant
turdi, merulæ & perdices; has vitulorum, ac anserum, anatunquæ
pedes & alæ, elixæ potius, quàm alæ subministrant. Potus ordina-
rius

rius sit vinum minimè dulce, nec album, sed rubrum subadstringens, aut saltem mediij saporis. Sed *cibus & potus, in parua quantitate assumptus, ad maturam sanitatis recuperationem plurimum conducit.* Eger supinus, & capite & pedibus eleuatus, in lecto se contineat ad minimum per quadraginta dies, & summam subligaculi curam habeat, nec vnquam sine bracherio per breuissimum temporis spatium surgat, multò minus ventrem exoneret, ne intestina procidentia, id quod iam medicamentis constrictum vel consolidatum fuit, rursus aperiant. Opera etiam danda est, vt quotidie aluus laxa sit, ne dum induratae faeces cum labore excernuntur, conarus ille plurimum obstat. Ad leniendam aluum strictiorem profunt pruna laxatiua Augustanorum, si eorum quatuor vel quinque hora ante cibum, assumantur. Nec obest, cum semel in septimana superfuitates primae regionis expurgantur, pilulis Aleoticis Hieron. Fabric. scrupuli pondere hora ante cenam assumptis, vel clystere ad vesperam iniecto, qui componatur ex decocto emolliente & refrigerante, melle rosato, elect. lenicij & oleo chamomillæ, per plurimos dies aluum lubricum relinquet.

Elapsis quadraginta diebus, aeger surgat quidem, sed ceratum cum bracherio gesser, donec tutò remoueri posse videantur. Eri nullas castratorum herniosos absque periculosissima illa testiculorum excisione (Tabul. XL. Figur. IIX. &c.) citra recidiu metum curari posse credat: innumeros tamen, quorum cognomina silentio lubens prætereo, longo temporis progressu, & magna adhibita cura, dictis remedijs, victus ratione, atque bracherio, pristinae sanitati tutissime restitui: quos verò vel ob affectus magnitudinem, vel diuturnitatem integre sanare non potui, eos saltè præseruari, ne morbus adaugeretur.

Fig. IX. Ostendit, quomodo *urina suppressa per catheterem eductur*; quæ operatio chirurgica experto Medico est facilis, imperito & contra satis difficilis, & periculosa. Hanc describit Celsus l. 7. c. 26. Res verò interdum cogit emoliri manuali *opera* vrinam, cum illa non redditur, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine, intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio, aut *caruncula mentum urinarium obstruens*, sæpè eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in foeminis quoque interdum necessarium est. Ergo *æneæ, vel potius argenteæ*, quas *κατηδνηπας* appellant, fistulae fiunt, quæ vt omni corpori grandiori minorique sufficiant, ad mares tres, ad foeminas duæ, Medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque sit digitorum, media duodecim, minima nouem: Ex muliebribus maior nouem, minor sex. *Incuruas verò esse eas, muliebres scilicet*, paulum, sed magis viriles

oportet, omnesque laeves admodum: ac neque nimis crassas neque nimis tenues. Homo *ager*, tùm recubans super subsellium, aut lectum, collocandus est. Medicus autem à dextro latere, sinistra quidem manu, colem masculi continere, dextrà verò fistulam *argenteam oleo inunctam*, *E. leniter demittere* in iter vrinæ debet. Atque vbi ad certam vicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam, in ipsam vesicam compellere, eamque urinà reddita, recipere. *Huc vsque Celsus*. In hac Chirurgia maximè animaduertendum, ne in inquisitione fistulæ argenteæ, valvula carnosa, quæ vasorum seminalium orificia in meatum, vrinarum desinentia claudit, violetur, quod cognoscitur ex intrusionis difficultate, dolore, & sanguine emanante. His enim signis apparentibus, retrahenda paulùm fistula est, rursusque leniter intrudenda, donec, valvulà intactà, vesicam ingreditur, per eamque vrina reddatur. Alij filo argenteo, fistulæ cavitati respondentem, gossipij floccum alligant, & in catheteris cavitatem immittunt, eumque cum fistula in vesicam impellunt. Vbi fistula in vesicam peruenierit, filum cum lana alligata è fistula retrahunt, & ita quasi per siphonem eliciunt urinam. Sed neque gossipium, neque filum est necessarium. Non gossipium, quia per syringam ad latera perforatum liberè exit vrina: Non filum, quia propter dictam rationem, magis officit, quàm prodest; dum enim filum è cannula trahitur, non raro fistulam simul educunt, cum maiori difficultate iterum emittendam. Vbi vrina supprimitur ob vesicæ inflammationem, catheteris immissio periculo non vacat, lacerata enim cernice inflammatio augetur, & ea cessante sequitur inemendabilis quasi vrinæ incontinentia. Satiùs igitur est, parvâ candellâ cercâ Tabul. XIII. Fig. IX. modicè inflexâ, oleoque communi illitâ, prius Chirurgiam tentare, quàm catheteris vsu malum exasperare. In Ischuria quoque rebus vicio subortâ, frustra adhibetur syringa cercolum, cum vrina in vesica non contineatur.





T A B V L A X L.

De collocatione agri ad explorandum & eximendum calculum à vesica & meatu urinario; mitigatione ardoris urina chirurgica, extirpatione caruncula in uretra p. n. enata; perforatione penis, ligatura verrucarum in praputio venerarum, herniarum cum deperditione; hymenis integri incisione, vulva clausa apertione, vteri que extra abdomen in suum locum prolapsi & repositi conseruatione.

FIG. I. docet situm agri calculo laborantis; in hoc enim explorant calculum vesicæ cathetere A. per uretram immisso, & digito indice ano indito.

Figur. II. præter rationem explorandi calculum, ostendit incisionem perinæ B. supra itinerarium C. vesicæ immissum, scalpello Tabul. II. Fig. II. factam. Sectione facta, lithotomus itinerarium retrahit, & per vulnus perinæ cathetere immittit, ut dilatatorium seu vesicæ specillum super syringam sine offensione in vesicam perveniat. Specillo applicito cathetere extrahit, cervicem dilatat, instrumento idoneo calculum apprehensum educit, &c. De extractione calculi legatur Ambros. Parvus L. 17. à cap. 35. usque ad 48. & absolutissimus tractatus Guil. Fabric. Hildan. de lithotomia vesicæ.

Fig. III. calculus ex meatu urinario sine sectione educitur, propterea quod si ex angustiori loco lapis exiit, puta ex vesicæ collo & orificio, multo magis ex latiore protrahetur, ut est canalis colli. Sumo specillum Aquapendentis, quod in cochlearis similitudinem excavatum in extremo sit D. ut auricularis scalper, quod in canalem dimitto, ita ut lapillum E. prætereat ac superet, ipsumque quadantenus suo labro & cauo comprehendat: tum per specilli stylum cannulatum, uretræ oleum amygdalarum dulcium immitto, & specillum sensim ad me trahio, ita enim deducitur sensim foras lapillus, tum ipsum digitis comprimendo, tum specillo cano trahendo, vid. Tab. XIV. Fig. VIII. Imò sæpius observavi, lapillos eiusmodi, qui in urinarium meatum prolapsi sunt, sine sectione, & citra specilli operam, exiisse: si patiens balneo emolliente frequenter infunderet, & lithontrica moderata prius assumpserit, aut in canalem urinarium stillari permiserit.

Figur. IV. demulcet urina ardorem, qui in Gonorrhæa virulenta dum redditur urina, tam vehemens est, ut patientes potius velint

T A B V L A X L.

De collocatione agri ad explorandum & eximendum calculum à vesica & meatu urinario; mitigatione ardoris urinae chirurgica, extirpatione carunculae in uretra p. n. enata: perforatione penis, ligatura verrucarum in praputio venerearum, herniarum cum deperditione; hymenis integri incisione, vulva clausa aperiens, uterique extra abdomen in suum locum prolapsi & repositi conservatione.

FIG. I. docet situm agri calculo laborantis; in hoc enim explorant calculum vesicae cathetere A. per uretram immisso, & digito indice ano indito.

Figur. II. præter rationem explorandi calculum, ostendit incisionem perinæ B. supra itinerarium C. vesicae immissum, scalpello Tabul. II. Fig. II. factam. Sectione facta, lithotomus itinerarium retrahit, & per vulnus perinæ cathetere immittit, ut dilatatorium seu vesicae specillum super syringam sine offensione in vesicam perveniat. Specillo applicito cathetere extrahit, cervicem dilatat, instrumento idoneo calculum apprehensum educit, &c. De extractione calculi legatur Ambros. Paræus L. 17. à cap. 35. usque ad 48. & absolutissimus tractatus Guil. Fabric. Hildan. de lithotomia vesicae.

Fig. III. calculus ex meatu urinario sine sectione educitur, propterea quod si ex angustiori loco lapis exiit, puta ex vesicae collo & orificio, multo magis ex latiore prorahetur, ut est canalis colli. Sumo specillum Aquapendentis, quod in cochlearis similitudinem excavatum in extremo sit D. ut auricularis scalper, quod in canalem dimitto, ita ut lapillum E. prætereat ac superet, ipsumque quadantenus suo labro & cauo comprehendat: tum per specilli stylum cannulatum, uretrae oleum amygdalarum dulcium immitto, & specillum sensim ad me trahio, ita enim deducitur sensim foras lapillus, tum ipsum digitis comprimendo, tum specillo cauo trahendo, vid. Tab. XIV. Fig. VIII. Imò sæpius observavi, lapillos eni modo, qui in urinarium meatum prolapsi sunt, sine sectione, & circa specilli operam, exiisse: si patiens balneo emolliente frequenter infunderet, & lithontrica moderata prius assumpserit, aut in canalem urinarium stillari permiserit.

Figur. IV. demulcet urinam ardorem, qui in Gonorrhœa virulentam redditur urina, tam vehemens est, ut patientes potius velint mori,

morī, quān mingere. Quando igitur talis inter mingendum percipitur ardor, & dolor qui nullis medicamentis, siue assumptis siue infusis, potest mitigari, patiens glandis meatui immittat fistulam argenteam Politissimam, filijsque alligatam F. quam manibus apprehendit ne fistula, ab irruentis vrinæ impetu, extra meatum colis pellatur, sed ut firmitur maneat, donec per ipsum urinæ absque contactu meatus aut doloris sensu profluat.

Fig. V. Non raro *caruncula ex ulcere in meatu urinario* oritur, atque ita interdum augetur, ut urinam supprimat. Hæc manuali operâ & idoneis medicamentis extirpatur, quæ erodendi vim obtinent. Ne tamen aliæ partes, quān sola caruncula in meatu erodantur, urinaue medicamenta applicita profluens eluat, Hieron. Fabr. ab Aquapend. excogitauit instrumentum, cuius beneficio nihil nisi caruncula exeditur, prohibeturque ne medicamentum carunculæ admotum ab urina, quæ sæpius excerintur, elui possit. Fit autem cannula G. ex linteo, cerâ albâ oblinito (longitudine digiti transuersi, & latitudine ea, ut æquet argenteum catheterem I.) quæ filum longum habeat appensum. Hæc cannula, prius tamen extra idoneo medicamento oblita sit. v.g.

R. Mell. in ciner. uss.

Tutia præp.

Butyr. recent. in aq. plant. lot.

Terebinth. similis lot.

Cera flau. ana 3ß.

Alumin. ussi. 3ß.

M. F. Linimentum.

quod, crebra experientia teste, carunculas meatus urinaris absque dolore & sanarum partium excoriatione consumit. Quidam experimentum Rochi Ceruieri summis laudibus extollunt.

R. Pulv. Q. vin.

Merc. præcip.

Virid. aris.

Antimon. crud. ana. 3iij.

Cera alba 3j.

Misc. s. a. in mortario plumbeo ad formam vnguenti. Cannula igitur Medicamentorum vno oblinita, stylo extra fistulam argenteam prominenti H. adaptetur, atque vna cum argentea fistula & stylo, in urinarium canalem immittatur, donec occurrat caruncula. Et cum iam est in loco carunculæ, argentea fistula cum suo stylo retrahatur, cannula verò, ex linteo cera inducto parata & immissa, relinquatur in meatu, ut per eam urina excernatur, quæ simul

Simul prohibet, ne medicamentum carunculae admodum ab urina elui possit.

Fig. VI. Euenit interdum, vt *infantes sine foramine in glande*, per quod urinam reddant, nascantur, cui statim gladiolo acuto occurrendum, qui cuspidem habet angustiorē. Ager supinus collocetur, & colis, propē glandem, sinistra apprehendatur, ac gladiolo in de xtrā detento, foramen clausum aperiatur, quo facto, foramini immitratur penicillus ex plumbo, subtilis, solidus, & epulotico inunctus, qui dum aeger mingit, debet auscerri, postea iterum intrudi, idque per tres & quatuor dies, donec labia foraminis cicatrice obducantur. Quod si nascantur cum glandis foramine valdē stricto, illud quā citissimē ampliandum immisā parua turundā (quæ conficitur ex medulla sambuci compressā, & vnguento rosaceo oblinītā) vt imbibitā humiditate intumescat, & humefacta foramen dilatet.

Fig. VII. ostendit *excresecitias carnis, in glande & praputia*, Gallicas, earundemque curandi modum; qui commodissimē vinctulis procedit. Nam cum hæ carunculae angustam habeant basin, filo serico simplici, tenui, & rubeo, constringuntur, vt bidui spatium decidant. Vtilissimē nonnunquam oleo antimonij, vel Logadorum, tanguntur: interdum, pari successū, verrucæ volfellā apprehensæ scalpello abscinduntur, deinde locus ferro optimē ignito aduritur, ne sanguis vicinas partes inficiat.

Fig. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. & XIV. monstrant chirurgiam horribilem, quā Nurlini, meo tempore in Italiā celeberrimi castratores, hernias intestinales curarunt. Ager supinus in Tabula ligatur, tota deinde dilatio in inguine obliquē signatur atramento, minister in imo abdominis intestina comprimit, ne foras prorumpant: hinc chirurgus scalpello falcato, obliquā factā sectione cutis, Figur. VIII. (vt peritonæi processus conspici possit. Figur. IX.) eodem gladiolo peritonæum incidit Figur. X. & per foramen Figur. XI. testem sursum expellit, postea indice omnes membranas auellit, & à scroto separat, in primis vaginalem dilatatam Figur. XII. * testemque simul foras trahit: postea vasa spermatica, & tunicam vaginalcm, forcipe accommodatā simul iungit, inde supra sururam testiculum scalpello excidit, & abijcit (Alij, vasa spermatica & tunicam, duobis in locis constringunt, & apprehensis inferioris fili extremitatibus interstitium forcipe incidunt, testiculumque abijciunt.) omnia vasa verò sanguinem fundentia ferramento candente adurit, & intus reponit, filo longo exterius relicto, & ultimo, per foramen inguinis impiecit ferramentum L. Figur. XIV. ad cuspidem globulo cerco man-

tam, usque ad scroti fundum, ut perforetur ad expurgandam materiam, quæ ex inguinis vulnere quotidie in scrotum demittitur, perforatumque conseruat turunda immissa, usque dum vulnus inguinis sanatum fuerit.

Tab. XV. ostendit membranam pudendo muliebri transuersim inductam, quam veteres pro hymene habuerunt.

Fig. XVI. Membrana hymen dicta, concubitum prohibens, ac purgatione menstrui superius perforata, scalpello falcato (Tab. XII. Fig. II. cuius apici cereus affigatur globulus) inciditur, ut mulier viro aptissima reddatur. Quod si pellicula ita vteri vaginam protinus obstruat, eam spatula Celsi Tab. II. Fig. I. incidit Paulus l. 6. cap. 27.

Fig. XVII. docet quomodo Hieron Fabrit. ab Aquap. in agglutinatiis vuluæ labris chirurgiam, iuxta Paulum, administret. Fœminam resupinat (in hac præcedentis figura chirurgia.) ita ut crura ad summum ventrem contracta habeat, femora verò inter se disparata; subiicit autem vlnas ipsius ad poplites, & vinculis idoneis ad ceruicem deligat; deinde scalpello fistulis incidendis destinato, nempe vel Syringotomo in altera extremitate acuto Tab. XIV. Fig. I. vel scolopomachærio Tab. XII. Fig. I II. III. & V. labra agglutinata, prius per longitudinem atramento signata incidit, labris ab inuicem separatis, & sanguinis fluxu sedato, fistula plumbea medicamento epulotico illinatur & vuluæ immittatur, ad perfectam usque curationem, ne labia rursus concrecant.

Fig. XVIII. agit de vteri extra abdomen procidentia, quam patiuntur scæminæ, quando ipsi ligamenta vteri membranosa vel relaxantur, vel abrumpuntur. Huius mali curatio tria requirit; reposicionem vteri prolapsi; repositi in suo loco conseruationem; & ligamentorum vel adstrictionem, vel consolidationem.

Ante reposicionem considerandum est, an procidentia vteri sit simplex, vel ipsi adiungatur inflammatio aut tumor frigidus: His enim apparentibus, repositio non tentetur, donec morbi euanescant. Inflammationem sistet cataplasma vel massa lini cruda in lixiuo acri decocta & expressa, de quibus videatur cura herniæ intestinalis Tabul. XXXIX. sub figur. VIII. Tumorem frigidum discutiet focus ex decoctione maluæ, altheæ, flor. chamomill. &c. Tumoribus dictis curatis, euacuato per clysterem stercore, & excreta vrina (ut vndeque à compressione liber sit vterus) chirurgum vel expertam obstetricem oportet ægrotantem supinam collocare, ita ut coxas altiores habeat & poplites incuruatos, cum cruribus diductis; deinde accipere candelam O (quæ habeat basin) ex cera & assa foetida confectam, suæque crassitie muliebri vaginæ respondentem, & eà citra violentiam totum protrudere id, quod procidit, donec tota moles ad

ad finem reducat. Hoc facto, patiens candelam linteo triplicato in vino rubro expresso, & fasciâ Tab. XII. Fig. III. firmet, per octo vel nouem dies decumbat extensis & coaptatis inter se cruribus, ita ut alterum alteri incumbat; brachio lapidem aquilæ dictum alliget, & paribus suaueolentia, nisi vterinæ suffocationi fuerit obnoxia, admo-ueat. Reposiro vtero, qui ex relaxatione ligamentorum procidit, corpus à serolis & pituitosis humoribus expurgandum & (post cucurbitularum cirra scarificationem cum magna flamma sub umbilico & renibus applicationem, & inter remediorum adstringentium internorum usum). regioni vterinæ & propè inguina ceratum constricti-uum applicandum, circulusque P. buxus vaginæ intrudendus, ibiq; ad perfectam usque curationem relinquendus. Mulier tertio vel quarto quouis die ceratum remoueat & metrenchyæ cannulam Tabulæ XIII. Fig. III. vteri vaginæ immittat: deinde per horæ spatium balneo ex moderatè adstringentibus (validiora enim menses supprimunt) parato insideat, & ceratum renouet. Rerum non naturalium regimen obseruet, quod herniosis loco præcitato fuit præscriptum. Puerperis nondum probè purgatis adstringentium vsus est maximè periculosus. Ligamentis vteri membranosis abruptis, cerato constrictiuo immiscendum est Emplastrum Apostol. Nicolai, vel aliud consolidans.

T A B V L A X L I.

De clitoridis seu mentula mulierum inutiliter aucta abbreviatione, metrenchyta, inspectione ani & matricis, extractique fetus mortui, & repositione intestini prolapsi.

FIG. I. docet, quomodo Hieron. Fabrit. ab Aquap. instrumento ad polypum accommodato, *clitoridis inutile incrementum* (ma-lum Ægyptijs & Arabibus endemium) *abscindas*. A. monstrat clitori-dem forcipe comprehensam. B. exhibet corpus clitoridis excisum, & extra forcipem positum.

Fig. II. notat *metrenchyta* siphoni Tabulæ XIII. Fig. I. *affixam*, ut sinui muliebri immitti possit, ad infundendo idoneos liquores.

Fig. III. monstrat subligaculum, quod detinet medicamenta exter-no vteri orificio apposita.

Figur. IV. exhibet *applicationem speculi vterini*. Tabulæ XVI. Fi-gur. V. depicti, quam Paulus l. 6. cap. 73. sequentibus verbis de-scribit. Locetur femina supina in sella, ita ut crura ad summum ventrem contracta habeat, femora verò inter se disparata. Subijcian-tur autem vlnæ ipsius ad poplites, & vinculis idoneis ad ceruicem deligentur. Qui vero chirurgiam exercet, ex dextris partibus sedens in-

instrumento exploratorio, dioptra appellato, pro ætate conuenienti exploret, & per specillum muliebris sinus profunditatem metiatur, ne si longior sit dioptræ fistula, vterum comprimi contingat. Et si longior sinu reperta fuerit dioptræ fistula, lintea complicata pudendi alis imponantur, quo super ipsa locetur dioptra. Oportet autem fistulam calefactam, oleoque accommodato inunctam, blandè immittere, vt cochleam ad supernam partem habeat: & dioptra quidem ab operante teneatur, cochlea verò per ministrum *circa violentiam* obtorqueatur, quo fistulæ laminis diductis sinus muliebris dispareretur, ad explorandum id quod curam manualet exposcit.

Fig.V. *extrahitur fœtus mortuus vncis* (quando nimirum fœtus, ob situm præternaturalem, testiculis equorum præparatis, quos nobis Horatius Augenius commendat, aut fœminæ alterius lacte expelli nequit) Tab.XVII. Fig.IV. ex Andr. à Cruce depictis, utroque oculorum cauitati immisiss. Si integer hac ratione educi nequit, scalpello. C.Tab.II. incidatur, & obseruatis obseruandis frustratim examinatur. *Vid. plura apud Hieron.Fabris. ab Aquap*

Figur.VI. *anus recens natorum oclusus lanceola perforatur*: post operationem loco affecto applicentur ea, quæ in perforatione penis & vuluæ dicta sunt.

Fig.VII. *monstrat reposicionem prolapsi intestini recti* blandam, & digitis Chirurgi (alii laudant digitos patientis) tentatam, cum linteo quadruplici D.& fascia, ad retinenda medicamenta, & intestinum in suo loco conseruandum.

Fig.VIII. *anus inspicitur dioptra* Tab.XVII. Fig.II. parum calefacta, & vt lubrica reddatur, oleo oblinita, ad explorandum hæmorrhoidum qualitatem, vlcera vero statum exactissimè etiam cognoscimus turunda ano immissa & per integrum diem relicta, atq; retracta. Vlcera intestini recti perspecta tutissimè curantur, cannula (longo manubrio donata & ad latus perforata Tab.XIV. Fig.I.) linteo in vino austero expresso & perforato abducatur (solida enim cannula Tabul.XVI. Fig.I. albumine oui saltem illinitur) & ano immissa ter quaterque stilum optimè ignitum Tab.XVI. Fig.IV. recipiat, veluti supra Tab.XXXVII. Fig.I. in oæææ chirurgia dictum. Operatione finita, locus affectus medicamentis infusus & apposisis tractetur, vsq; ad perfectam curationem.

TABULA XLII.

De incisione fistularum, curatione hamorrhoidum, applicatione enterenchyæ, & duobus monstis.

Fistulæ ani sunt duplices, quædam excitantur ab ulcere intestini recti, quod varias habet causas, pituitam scilicet salisam, bilem acriorem, & morbum (in Regionibus præcipuè calidioribus) Gallicum, quæ erodendo fistulas ani produciunt: alia ortum trahunt à tuberculo (ob equitationem vel casum) exterius circa anum enato & suppurato, cuius sanies, si exitum non habet, sinum efficit profundum.

Priores vel exedunt intestinum rectum, simulque perforant quatuor communia integumenta, ita ut purulenta materia, vel potius sanies, exterius, per cutim egrediatur; vel circa partes musculosas & cutaneas consistunt.

Posteriores iidem, vel intestinum perforant, vel ad intestini recti tunicam tantum exteriorem pertingunt.

Signa fistularum propositarum accuratè tractauit Aquapend. lib. 3. *Pentateuch. cap. 12.* harum singulas, ab Excellentissimo Medico & Chirurgo, Adriano Spigelio, Præceptore meo plurimum honorando (cuius per septennium, ab anno videlicet 1616. usque ad annum Christi 1623. in Antiquissima & celeberrima Vniuersitate Patavinà, quæ non modò per Italiam, sed per totam etiam Europam, & ubique gentium; ob clarissimorum Doctorum splendorem, vetustissimorum studiorum auctoritatem, & sydereâ doctrinâ, ac virtutum omnium monumenta, inter Academiâs ferè principatum obtinet, præparator Anatomicus fueram, & cui in peragendis operationibus chirurgicis per decennium adfueram) ferramentis dextrè incisas, & felicissimo successu curatas vidi: Nec mihi defunt magni nominis viri, animo forti militiam sequentes, ex lue Gallicâ etiam ani fistulis vexati, quos, præceptoris crebra experientia fretus, in Patria curavi, modo sequenti.

Fistularum ani penetrantium curatio.

Fistulam, siue ab ulcere intestini recti, siue à tuberculo in natibus exortam, perforantem, & medicamenti non cedentem, curaturus, specillum depromo argenteum (Fig. I. Lit. B) in utraque extremitate caputibus rotundis, c, d, præditum, illudque pro necessitate incuruo. Huius extremitati, d, & syringotomi (Tab. XIV. Figur. III.) globulo

bulo, e, filum ex lino duplicatum, f, alligo. His ritè peractis, fistulæ orificio, g, *lente* intrudo specillum, illudque vt & filum duplicatum, & globulum scalpelli caput, per ani orificiũ A. traho, *vt ex Fig. II. Lit. b. & i. adumbratione constat.* Postea manu sinistra arripio instrumenti syringotomi incidentis partem, h, dextra verò eius partem, i, atque sic instrumentum trahendo & impellendo fistulam *uno ictu, ne diu agri doloribus torqueantur,* integrè incido. Quæ incisa sanguis fistendus, inflammatio prohibenda, callus (*medicamento R. Mercuri præcip. 3ß. Mel. ros. 3ß. M.*) absumendus, vulnus recens carne implendum, & cicatrix inducenda. Hæc ratione, absque cauterio actuali, quod ab alijs ad callos fistularum consumendos maximè laudatur, fistulæ penetrantes facillimè, & *tutissimè*, curantur.

Fistularum ani non penetrantium curatio.

SI occurrit fistula ani, quæ originem traxit ab ulcere intestini recti, nec tamen integumenta communia perforauit, ad manum sumo specillum, k, quod in vna sui extremitate capitulum rotundum, & pro traiectione fili serici foramine aliquo donatum, l, habet; in altera, pro incisione fundi fistulæ instar acus tricuspidis acuminatum est, cuius apici affigatur pilula cerea, m, quæ instrumenti acumen liberè rem transire habet ad sinus fundum, neque timor est, vt in latera eius impingat, operationem hanc impediatur, & dolorem ex citet. Præparato itaque specillo incerato, ulceris intestini fundum inquiri, coque inuento, specillum fortiter trudendo cutim perforo (Figur. III.) totum illudque per fistulam duco, propendente ex utroque foramine filo serico, o, Figur. V. Perrupto sinu, Cornel. Cellus *lib. 7. cap. 4. de ani fistulis*, & qui cum sequuntur, *utrumque fili contorti (sericum tamen simplex & rubrum, ob tenuitatem & sincturam citius incidit & erodit.)* extremum colligunt, illud transversò, & quodam paruo ligno (n. Figur. V.) arcuissimè stringunt, & vniuersi sinus incisionem filo peragunt: quia tamen fistulæ totius per filum incisio & curatio, (Figur. V.) nimis tardè pcedit, illamque assiduus comitatur dolor, (*omnis autem operatio citò & incunde fieri debet.*) meritò rejicit eam Hieron. Fabricius ab Aquapendente, nec locum habere ait, nisi in ijs, qui meticolose ferrum expauescunt. Vnde ego ita me gero. Fistulæ specillo perforatà, & foraminibus *beneficio serici festucæ arcu per biduũ constrikti* pro vsu syringotomi (Tab. XIV. Fig. II) quod altero extremo capitulum crassius habet, sufficienter dilatatis, festucam, n, &

n, & fericum (Fig. V.) remouens, fistulam incido eum in modum, quem supra Fig. I. & II. descripsi. Hæc posterior per filum, & aciem scalpelli, fistularum curatio, *Celsi & recentiorum opiniones con iungit*, & experientiâ teste fidissimo, simplici per filum incisione melior existit, & tolerabilior, præcipue vero, quando orificia, propter sinus longitudinem, nimium distant. Si & hæc operatio æquo tardior vi, debetur, omnibus bonæ operationis conditionibus satisfaciet chirurgus, si statim fistulam inciderit illo syringotomo, quod in ea ex- tremitate, quæ aliàs globulum habet, incidit. Hoc instrumentum supra Tab. XII. Fig. I. adumbraui, & Tab. XXXIIX. Fig. III applicui. Si fistulæ tales à tuberculo externo & suppurato existerent, curam requirunt eandem, procedendo vt Fig. IV. adumbrat.

Nota. Sphincter, ex Hippocr. de Hæmorrh. tuto potest incidi, quous modo, sine læsione sui officij, si saltem octaua eius pars relinquitur intacta, aliàs sequeretur inuoluntaria secum excretio, & tandem ipsa mors. Fistulæ in senibus, ex antiqua fluxione, turò non curantur, nisi ante consolidationem inuratur fonticulus, tribus vel quatuor digitis supra genu, in parte domestica, pro euacuatione materiæ quotidie collectæ. *Hæmorrhoides*, quæ manuum operationem postulant, vel sunt internæ, vel externæ, quas primus doctissimè ex Anatomia demonstrauit Hieron. Fabricius ab Aquapendēt. in operat. chirurgic. titulo de *Hæmorrhoidibus*.

Hæc primo intuitu apparent, illæ verò non nisi per abdominis compressionem, spiritusque retentionem, aut sæcum excretionem in conspectum veniunt: si chirurgia opus habent, vtrique aut tument, aut immodicè fluunt.

Hæmorrhoidum tumentium curatio manualis.

Nonnunquam tumentibus, dolor aut inflammatio iungitur, & tunc curatio medicamentis potius internis & externis, vnguento nimirum Linaræ Horst. libr. 4. obseru. 42. vel alijs (pro quorum base constituatur scrophularia, quæ sola à sordibus repurgata, collo appensa, & nudo corpore gestata, ad miraculum vsque dolores hæmorrh. mitigat, vid. Tabern. l. 2. fol. 431. & Craton. conf. 207.) tenenda, quàm malum chirurgia qualicunque exasperandum est. Si absque doloris sensu, & sine phlegmone in tumorem attollantur, & occultæ sint, accipio ferramentum. p. Iarun: (x Tab. XIX. petitum) & optimè ignitum, quo ita inuro hæmorrhoides, vt illas tamen non attingam, hoc est, vt ignis tantùm calorem persentiant, ad ægri bonam tolerantiam: si pariens, vt sæpe fieri solet, chirurgiam expauescit, bono etiam tuorū hirudines singulariter præparatas adhibeo.

sanguinem abundantem educo, postea turundam linimento simpliciter oblitito ano impono, & spongiam nouam, ex vino nigro austero, aut in quo ebullierint adstringentia, expressam applico, ad partis corroborationem.

Hippocrates quidem, ad prædictam chirurgiam requirit ferramentum capite rotundo, quale illud, quod Tab. XIX. Fig. V. ad viuum depictum, & in subsequ. Figur. lit. q. signatum est, quo omnes sigillatim resiccat: latum tamen hic magis probandum iudico, quoniam hoc citius finitur operatio; Hippocratis autem præstat, quando vel altera tumentium fluit: quoniam hoc sanguinem fundentes facile præterit, illud latum verò, omnes fluentes cum occæcatis exsiccat, non sine magno patientium detrimento; quod ex animaduersionibus Spigelianis monere volui.

Aliquando hæmorrhoides quidem intumescunt, ob altiore tamen sui in intestino situm, nullo modo in conspectum venire, multo minus ferramento ignito, siue lato, siue rotundo tangi possunt. Tunc, si ex chirurgia auxilium petitur, pro exsiccatione, necessaria est illa cannula, quæ supra Tab. XVI. Fig. III. adumbrata, ano inditur frigida, & calefit stylo ignito (Tab. modo cit. Fig. IV.) æpius cannula immisso, vt calefacta paulatim exsiccet hæmorrhoides.

Hæmorrhoidum nimium fluentium curatio chirurgica.

CUM sanguinem immodicè profundunt, ferro punctuali (Figur. VIII.) omnes sigillatim tangendæ, vnica tantum relicta, per quam sanguis in posterum redundans effluere possit. Earum fluxus interdum tam pertinax est, vt cum facta etiam reuulsione medicamentis adstringentibus, tam ore assumptis, quàm adhibitis sistere, periclitissimo etiam Medico nonnunquam impossibile sit. Hanc pertinaciam expertus sum Venetijs (vbi chirurgiam per integrum annum exercui, & Medicis hæmorrhoides sæpissimè occurrunt curandæ.) in Nobili Venero, ex Contatenorum stirpe nato iuvene 26. annorum, temperamenti sanguinei, tempore veris, laborante primùm (autem hac enim nunquam) hæmorrhoidibus externis nimium fluentibus, ad quem vocatus, venam brachij dexteri internam incidi, dorsoque cucurbitulas sine scarificatione siccas, applicari iussi, conseruam rosarum antiquam cum croco Martis, (non neglectis ligaturis partium superiorum,) per os vt sumeret, exhibui, & medicamenta valenter adstringendi facultate prædita, omique albumine subacta, & gossipio vsto excepta parti affectæ apposui, nihilominus tamen fluxus semper vehemens durauit, ægerque rubicundus aliàs, in pallidissimum fuit mutatus, ita vt de vita sua periclitaretur. Nobili, & adstantibus,

inhi-

inhibendum sanguinis fluxum, & conseruandam vitam, venarum aduersionem, iuxta Hipp. l. de hemorrh. Arrium Terrab. 4. ser. 2. c. 15. & Senner. pr. l. 3. p. 2. c. 13. contra Hier. Fabr. ab Aquap. proposui, propositamque confirmavi Hipp. Aph. 6. sect. 8. Quaecunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat; ea ignis sanat: studio verba illa omittens qua ignis non curat, ea incurabilia iudicare oportet; ne patiens aniam capiat dubitandi de restitutione sanitatis. Patiens autem, cum videret mortem non longè distare, senis nostri sergentiae fidem adhibuit, mihiq; & adstantibus, quod Chirurgiam aduerentem, sibi adhuc reliquam, admittere veller, porrecta manu promisit. Vnde domū festinans, necessarijs me instruxi instrumentis, punctalibus nimirum, (Tab. XIX. Fig. VII. VIII. & IX.) quæ retrocedens famulo Nobilis patientis, vt ea ignita redderet, tradidi: quibus optimè ignitis, omnium venarū hæmorrhoidalium quæ fluxerunt, ostiola, sigillatim tegeri, crustamque induxi, à superioribus incipiendo, ne sanguis ex intactis deflueret, ferramenta ignita exstingeret. Videatur Liden. Sopad. l. 7. animaduers. 112. lectu dignissima.

Sanguine chirurgia suppresso, & optima victus instaurantis regula obseruata, Nobilis ille pristinae sanitati restitutus fuit, cui consilium, vt singulo trimestri cucurbitulas quatuor scapulis & dorso affixas & scarificatas, adhiberet, ne natura in futurum sanguinis abundantiam per venas ani expellere assuescat. His ritè obseruatis, ab hæmorrhoidum fluxu liber, per decennium, integerrima sanitate vixit.

Quod si natura prædicti Nobilis, hæmorrhoides ante hæc sapienter aperuisset, & quasi affueta, ad hanc solam partem superflua transmittere solita fuisset, vnicam hæmorrhoidum ferro intactam reliquissimam, postmodum puluisculis emplasticis, & adstringentibus, occludendam, ita vt spontè, vel arte, facillimè referari, & per eam sanguis, qui in corpore in dies aggregatur, statisque temporibus euacuari solet, purgari possit, ne effectus illi quorum Hipp. mentionem facit sect. 6. Aphor. 12. A diuturnis hæmorrhoidibus curato, nisi vna quæpiam feruetur, periculum est aquæ inter cutem, vel tabes impenderet; Et Epidemiar. l. 6. sect. 3. text. 33. & 34. qui sanguinem per ora venarum quæ in ano sunt, profundere solent, neque inflammatione pulmonis, neque vicere excedente, neque furunculis corripiantur, neque tuberculis, quæ à cicero similitudine terminthi dicuntur, ac fortassis, ne lepra quidem, forteque neque alijs id genus, lateteste tamen curati, multi breui huiusmodi morbis correpti sunt, eamque ob causam perniciosè habuerunt, producantur.

Hæmorrhoides exulcerata.


Internæ, ne in fistulas degenerent, exsiccandæ: Quapropter anodinditur cannula fetrea, quæ in latere perforata, Tabul. XVI. Fig. I. aut III. & huic immittitur stylus optimè candens, Tab. XVI. Fig. IV. ac sæpius extrahitur, quo hæmorrhoidum ulcera adurantur, & partes vicinæ defendantur. Dolore mitigato, & eschæra ablata, vlcus incarnandum, & consolidandum, medicamentis sarcoticis & epuloticis.

Fig. VIII. monstrat applicationem enterenchytæ seu instrumenti fistularis, Tab. XIII. Figur. V. ad infundendos clysteres in anum.

Anno post Christum natum M DC XXXIX. Die XVIII. Iunii, coniux Bartholomæi Abelini, Textoris Vlmani fœtum edidit mortuum, qui in partibus obscænis nullum signum habuit, ex quo cognosci potuisset, masculus ne an fœmina fuerit. Neq; etiam via apparuit vlla, per quam fœtus urinam, aut sêces alui excernere valeret. In peritonæo dependit aliquid ad longitudinem digiti auricularis, quod, instar intestini cæci, perforatum non erat: Ab osse pubis vsque ad calcem ambo pedes arctissimè cohærebant: in reliquis verò partibus fœtus pulcherrimè fuit formatus.

Fig. IX. Anno post Christum natum 1651. die 5. Iulij, hora ferè sextâ post meridiem, in vico V vitrenbach Ducarus V vitrenbergici, coniux Georgij Langij, bubulci, Anna, partum edidit monstruosum, atque ita conformatum, veluti in delineatione cernitur: nimirum duobus capitibus, quatuor pedibus, totidemque brachijs præditû. Hoc, statim atque nascebarur, monstrum Vir Reuerendus Dominus M. Ioan. Riepp: parochus istius loci ordinarius, baptismo donauit, & subsequente 6. Iulij in æde sacra, nomine Christiana & Christianæ insigniuit. Fœtus hora 6. post meridiem ex hac vitâ discessit. Septimo Iulij, cadaueris abdomen & pectus præsentia Domini Christophorij von Rueff: Scordorffij Physici ordinarij, Iacobi Guttelin: Pharmacopæi ibidem proprij genitoris, (ò durum pectus!) & aliorum, secundum artem aperui, & inueni, primum duos ventriculos, quorum vnique annexa fuerint intestina tenuia, quæ tamen ad principium crassorum in vnicum intestinum cæcum, colon & rectum delinebant. Extractis artificiosè intestinis, sub dextro hypochondrio, in conspectum venit vnum solum parenchyma hepatis, in sinistro vnicum lienis, in regione verò lumborum tres renes, totidemque vtereres, magnitudine æquales, orificijs suis in vnicam cystem urinariam hiantes. Generationis organa quod attinet,

vnicus





unicus aderat vterus comparribus omnibus ad generandum necessarijs; pendulum illud post annum non erat perforatum, sed instar intestini cœci oclusum. In capacitate thoracis duo reperi corda totidem capsulis inclusa, vnicum mediastinum, quod corda sic ab invicem separavit, ut vnum in sinistro, & alterum in dextro latere situm habuerit, cuius monstrosi partus externam imaginem operi posthumo adiunxit Authoris ex fratre nepos.

T A B V L A V L T I M A.

De funda Galeni, cancro labiorum, arteria incisa compressione, pedis contracti distensione, cubiti rigidi inflexione, sinus in femore magnæ apertione, locis & fascijs fonticulorum, glandium & vulneribus sclopetorum extractione, varicum sectione, labiorum vulneris per fibulas adductione, tibia cariota abrasione, & deligatura abrasione, & deligatura pectoris, quam Galenus Cataphrasmam vocat.

A Est funda Galeni l. de fasc. c. 62. fascia scilicet in quatuor partes scissa, ad labrum interius deligandum accommodata, cuius descriptionem in gratiam studiosorum chirurgiæ, in primis verò barbitonorum, quibus raro iste liber de fascijs est ad manus, transcribere volui, ut hanc fasciam, eiusque applicandi modum, ad curandos labiotum affectus, præcipuè vero cancerum exulceratum, utilissimum pariter, ac chirurgiam exercentibus scitu summè necessarium addiscerent. Medium quod integrum est inijcito super labium inferius, superiores verò partes ad mentum adducito, atque inde ad occipitium, ibique in speciem literæ X. altera super alteram excedente, ad summum caput, & inter ipsum & frontem attrahito, ministroque tradito, reliquas verò binas partes sub infimis auriculis ad occipitium porrigito, atque ad foramē literæ X ad frontē attrahito, & has & quæ à ministro continebantur inter se devincito

Æ. Indicat labium exulceratum, fascia fundæ ad mentem Galeni deligatum. Patiens erat Gallus Sigman, Rusticus Langinauensis, ex Territorio Vlmensi, canceri labiorum exulcerato affectus, qui postquam à multis chirurgiæ peritis dolens percepisset, se ab isto malo liberari non posse, nisi sectione radicitus extirpetur: patiens ob difficultatem domesticam, qua premebatur, ab Inlyto Recip. Patr. Senatu supplex impetrauit, ut in Xenodochium reciperetur, & cancer ferro, ac manu chirurgi exercitati Georgij Riedlin, abscederet. r.

L

Ab.

Abfiffione per forcipem facta, & vlcere ad cicatricem ferè ducto, malum repullulauit. Senatus inclytus huius recidiuæ certior factus patientem meæ curæ tradidit. Hic ob dolores capitis & artuum nocturnos, mihi valdè suspectus, in Nosocomium Gallico morbo affectis destinatum translatus, decoctum ligni Guaiaci fumpfit, vnde dolores capitis & partium extremarum cessarunt. Cancet verò interim topicis tractatus nihilominus pauperculum vehementissimè cruciauit. Deinde corpus, per sudorifera nimis calefactum, vsu feri caprini deputati refrigerandum, & ab atrabilijs humoribus per epicrasin putgandum existimaui, decocto Magistrali sequenti.

℞. Aq. fluuiatilis lib. XV.

Hord. integr. p. j.

Bulliant in vase obturato ad crepaturam hordei, tunc adde,

Fol. Borragin.

Cichor.

Bethon.

Carduib.

Sonch. ana Mj. & iterum bulliant ad remanentiam ℥xij. abiectis herbis in colatura infund. p. 24. hor.

Rad. Polypod. ℥iij.

Pulu. colocynth. in petia ligat. 3ij.

Rad. hell. nigr. præp. 3s.

Ireos nostratis.

Agaric. crud. ana 3j.

Vuar. Passar. 3j.

Semin. anis. 3ss.

Misce omnia & ebulliant ad consumptionem medietatis, & in fine pro vnica ebullitione adde

Cinamom. optim. 3ij.

Nuc. Mosch. incis. 3j.

Fol. sen. s. stipit. 3j s.

Colatura diuidatur in xix. doses, ut vna dosis sint 3vij. seruabatur in phiala quælibet, super affuso olco ad digiti latitudinem, & dabatur alternis diebus summo mane, à qua patiens iacuit in lecto benè cooptus, donec madorem corporis sentiter, atque post horam iusculum fumpfit, & quia, ob colocynthidem decoctum amariusculum fuit, statim post assumptionem deglutiuit aliquid de pomo asfo, aut 3ss. passularum. Purgans hoc facillè trahit non solum humorem,
qui

qui influere potest, sed eum quoque, qui iam influxit. Et notandum huius solius decocti crebro usu, multos ab exulcerati carcinomatis doloribus liberatos, pluresque à nondum exulcerato fuisse curatos. Hac obiter de decocto.

Præparato corpore, precibus pauperculi deuictus labium forcipe abscidi; primo intuitu bono cum successu. At sequenti die obseruauit tuberculum, quod forfex, vtpote qua ad talem chirurgiam valde est incommoda, reliquit.

Hoc tuberculum puluere illo caustico, quem ab Empyrico acceptum Aquap. describit lib. 1. pentateuch. cap. de cancro, consumere frustra tentavi, indeque de certa curatione dubitare, & imminentem reciduiam timere cœpi. Patiens autem meo iussu, repetiit vsum decocti purgantis, singulis quaternis diebus, & cum vlcus beneficio Vng. de Tutia sequentis,

℞. Ol. ros. complet.

Myrt. ana ℥.

Seui vitul. castr. 3vj.

Succus solat. hortens.

Plantagin. ana. 3x.

Vini granatorum 3iv.

Bulliant ad succ. consumptionem, facta colatura.

℞. Ceruss. puluer. 3x.

Litargyr. præp. 3ijs.

Plumbi vsti & loti.

Antimon. præp. ana. 3v.

Tutia Alaxandr. 3s.

Camphor. 3s.

Misce omnia in mortario plumbeo, &

F. Vng.

ferè ad cicatricem duceretur, remanebat enim solum illud tuberculum, bonà victus regulà internis, externisque remedijs instructus, specitissimæ restitutionis lætissimus domum redire festinauit. At quod supra timui, elapso semestri etiam euenit, recidiua scilicet altera, malum prioribus multò peius. Has reciduias autem forfici, qua operatio peracta, vnicè adscribendas existimo. Hæc enim ad tentatam chirurgiam ineptissima fuit: Si igitur cancer totum labium occupat, Chirurgi meo & Rissalini erroribus docti, eum forfice abscindere cœuant, ferè enim impossibile, quin ea aliquod vestigium relinquat ex quo malum recrudescere queat. Memini quod aliquando in publicis lectionibus ab Excellentissimo Adriano Spigelio, hanc cautionem audiuerim, quam tamen pro nihilo habui, vsque dum in rusti-

to hoc & alio expertus, eâ non obseruatâ, patientes de vita, & de fama chirurgum periclitari: Æger secundam reciduiam passus, etiam tertiam chirurgiam à me petijt, quam monetâ ex argento confectâ, acuta, & aqua forti intinctâ, iuxta Aquapend. placitum, administrassem, absque dubio maiori cum fructu, nisi vasa circum circa maximè tumida, laborem frustaneum fore indicassent. B. est vsus & applicatio illius instrumenti, quod *supra Tabul. XVII. Figur. III. descripsi, & depingi curavi*. Hoc in vulneribus, vel porius puncturis arteriarum carpi, quæ in duello faciliè contingunt, pro sistendo sanguine, vtilissimum expertus sum, vt infra ex singulari obseruatione patebit. Alij sumunt monetam argeuream, quam vulneri superligant; quia tamen ligatura ista satis stricta esse debet (*laxior enim sanguinis fluxum neutiquam cohibet*) ob imminentem manus externæ gangrænam, & sublequentem sphacelum (*comprimuntur enim vasa ut alimentum & spiritus vitales & animales influere nequeant.*) valdè periculosa videtur; vnde hominum saluti melius prospectum iudico, si omnes chirurgi simile instrumentum in promptu habeant, vt tempore necessitatis eo uti valeant. Patavij, ubi exercitium Anatomicum & chirurgicum à plurimis seculis maximè floruit, meo tempore reperiebatur exercitatissimus Arteriotomus, qui ad curandos capitis atrocissimos dolores suasu medicorum, arteriam carpi non raro incidit, factaque sanguinis euacuatione ordinata, vulnus prædicto instrumentato ita compressit, vt ne gutta quidem sanguinis extra chirurgi voluntatem profunderetur, neque vllum ex compressione aliàs metuendum symptoma superueniret. Sæpius Ulmæ accidit, vt ab imperijs balneatoribus, & chirurgi titulo certè indignis, pro vena basilica arteria comes aperiretur, vnde plerumque vel nimia sanguinis profusio, vel aneurisma magnum, quod malè curatum mortem intulit. Si itaque in futurum præter spem talis error committatur, pro correctione huius (præter remedium, quod Clariss. Colleg. DD. Gregor. Horstius obseruationum chirurgicarum prima, lectu certè dignissima proponit) simile instrumētum, quod arteriam comprimendo sanguinis fluxum sistit, aut arteriæ cubiti læsæ adaptetur, meo iudicio non erit alienum. In Heluetia, arterias temporum casu vel arte ruptas & incisas, parte corticis mediæ nucis iuglandis conuexa feliciter comprimunt.

C. Indicat *applicationem ferri* (quod *supra Tabul. XVII. Figur. I. adumbrari curavi* ex Guilhelm. Fabric. Hildan. libello de combustionibus,) inferientis ad genu contracti extensionem. Iacobus Mutdel, Iacobi Lanionis filius 5. annorum, in tertam sili-
 cibis stratum patrem curiendo inscquens & cespitans cecidit, sine doloris querela vsque in quartam diem ambulauit, quo claudicare,

& de

& de genu contuso conqueri cepit. Mater de puero satis sollicita vocat barbitonforem Iohan. Andream, qui statim cataplasma contra cruorem Felicis Mirzen, altera die (pro discussione vt reor) lintheum triplex ex vino calido expressum applicuit. Puer ita tractatus corripitur febre acutissima, quæ remedijs conuenientibus à Medico ritè adhibitis, die quodam critico per abscessum pedis affecti, inflammationem scilicet erysipelatofam soluebatur, quæ totum crus & femur ad inguina vsque occupauit, calore, rubore, & dolore puerum vehementer affligens. Curata inflammatione supererat in genu ante febre contuso tumor ingens, quem cum omnia resoluentia explosisset, ad supputationem ducere tentarunt, & genu tam in parte domestica, quam externa medicamine caustico aperuerunt, materia nulla, vel certè paucissima effluente. Re ita se habente, Medicus ordinarius discessit, & totum curandi negotium Andreæ Barbitonfiori reliquit: hic pro arte & Marte puerum tractauit, vlceraque caustico inusta consolidauit, & tumorem planè indutauit. Mater magis quam vnquam sollicita, & obseruans, bonum virum huic malo esse insufficientem, & propterea etiam anxium, me consilij causa vocauit. Hæc ex relatione. Accedens inueni tumorem in genu haud abfimilem ijs, quos vulgò Olidischroam appellant, puerumque contractum, crus enim extendere non potuit. Facto prognostico, affectum hunc esse ancipitis & quidem diuturnæ curationis, rem ita aggressus; pro emollitione & discussione tumoris, quotidie per quadrantem horæ cum spongia adhibui fomentationem ex sequentibus.

℞. Herbar. Malu.

Verbasci.

Berthon. ana. Mj s.

Flor. Malu. M. j.

Semin. lini. ʒ ij.

Rad. Alth. ʒ ij.

Incis. & contus. ad chartam.

Post fomentationem apposui ceratum diafinipi, quodd *Hieron. Fa-*
brit. ab Aquapend. cap. de melicerid. descripsit, & D. Spigelius ita correxit.

℞. Salis gemm.

Lythargyri aur.

Ceruss. ana. ʒ iv.

Ceræ & Terebint. ana ʒ ij.

Galbani.

Opponon. ana. ʒ ss.

Sinaphi pulu. ʒ ij.

Ol. veter. ʒ ix.

acet. acerr. q. i. F. l. a. ceratum molle.
Sub poplite & ad latera inunxi genu seq.

℞. Vnguent. Eux ʒ ij. s.

Neruin. ʒ vj.

Cerati citrini. ʒ j.

Ol. lumbr. terr. ʒ vj.

Vulpini. ʒ ij.

M. pro Vnguento.

℞. Ol. olinar. ℥ j.

Medul. crur. bouis.

Ceræ flauæ.

Resin. Pin. ana. ʒ ij

Butyr. rec. ʒ ii j.

M. F. Vng. Eux, seu Anodynum, quod Foscarinus ex
 Turcia secum attulit.

℞. Succ. Nicotian. ʒ vj.

Ceræ citrin. recentiss. ʒ iv.

Resin. ʒ ii j.

Terebinth ʒ ij.

Ol. mytrin. q. s. F. cerat. molle.

eius descriptionem habeo ex l. i. Pentateuch. chirurg. Hier. Fabr. ab
 Aquapend. cap. de herpet. miliari.

Vsu fomentationis & cerati continuato, genu detumuit: ex inun-
 ctione verò poplitis pro extensione nullum iuuamen patiens perce-
 pit; quare instrumentum hoc applicui, quo paulatim crus extendi
 possit, ferreum: quod patiens (prius applicato genu corroborationis
 ergo, cerato barbaro, cum Magistrali diastinap. mixto, & facta inun-
 ctione poplitis, cum superposito sparadrappo seq.

℞. Cerati citrini mod. descr. ʒ ij.

Ceræ flauæ nouiss. ʒ ij.

Resin. Terebinthin.

Pin. ana. ʒ j.

Misce ad ignem & intingatur tela.)

continué, noctes diesque portauit, singulis diebus cochleam instru-
 menti parum attrahendo, donec crus in rectum duceretur, vt spatio
 vnius anni patiens sine baculo ambularet. *Causa contractionis erat
 mala pedis situatio, quam cauere debuissent capsula lignea, quam
 videre licet. Tab. XXI. Fig. VI.*

Anno 1636. die 10. Octobris vocatus fui ad puerum Martinum
 Grauium Leipheimensem, qui mihi ostendit crus ex ganglio in genu
 versus posteriora contractum, quod præmissis vniuersalibus, eodem

instrumento iisdemque topicis octo mensium spatio, in directum extendi.

D. instrumenti Tabul. XVIII. Figur. V. descripti vsum ostendit: Nam sicut ad extensionem brachij nil melius, quam lapidis ponderosi in manu gestatio, ita ad flectendum illud paulatim nihil conducibilius sum expertus, quam hoc instrumentum; patiens erat puer militis, qui luxationem cubiti passus, ob malam situationem, eum flectere non potuit: hunc, ut pueros præcedentes, inunxi quotidie, sparadrappum applicui, & instrumentum gestare iussi: hic duorum mensium spatio conualuit, & pro necessitate cubitum, sine doloris sensu & impedimento, flexit. *Observens igitur iuniores chirurgi, ut membra fracta aut luxata commodè collocent*: Non raro enim præter membri contracturam, sequitur inflammatio malam figuram, vid. Tab. XXVI.

E. Anno 1626. die 19. Nouembris me vocat frater meus Martinus, ad socerum suum Ioann. Maluenter, Natum Ulmensem, & in Danubio nauigando versatissimum. Is ipse, quem Clariss. Collega, D.D. Greg. Horstius in suar. obseru. Chirurgic. IX. curauit, ostendit mihi *sinum in femore sinistro* (qui ex contusione ad suppurationem ducta, & negligenter tractata originem duxit) petijtque medelam. Ego sinus magnitudinem specillo explorans, superficialem tantum, ac satis longum & latum inueni. Cum autem huiusmodi sinus decliues, ut notum, raro agglutinentur, seq. die forfice deceptoria supra Tab. VII. Fig. IX. (noudum eo tempore Syringotomis Tab. XII. Fig. II. & III. ac Tab. XIV. Fig. I. descriptis instructus) in scio patiente eum incidere tentavi, postea carne replendum: sed cum nimis tardè per forficem istam fieret operatio, nauta instrumentum animaduertens, semur mouit, manibusque mihi dextram repulit. Vndè seposità curatione per ferrum parumper (ut ex Figura patet) dilatatum, albumine oui conuassato & stuppà pexà, obligau; subsistente sanguine tertio & quarto die per siphonem infundebam hydromel pro eluenda cauitate: quinto, & sexto & septimo vinum nigrum auterum, in quo coquebantur Balauitia, cortices granator. &c. inieci, & spongiam nouam eodem liquore madefactam & expressam fascià longà, & trium digitorum transuersorum latà (latior eum non ita stringit) superligau; ligaturam ab inferioribus incipiens & supra sinum in parte sana finiens; his medicamentis, in quibus magna glutinandi virtus posita, & deligandi modo, intra septimanam, fratris focer felicissimè curatus fuit. Ab eo tempore *nunquam ad Chirurgiam deveni, nisi remedia pharmaceutica frustra fuerint adhibita*: Neque posthac amplius forfice deceptoria (quia Chirurgum, non ægrum decipit) ad sinuum dilationem sum vsum.

F. Indicat *locum fonticulorum in brachia*. Varijs in locis conficiuntur fonticuli, hi tamen in brachijs inuisi reliquis vtiliores, & accommodatiores esse videtur: Vnde etiam à Medicis præ cæteris eliguntur, pro euacuatione scilicet, omnium eorum humorum, qui caput humanum offendere solent; cum inter partes inferiores superioresq; exacte medium situm obtineant, humorum in caput ascensum impediunt, eosque influentes à capite, ob convenientem distantiam, commodissime reuellant, atque deriuent. Nec solum in capitis, oculorum, aurium, narium, oris, faucium & gulæ vitijs, verum etiã in thoracis, cordis, & pulmonum affectibus, magnum & mirandum præstant auxilium. Quamquam autem hi fonticuli in prædictis morbis multum iuuent, & ægris sint accommodatissimi, idque propterea, quod ipsos videre, proprijsque manibus gubernare possint: Nihilominus tamen non pauci reperiuntur, qui fonticulos in genere, vt qui diligentia & laborem requirunt, spernendo sanitatem, planè vituperant: alij ob scortorem detestantur; reliqui verò ob timorem ignis sibi inuri recusant. His respondeo, quod neque vestimenta sine labore, mane & vesperti, induantur & extrahantur, neque excrementa absque fæore reddantur. Sicut autem hoc vel illud ad vitam humanam est necessarium; ita hi ad bene viuendum, & integrã sanitatẽ fruendum, summè viles. Et quemadmodum nullum pœnitet vilius laboris, quem induendo & exuendo impendit, ita nemo de his conqueritur, imò dum ipsos tractat, magna voluptatem sentit, siue propter dulcedinem, quam ex pruritu percipit, siue quod de die in diem manifestè cognoscit illius materiæ euacuationem, quæ secundum errores commissos genita, & in corpore retenta graue malum attulisset: aut potius quod beneficio huius sanitatem amissam adipiscatur. Vnde sæpius vno fonticulo nõ contentus sibi facillè duos, interdum etiam plures, prout opus erit parari curat: adde quod Fonticuli, si arte regantur, non fæteant, & facti in debito loco non doleant.

Locus fonticulorum quatuor condiciones requirit, 1. vt patiens ipsum videat. 2. vt ad ligaturam sit idoneus. 3. vt habeat venam. 4. vt sit in musculorum duorum interstitio, ad prohibendum dolorem, quo impeditur facillè motus.

Locus hic in brachio inuenitur, si chirurgus cubitum patientis, vario modo, voluit, flectit, & extendit, usque dum debitam musculi deltoidis & bicipitis separationem inuenit. Multi conficiunt fonticulum in ipso deltoide, quidam in sine huius, alij in parte posteriore ipsius. Ego tamen, ob dictas condiciones, locum lit. F. notatum eligo, interstitium scilicet musculi deltoidis & bicipitis, idque potius in parte superiore, quæ minus

scu-

sensibilis ; quàm inferiore , ad quam breui temporis spatio decurrit .

Inuento fonticuli loco , modus erit considerandus . Paratur fonticulus scalpello , caustico potenciali , & ferro ignito . Cum verò ferrum ignitum huius chirurgiæ inuentoribus magis vñtatum , caustica potentialia non probo vtpote quæ tarde , & vt plurimum cum dolore magno operantur ; nec ita securè adhibentur , quoniam eorum agendi vis nobis non ita exactè est cognita , sed interdum *præ expectationem nostram efficaciora , non raro impotentiora inueniuntur* . Missum quoque facio ferrum secans , siue salpellum , propter rationes modò recensitas , quibus addo , quod sectio fonticuli sanguinem profundat , quem plures videre nequeunt . Magna dexteritate veteres vrebantur ferro ignito , quod erat incuruatum , & longum habebat manubrium (Tabul. I. Fig. II. depictum .) sed cum vidisset , quod illud instrumentum non solum carnem à chirurgo signatam inurat , sed etiam partes vicinas calefaciat , præter hoc excogitarunt aliud instrumentum cannulatum , quod partes vicinas defendat : vid. Tab. I. Fig. I. Per cannulam hanc non ignitam , & cuti fortiter impressam intrudunt solidum candens , vt penetret secundum Medici intentionem nonnunquam magis & minus profundè . Iulius Casser. Placentinus inuenit instrumentum supra Tab. I. descriptum , & huc Lit. G. signatum , quod ignem occultat , partes vicinas à læsione defendit , & præ cæteris instrumentis *ad omnes fonticulos extra caput inuendos accommodatissimum , & securissimum est* . Hoc me plus quàm sexcentos fonticulos , cum admiratione adstantium , & risu patientis fecisse , testabuntur illi , qui adhuc viuunt , & fonticulos à me paratos gestant .

H. est *fascia pro fonticulis in brachio ligandis commodissima* , quia facillimè ab ægro adaptatur ; vtilissima , quoniam conseruat fonticulum in suo loco ; & pulcherrima , eò quod ex tela alba parata potest leuari : neque hæc , vt reliquæ fasciæ , tam faciliè visus aut tactus sensu deprehenditur .

I. *Locus fonticulorum in femore est* (quatuor digitis transuersis supra genu , inter musculum sartorium & vasum internum , quærendus) ad ligandum aptissimus , & comitem venam saphenam , ubi fonticulus in hysteris affectionibus efficacissimus , reuellendo & deriuando . Curaui eo mulieres , quarum nomini parco , quæ ob suppressionem mensium , vteri furores , aliaque symptomata sunt passæ : plures etiam quæ vlcera in tibijs habuerunt dysepulotica , illis reuellendo , hic intercipiendo & deriuando .

K. est *fonticulus , quem mihi inter principia musculi gastrocnemij* , contra dolorem Ischiadicum summo & felicissimo cum suc-

successu parati. Laudat quidem Excellentiss. Adrian. Spigel. in *hum. corp. fabric. lib. 5. cap. 9.* ob transitum venæ popliteæ inuersionem fonticuli in sura, seu masculi gasterocnemij principiorum coitu, quem Daniel Bucretius in *Iul. Casser. Placensin. Tabul. Anatomie.* (quos ego ære emi Spigeliano ab Hæredib. Casserij) *l. Tab. 2. lit. Græc. π.* notauit. At quoniam locus ille ob suam decliuitatem ad deligandum valde est incommodus, ego iuxta Andr. Vesal. in *corp. hum. fabric. l. 2. Tab. 10. de musculis* locum paulò superiorem elegi, eumque non sine ratione: habet enim huius loci fonticulus omnes boni fonticuli, quas supra recensui conditiones; 1. venam popliteam, quam antiqui & recentiores in Ischiade, alijsque morbis pluribus, quos Aurelius Seuerinus *lib. de angeologia c. 26.* collegit, magno certè cum successu aperiebant. 2. Interstitium principiorum gasterocnemij: neque enim metuendus ille nervus sacris insignis, qui sub genu transcurrit, ut lædatur; nam ubi fonticulus conficitur, nervus progrediendo, iam iam profundiora petijt, ut ferro candente offendi nequeat. 3. Deligaturam firmiter consistentem. 4. Patiens ipse ipsum regere, & gubernare potest. Notissimum est, qui semel Ischiadicis doloribus vexatur, non faciliè ab ijs liberatur, ita ut sibi polliceri possit, se in posterum ab eiusmodi cruciatibus fore immunem. Sanctè tamen testari possum, me metipsum post usum balnei Thalfengensis, vulgò Gesundbrun, in agro Vlmanso siti, beneficio huius fonticuli, per nouennium, à paraxysmo præseruasse, & si vixero forsan vltcrius, venæ Ischiadicæ sectioni, omnibusque purgantibus, sudoriferis, & topicis medicamentis, quæ per annum integrum, ex clarissimorum Medicorum consilijs, assumpsi & adhibui, valedicens. Quare si in futurum in tali cruciatu Ischiadis diuturno, tam interna, quàm externa remedia sine successu usurpata fuerint, meo consilio & bona spe salutis ad hanc chirurgiam, tanquam ad sacram anchoram confugiant, inuersionem scilicet fonticuli in loco signato: non dubito enim, quin patiens sanitatem, Chirurgus verò maximam laudem deportaturus sit.

L. est fasciæ pro fonticulis in femore & sura deligandis, omnium optima.

Quomodo fonticuli iam parati conseruari, rectè que gubernari debeant, ex scheda Aquapendentis, qui eius mentionem facit in *opere suo operationum chirurgicarum, et titulo de fonticulis*, discere potuissimus, nisi illa incuria typographi, cui Author schedam tradidit, ut typis in lucem daret, amissa fuisset. Hac igitur destituti legant elegantissimum tractatum, quem scripsit Hieron. Capiuacius, de recta cauteriorum administratione, & Dominicus Galuanus Medicus Aethënius (cui acceptum refero *spat. adrapp. meum*).

Cerasi

R. Cerati de ceruss. seu Albi cocti Aug. 3xij.

Pulu. ceruss. 3iiij.

Thuris.

Tragacanthi ana 3vj.

Ireos. Flor.

Bez. ana 3v.

Storac. liquid.

Ol. spic. odorati ana 3ij.

Saponis veneti. 3ij.

Ceræ q. l. vel 3ij.

Veronenses Chirurgi, in viris vsurpando addunt parum mochi, ad gratiorem odorem.

Misce s. art. & cum tela noua F. sparadrappum, quo per annos viginti & duos, plus quam fonticulos mille summa cum vsentium admiratione, ab omni symptomatum incurſu præſeruaui de fontanellis. lib. 2. cap. 13. 14. 15. 16. & 17. quæ ad mentem Aquap. ſui Præceptoris, accuratiſſimè ſcripta eſſe certus ſcio, ſtylo tamen Italico, qui dignus eſſet, vt Latinitate donaretur.

Nonnulli miris laudibus deprædicant Ceratum, quo Dux Hetruſiæ fonticulos ſuos ab omni ſymptomatum incurſu præſeruat.

R. Succi Hederæ ʒiiij.

Nicotian. ʒj.

Terebinthin.

Reſin. pin.

Vng. roſ. Meſ.

Cer. citrin. ana ʒj.

Ol. N. Moſch. 3ij.

Pulu. cyper odor. 3j.

Ceruſſ. elect. ʒj.

M. F. Ceratum.

M. Forceps in vulneribus ſcolopetorum, pro extrahendis globulis in profundo ſitis, affabre facta, quam ſupra Tab. XIV. Fig. IX. ad viuum delineauimus.

N. dictæ forcipis uſum, & applicandi modum oſtendit, qui talis eſt: Extrahatur terebellum, & exterior cannuſcula demittatur verſus cochlearia, ita vt inſtrumentum claudatur, & foramen referat inſtrumentum Tab. XIV. Figur. XI. depicti: hoc facto, exterior cannuſcula oleo inungatur, & inſtrumentum dextra chirurgi vulnere clementer immitatur, vſque dum cochlearium extremitas denticula globulum amplectatur: tunc pollice atque indice ſiniſtro, inſtrumentum chirurgus teneat, eoque quantum æger tolerare poterit, globulum premat, ne forcipi cedat: poſtea digitis manus dextræ, terebellum per

successu parati. Laudat quidem Excellentiss. Adrian. Spigel. in *hum. corp. fabric. lib. 5. cap. 9.* ob transitum venæ popliteæ inuersionem fonticuli in sura, seu masculi gasterocnemij principiorum coitu, quem Daniel Bucretius in *Iul. Casser. Placentin. Tabul. Anatomic.* (quos ego ære emi Spigeliano ab Hæredib. Casserij) l. *Tab. 2. lit. Græc. n.* notauit. At quoniam locus ille ob suam decliuitatem ad deligandum valde est incommodus, ego iuxta Andr. Vesal. in *corp. hum. fabric. l. 2. Tab. 10. de musculis* locum paulò superiorem elegi, cumque non sine ratione: habet enim huius loci fonticulus omnes boni fonticuli, quas supra recensui condiciones; 1. venam popliteam, quam antiqui & recentiores in Ischiade, alijsque morbis pluribus, quos Aurelius Seuerinus lib. *de aneologia c. 26.* collegit, magno certe cum successu aperiebant. 2. Intersticiū principiorum gasterocnemij: neque enim metuendus ille nervus satis insignis, qui sub genu transcurrit, ut lædatur; nam ubi fonticulus conficitur, nervus progrediendo, iam iam profundiora petijt, ut ferro candente offendi nequeat. 3. Deligaturam firmiter consistentem. 4. Patiens ipse ipsum regere, & gubernare potest. Notissimum est, qui semel Ischiadicis doloribus vexatur, non facile ab ijs liberatur, ita ut sibi polliceri possit, se in posterum ab eiusmodi cruciatibus fore immunem. Sanctè tamen testari possum, me metipsum post usum balnei Thalsengensis, vulgò Gesundbrun, in agro Vlmanso siti, beneficio huius fonticuli, per novennium, à paroxysmo præseruasse, & si vixero forsàn ulterius, venæ Ischiadicæ sectioni, omnibusque purgantibus, sudoriferis, & topicis medicamentis, quæ per annum integrum, ex clarissimorum Medicorum consilij, assumpsi & adhibui, valedicens. Quare si in futurum in tali cruciatu Ischiadis diuturno, tam interna, quàm externa remedia sine successu usurpara fuerint, meo consilio & bona spe salutis ad hanc chirurgiam, tanquam ad sacram anchoram confugiant, inuersionem scilicet fonticuli in loco signato: non dubito enim, quin patiens sanitatem, Chirurgus verò maximam laudem deportaturus sit.

L. est fascia pro fonticulis in femore & sura deligandis, omnium optima.

Quomodo fonticuli iam parati conseruari, rectè que gubernari debeant, ex scheda Aquapendentis, qui eius mentionem facit in *opere suo operationum chirurgicarum, et titulo de fonticulis*, discere potuissimus, nisi illa incuria typographi, cui Author schedam tradidit, ut rypis in lucem daret, amissa fuisset. Hac igitur destituti legant elegantissimum tractatum, quem scripsit Hieron. Capiuacius, de recta cauteriorum administratione, & Dominicus Galuanus Medicus Aethelinus (cui acceptum refert *sparradrapp. meum*).

Cerati

℞. Cerati de ceruss. seu Albi cocti Aug. ʒiij.

Pulu, ceruss. ʒiiij.

Thuris.

Tragacanthi ana ʒvj.

Ireos. Flor.

Bez. ana ʒv.

Storac. liquid.

Ol. spic. odorati ana ʒij.

Saponis veneti. ʒij.

Ceræ q. s. vel ʒij.

Veronenses Chirurgi, in viris vsurpando addunt parum mochi, ad gratiorem odorem.

Misce s. art. & cum tela noua F. sparadrappum, quo per annos viginti & duos, pius quam fonticulos mille summa cum vrentium admiratione, ab omni symptomatum incurſu præſeruari de fontanellis. lib. 2. cap. 13 14. 15. 16. & 17. quæ ad mentem Aquap. ſui Præceptoris, accuratiſſimè ſcripta eſſe certus ſcio, ſtylo tamen Italico, qui dignus eſſet, vt Latinitate donaretur.

Nonnulli miris laudibus deprædicant Ceratum, quo Dux Hetruriz fonticulos ſuos ab omni symptomatum incurſu præſeruat.

℞. Succi Hederæ ʒiij.

Nicotian. ʒj.

Terebinthia.

Reſin. pin.

Vng. roſ. Meſ.

Cer. citrin. ana ʒj.

Ol. N. Moſch. ʒij.

Pulu. cyper. odor. ʒj.

Ceruſſ. elect. ʒj.

M. F. Ceratum.

M. Forceps in vulneribus ſclopotorum, pro extrahendis globulis in profundo ſitis, affabre facta, quam ſupra Tab. XIV. Fig. IX. ad vultum delineauimus.

N. diſtix forcipis vſum, & applicandi modum oſtendit, qui talis eſt: Extrahatur terebellum, & exterior cannula demittatur verſus cochlearia, ita vt instrumentum claudatur, & foramen referat inſtrum. menti Tab. XIV. Figur. XI. depicti: hoc factò, exterior cannula oleo inungatur, & instrumentum dextra chirurgi vulnere clementer immitteretur, vsque dum cochlearium extremitas denticula globulum amplectatur: tunc pollice atque indice ſiniſtro, instrumentum chirurgus teneat, eoque quantum æger tolerare poterit, globulum premat, ne forcipi cedat: poſtea digitis manus dextræ, terebellum per

per foramen capuli rotundi immittat vsque ad globulum, illudque circumuoluet, & globulum paulatim infigat. Quam primum verò Chirurgus terebellum globulo sufficienter inhzere cognouerit, cannulam exteriorem sursum parumper & sensim trahat, eamque statim deorsum remittat, vt cochlearia diuisa globulum recipiant, & receptum firmissime tenendo, terebelli operam adiuuent: quibus ritè peractis, terebellum & ambæ cannulæ, adeoque totum instrumentum cum affixo & recepto globulo, extrahatur eo modo, quem figura designat.

Notandum, à pluribus alligari & commendari instrumenta, quorum imagines inueniuntur supra Tab. XV. depictæ, quibus si globulus cedit, facillè neruus, vena, & arteria læditur: qua propter, qui duo ista instrumenta Tab. XIV. Fig. IX. & XI. (quæ, durante bello Germanico, viginti annorum spatio, in pluribus feliciter vsurpauimilibus) in promptu non habent, nec habere volunt, optimè faciunt, qui & reliquis tenaculis rostrum gruinum rectum Tab. XI. Fig. VI. vel in angulum obtusum recuruatum Tab. IX. Fig. X. substituunt, vtpote quibus Chirurgi Parauini frequentissimè sine noxa, globulus è vultu trahunt. *Lege omnib. numer. absolutiss. tract. Franc. Plazxon. de vuln. sclopetor.*

O Indicet *sectionem varicum*, iuxta Aquap. sententiã, quæ tamen, vt nostris Germanis est horrenda, ita facillè ex ea oriri possunt praua symptomata. Dum Parauij literis operam dedi, vidi rusticum in Nosocomio D. Francisci sub Excellentiss. Spigelij manu, summa cum vtilitate, chirurgiam delineato modo institutam, sustinere.

Ego, ad imitationem, hunc operandi modum in partia semel tentauim: sed errore patientis, motu scilicet nimio, *qui nullus esse debuisset*, sequebatur inflammatio ægrum vehementer affligens, & prohibens, vt voto non potuerit respondere exitus: vnde patiens cum suis parentibus, ea vt me corripere & torqueret inflammatio, operarunt. Hoc famæ naufragium semel passus, varicibus in extremis affectis, deinceps solis topicis, sub tibialibus ex pelle canina confectis, tractauim.

P. ostendit *vulnus* acinae femori profundè infixum, *quatuor suris seu fibulis unitum*, & in decliuiori loco foramen habēs, cui turunda Q. immittitur, vt, pro materiæ exitu, opertum conseruetur.

R. ostendit modum *deradendi tibiam cariosam scalpris* Tab. VI. depictis.

Martinus Ochmidt, Ollingenſis, puer vñdecim annorum, conqueritur de vehementissimo dolore tibie dextræ, & duobus foraminibus matetiam puris fetidam fundentibus, quorum vnum erat circa malleolum internum, alterum circa externum. Hunc affe-

affectum Barbitonsor pagi illius ordinarius tractauit pro luxatione pedis. Anno 1640. D.e 16. Decembris æger receptus est in Xenodochium Vlmense, quem iussu Inelyti senatus visitauit, & statim animaduertit affectum uon esse luxationem, sed corruptionem & erosionem totius tibiæ, quam curare instituit. Primis atque diebus, bonam victus rationem præscripsi, & sequentem potiunculam.

℞. Syrup. ros. sol. ʒjss.

Elect. linitiu. ʒvj.

Decoct. fl. & fr. q. s.

M. F. Potio br.

à qua quinquies deiecit materiam valde serosam. *Die 22 Decembris*, à tibiæ capite vsque ad malleolum internum sine læsione venarum, articularum, neruorum & tendinum scalpello incidi crus, digitorum vngnibus periositum à tibia separauit, vulnusque stuppa cannabina, medicamento stegnotico (ex albumine oui, atque rosarum agitato, & puluere adstringente Galeni) & fascia duobus capitibus prædita obligauit. *Die 23.* subsistente sanguine, vulnus religatum inspexi & inueni, quod mea me opinio minimè scellerit; nam non solum pars anterior tibiæ in superficie, verum etiam posterior vsque ad medullam corrupta fuit: Mox etiam aliquot corruptæ tibiæ particulas volsella exemi, & vulnus denuo, ob vehementem patientis clamorem, medicamentis & fascia obligauit. *Die 24.* os corruptum scalpris derafi, & caput tibiæ inferius integrè corruptum, valdè fetens inueni. Qua propter os tibiæ decocto Diuino purgavi, ipsique puluerem aristolochiæ & Iridis Florentinæ inspersi, & vulnus cerato diapalmæ contextum fascia obligauit. *Die 25. & 26.* propter magnam corruptionem os derafi, & multas corruptæ tibiæ partes volsella extraxi. *Die 29.* ab inferiori & interno tibiæ capite magnam portionem corruptam forfice Tab. XX. Fi. I. abscidi. *Die 30.* fetor ossis ab vsu decocti diuini nonnihil remisit. *Die 31.* postquam dolor pedis & fetor remisit, ægrum glutinosa victus ratione nutriui ad generandum cal- lum, & vulneri ceratum diuinum applicui ad inducendam cicatricem. Ab hinc vsque in diem 4. Ian. Anni 1641. ex inferiore tibiæ capite, seu malleolo externo fluxit materia purulenta. *Die 6.* circa hoc foramen apparuit caro solida. *Die 7.* vulnus benè habuit, & natura os tibiæ, à capite inferiore vsque ad mediam partem, erosum, integrè separauit. Osse separato, vulnus mensis spatio consolidatum fuit.

De Gummate Gallico.

Gummata Gallica si medicamentis ex sarsapariglia, (quæ tophos & omnia luis veneræ accidentia multò facilius & breuiore tempore mitigat & abolet, quàm lignum sanctum) per os exhibitis non cedant, ceratum sequens optimo iuuamento ipsis applicatur.

℞. Mercur. viii. saliu. hominis ieiun. extinct. ʒʒ.

Pulu. Tab. Ind. ʒʒ.

Empl. diachyl. c. gum.

Cerat. oxelæi.

Citrin. ana ʒj.

Ol. lign. Guai. d. ʒj. M. F. cerat.

Quod sub remediij vsu perpetuò doleant, nec dissipentur, certissimum signum est, os gummati subiectum, pati cariem: vnde necessarium est, gumma per longitudinem tibie scalpello Tab. II Fig. II. incidatur, ac os detectum ac corruptum scalpris abradatur. Tales tophi, vti in Germania rarissimè occurrunt, ita eorum curatio chirurgica non, nisi efflagitantibus illam, in atrocissimis doloribus, admittitur. In Italia verò frequentissimè & felicissimè, manuali operatione, curantur. Quamuis igitur multos, nobiles & ignobiles, tophis gallicis cruciatos sub cura habuerim, manu tamen paucissimis adhibere suis concessum. Quoniam verò Patavij, vbi ferè innumeri de perpetuis tibiæ doloribus conqueruntur, hanc operationem sæpissimè vidi, non rarò etiam ipsam ibidem administraui, modum operandi Patavinis vsitatū, nostro opusculo paucissimis inserere volui, vt studio, si chirurgiæ (in quorum gratiam hæc scribo) ægrotantibus, qui ad incitas quasi redacti, & ab ipsis auxilium manuarium summè expectant, promptè succurrere scirent. Primo die gumma venerum, scalpello citato, secundum tibie longitudinem vsq; ad os incidunt, dein vulnus stuppâ cannabina, quæ oui albumine agitato fuerit imbuta, dilatant, tibiamque conuenienti fascia inuoluunt, ad arcendum humorum affluxum. Secundo, remouent stuppam, & vulnere artificiosè exaltato, partibus vicinis & sanis prius defensiuo, ne lædantur, optimè munitis, caustico quodam (mallem Holofericum quod Ambr. Paræus l. 25. cap. 32. describit) replent, postea emplastro super larum, & quod totam tibiam non circumit linæum, extenso cooperiunt, pedemque iterum, secundum artis præcepta, fascia expressiua deligant. Tertio, omnibus reiectis escharam separantia applicant, quâ ablata, cariem ad viuum vsque deraidunt, deinde pulueribus exsiccantibus os carne obducunt. Gumma prius inci-

incidunt, vt causticum citius in actum ducatur : non tamen scilicet per necessaria est incisio, nisi in ijs, qui chirurgus cariem ossis indicanti fidem haud exhibent, prius quam ipsi aut videant, aut illam tangerent.

S. monstrat deligaturam cataphractæ, quæ nomen habet à similitudine thoracis Romani, & prodest ijs, quibus deligare iuxta iugulum conuenit latum scapularum os, pectus, dorsum, aut latera. Fascia autem vnius capitis ita obuoluitur. Alæ primò circumdatur (Galen. l. de fascijs 79.) tum oblique per pectus ducitur, propè illam regionem, vbi iugulum cum osse pectoris committitur, inde per ceruices, ad latum scapularum os humeri contrarij, atque ad alam subiectam, ab eaque ad ceruices super partem prius iniectam, ita vt propè ceruices similitudo X literæ fiat, posthæc oblique datur ad latum scapularum os ex altera parte, atque ad alam, ab ala ad ceruices, vt in vertebra colli X literæ figuram accipiat, deinceps sub ala, oblique propè eam regionem vbi iugulum cum osse pectoris committitur, sic vt hîc quoque similitudo X literæ fiat, & iuxta ceruices, & super latum scapularum os, & sub ala, vt quater X literam representet, nimirum semel à priore parte, semel à posteriore, bis propè iugulum. Ad eandem autem rationem, quoties opus est, circuit, deinde in orbem attrahitur circa pectus & latera sic, vt tota iunctura thoracem referat.

Atque ita diuinâ permissione in his 43. Tabulis instrumentorum meorum chirurgicorum & declinationem, & legitimam admi-

nistrandi modum, ea, qua potui dexteritate, infalli-

bili experientia duce, omnibus informa-

tionem requirentibus, ob ocu-

los ponere, descri-

bere,

& publici iuris

facere vo-

lui.

376
OBSERVATIONVM
CHIRVRGICARVM
CENTVRIA,

*Confirmans & dilucidans ea, quæ in superiorum Tabularum
descriptione breuiter dicta sunt.*

OBSERVATIO PRIMA.

Vulnus capitis cum depressione & rima cranij magna.



ANNO 1637. die 9. Ianuarij, hora 7. pomeridiana, *Iohannes Hæpplius*, *Vlmensis*, Metator equitum, temperamenti calidi & humidi, agens trigessimum secundum ætatis annū, in duello à tubicine quodam sauciatus fuit, & septem vulnera accepit, quorum vnum in sinistri brachij radio externo prope carpum, reliqua verò sex in capite (primum scilicet post sinistram aurem, secundum circa futuram coronalem, tertium propè sagittalem, quartum & quintum ad frontē cruciforme: & hæc quidem omnia cuti superficialiter, mucrone saltem gladij, inflicta fuerunt. *Sex-tum verò vulnus, in musculo temporali dextri lateris circa sutura coronalis principium, satis periculosum fuit: inuersus namq; gladius, eiusque manubrij minor globulus vsque ad maiorem penetrans, cranium cum quadam fractura depressit.*) Hæc omnia *vrbanus* quidam Chirurgus tractauit, vti simplicia aliàs vulnera tractari solent.

Die 10. Dn. Consulis mandato, ægrotum demum accessi, & omnia reliqua iuspecta vulnera parui feci, excepto illo quod erat in musculo temporali: nec mea me fefellit opinio, quia specillo obtuso & lato (Tab. IIX. Fig. VI.) cranium depressum deprehendi, vnde statim vulnere, vt dilataretur, *spongia noua & contorta particulam* imposui, puluerem Iridis Florentinæ & *Aristolochiæ* ossi inspersi, labijs digestiuum adhibui, desuperque diapalma ac cataplasma idoneum applicaui.

Vulnera illa circa futuram coronalem & sagittalem nonnihil quoque inditis filamentis carptis & digestiuo oblitis dilataui, desuper apponens ceratum diapalmæ, & fasciam Tab. XXXI. Fig. IX. & X. reliqua verò veluti simplicia tractaui. In victus ratione, cibus fuit panatella, cremor hordei, & pruna damascena: Potus, aqua hordei Magistralis.

ꝯ. Hord.

℞. Hord. crud. ʒss.

Pall. min. ʒij.

Semin. anil. ʒjs.

coq. sensim, per duas horas, in trib. aq. fontan. mensuris. Decoct. antequam refrigescat, add. cinam. crassiusculū incis. ʒij. cum tinctura rosarum edulcorata, & vino granatorum attemperata. Vesperti vsus est sequente Clystere, ad laxandam aluum, per quinque dies valde adstrictam.

℞. Herb. Malu.

Violar.

Beton.

Parietar. ana. Mj.

Semin. Lini ʒvj.

Fœnicul.

Citr. ana. ʒjs.

Rad. alth ʒss.

coq. in s. q. aq. ad ʒx.

colatur. adde

Mell. ros. sol. ʒjs.

Elect. lenit. ʒj.

Ol. violar.

Chamomill. ana ʒjs.

M. f. a F. Clyster levis *admodum, ne commoveat agrum.*

Die 12. hora 10. matutina propter inquietam noctem, maioremq; tumorem atque dolorem circa vulnus, indicaui patienti & adstantibus opus esse, vt vulnus in musculo temporali per scalpellum dilateretur: & vulnere dicta ratione obligato, patienti ab oris amatorē præscripsi & exhibui sequentem syrupum colagogum:

℞. Syrup. ros. sol. ʒij.

Extract. Rhab. el. ʒjs.

Diacart. ʒjs.

Mag. Tartar ʒj.

Aq. ceras. nigr. q. s.

Misc pro syru. liquido.

ex quo quinq; deiecit mater. ambiliosam Die 13. aliquantum melius habuit, quàm die præterito, & vulnus modo consueto obligavi. Die 14. æger conquestus est de dolore vulneris temporalis. Ideo propter angustiam ego, & Chirurgus prima lëtionis hora vocatus, deliberauimus, vulnus scalpello, secundum fibrarum musculi temporalis ductum, in formam trianguli, aut literæ V. Tabul. XXXI. Figur. II. esse dilatandum, vt cranium depressum propè

M

foucam,

fouca, modiolis tripani debite perforaui & vecte conuenienti submisso eleuari possit. Tabul. XXXII. Die 15. & 16. propter vulneris dolorem, & instans nouulum, vulnus obligau, vti diebus antecedentibus. Die 17. æger ob dolorem, quem materia exitum non inueniens (*vulnus enim nimis fuit angustum*) induxit, vsus est euemate suo lenituo. Die 18. hora nona matutina, propter prægressam inquietam noctem, vulnus musculi temporalis in formam lit. V. scalpello recto Tabul. II. Figur. II. dilataui, pericranium ab osse vnguibus separaui, cauitatem stippa cannabina in globulos formata, oui albumine agitato humectata, & puluere stegnotico aspersa, repleui, partes vicinas oleo rosato inunxi, & splenium Tab. XXXI. Fig. I. ex vino rubro expressum, cum fascia modo citata, adhibui. Die 19. sanguine, post incisionem integumentorum cranij firmiter subsistente, monstraui adstantibus præfatum cranij depressionem, eiusque necessariam perforationem indicaui. Die 20. cranium, propè depressionem & principium suturæ coronalis modiolis perforaui, oras foraminis, instrumento lenticulari Tabul. II. Fig. IIX. leuigau, submisso vecte debilissimo Tab. XXXI. Fig. VII. cranij depressionem erexi, membranæ crassæ sericum circulare, rubrum, oleo rosarum tepido imbutum, filoque appesum, Tab. XXXI. Fig. IIX. admoui; craniopuluerem cephalicum, & filamenta sicca opopoli, labijs autem digestiuo oblita: desuper ceratum diapalmæ & cataplasma Hippocratis applicui. Die 21. vulnus & æger melius habuit totaque nocte se dormisse confessus est, idèd membranæ crassæ cerebri iterum adhibui sericum rubrum, oleo rosato imbutum, & filo annexum; cranium puluere ex Aristolochia rotunda & Iride Florentina conspersi; labijsque digestiuum imposui, quod

℞. Resin. tereb. in aq. bethon. lot. 3ijs.

Vitell. oui num. j. Misc.

addendo desuper ceratum diapalmæ & cataplasma. *A die 22. vsque ad 26.* patiens ratione vulneris optimè habuit. Die 27. quatuor cranij particulas adhuc depressas, vectibusque Tabul. II. depictis non cedentes, instrumento nouo Tabul. IV. Figur. II. excidi, & membranæ crassæ, ob conceptam putredinem, sericum linimento (quod constitit ex syrupo de rosis siccis, guttulis aliquot spiritus vini, & terebinthina) imbutum applicui, excrementia carnis flaccidam puluere aluminis vsti excedens. Die 28. ad expurgandos humores biliosos & serofos, & quibus abundabat corpus, præscripsi sequens infusum.

℞. Rhap. elect. 3j.

Argaric. rec. troch. 3js.

Fol.

Fol. fen. Alex. l. ſt. 3ß.

Gingib. optim.

Crem. Tartar. ana. 3ß.

Flor. Borrag. p. s.

℞. infuſ. per noct in ſ. q. aq. ceraſ. nigr. adde
exprefſioni Mannæ electæ 3jſs.

M. F. Potio.

quod magnam ſeroſorum humorum copiam eduxit. Die 19. & 30.
vulnus & æger bene habuit. Die 3. Februarij, ob inordinatam vi-
ctus rationem, paſſus eſt dolores colicos ita inſignes, vt ſpatio qua-
tuor dierum nunquam dormire potuerit; poſt uſum tamen Ene-
matis.

℞. Decoct. Carmin. 3x.

Mel. roſ. ſol.

Anroſ. ana. 3j.

Elect. lenitiu. 3x.

Ol. Amygd. dulc.

Rutac. ana. 3jſs.

M. F. Clyſt.

dolor remiſit, uſque ad veſperam, qua iterum uſus eſt Enemate præ-
ſcripto. Vulnus habuit, vt diebus antecedentibus, benè, & caro ru-
bra, tam matri duræ, quàm cranij medullæ, increuit. Die 9.
Febr. poſt aſſumptam potiunculam ex olei amygdal. dulc. 3ij. man-
næ 3ij. & aq. chamomillæ 3j. paratam, dolores colici, qui ipſum val-
dè cruciarunt, parum remiſerunt: noctem namque totam vigilijs
coſumpſit. Quare die 10. uſus eſt balneo ex aqua dulci, in qua coctus
fuit ſacculus ſequens:

℞. Herb. mal.

Chamomill.

Parietar.

Veronic.

Semin. lini.

Carui.

Furfur. ana. Mjſs.

Inſuantur ſacculo.

à quo æger bene habuit. Die 11. euomuit magnam bilis copiam: ve-
ſperi iterum iniectus eſt clyſter ordinarius à cuius redditione vomit-
us, in vulneribus capitis non opportunus, & dolor circa præcordia
ceſſauit: nihilominus tamen dormire non potuit, quare exhibui Lau-
dani Opiati cum magiſterijs gr. iiij. in conſerua roſarum, à quibus
per ſex horarum ſpatium quietiſſimè dormiuit. Vulnus carne re-
pletum optima, tractaui filamentis carptis, & cerato diuino, vt oſca-

M 2

tri-

tricem acquireret. Die 14. & 15. bene habuit, ob humoris tamen & pituitosi & biliosi in corpore abundantiam, sumpſit puluerem in vino absynthites purgantem.

℞. Pulu. Rhab. el. ʒij.

Mech. nigr. ʒjs.

Crem. Tattat. ʒss.

M. F. Pulu.

A quo septies deiecit mactetiam peccantem. Die 16. & 17. omnia recte habuerunt. Die 18. patiens in publicum prodijt sine data venia, ipsique aëris summa frigiditas dolores colicos induxit, qui usu balnei superioris citissime cessant. Die 19. vulnere cicatrice totaliter recto, patiens à frigoris noxa optime munitus, citra doloris colici reciduiam in publico ambulauit.

OBSERVATIO II.

Vulnus capitis cum inflammatione pericranij, & fissura calvaria dubia.

ANno 1638. die 15. Octobris, mandato Dn. Consulij, me in ædes Iohann. Iacobi Heckingij, ciuis & sutoris Vlmenſis, contuli, quem in lecto iacentem, quatuorque capitis vulneribus obnoxium reperi: quorum unum fuit in ſincipite ſiniſtri lateris, cum magna pericranij, quod ad putredinem tendit, inflammatione, & fractura cranij: reliqua autem tria fuerunt ſimplicia. Omnia quatuor balnearor quidam ſtatim curauit, vt ſimplicia alijs tractari ſolent. Die 16. (qui fuit ſecundus à læſione dies) ob maiorem putredinem atque inflammationem pericranij, fiſſuramque cranij de penetratione adhuc dubiam, vulnus, in ſincipite, ſcalpello in crucis formam dilataui. Tabul. XXX. Fig. IX. ſtegnoticis que medicamentis obligauit. Tertio die ſubſiſtente ſanguine, fiſſuram cranij uſque ad ſecundam laminam ſcalpris deaſi. Tab. XXX. Fig. X. Quarto rimam altius deaſi, nihilominus tamen veſtigium attramenti timæ pennæ inducti relinquebatur, quod nullo ſcalprorum genere potui delere. Interea, ob alui conſtipationem, & humorum ad peçtus deſluxum, præſcripſi portiopem blandam, ne humores agitentur,

℞. Syrup. roſ. ſol. ʒij.

Elect. lenit. ʒj.

Aq. ceraſ. nigr. q. ſ.

M. F. Pot. bren.

à qua ſepties deiecit materiam bilioſam. Quinto die inſpecto vulnere, & ſpiritu patientis cohibito, ſeroſa quædam materia, cum ali-

aliquot sanguinis guttulis, è fissura scalpri altissimè derafa proma-
navit. Rebus sic stantibus, in memoriam mihi reuocaui, aurea Senis
nostri effata, lib. de vulnerib. cap. text. 22. sic dicentis: *Vbi rima altius
descendit, neque radendo eximi potest, in hoc casu ad sectionem seu
perforationem cranij deveniendum est.* Ex text. 28. Quum quis os fis-
sum, aut ruptum, aut contusum, aut quocumque modo fractum. in-
telligens, per cruorem neque taserit, neque perforauerit, veluti os
non opus habeat, &c. Inter recentiores Anatomicos & Chirurgo
Hieronym. Fabric. ab Aquapend. eiusque Præceptor Fallopius sen-
tiunt, seu symptomata non esse expectanda, qua *Barbitonsores no-
stri cum miseri patientij periculo sapissimè imprudenter expectant.*
Fallopius contusiones in exteriori cranij lamina consistentes parui
faciunt, verò, quæ ad medullium cranij peruenit, periculo mini-
mè vacare scribit, eo quod ibi colligatur sanies, quæ descendens cras-
sam cerebri membranam erodere possit. Vnde die 6. ob prædictas
causas cranium propè fissuram trepano perforaui, Tab. XXXI. Fig.
V. & foramine per lenticulam læuigato Tab. XXXI. Fig. VII. linte-
olum ex serico rotundum, oleo rosato imbutum, filoque alligatum. Tab.
XXXI. Fig. VIII. membranæ duræ, puluerem & filamento arida
ossi, digestiuo oblinita labijs, & desuper diapalma, atque cataplasma
imposui. Vesper æget melius habuit, quam mane: remisit enim do-
lor utriusque oculi ad tunicam adnatam, de quo ante perforationem
cranij est valdè conquestus.

Die 7. benè habuit, de nihiloque alio conquestus nisi de ruficula,
& leuissima adhuc grauitate circa oculos. Religato vulnere, & inspe-
cta crassiore cerebri membrana, tantus, per foramen modiolis
excisum, fœtor exiuit, vt præ illo vulnus vix tractare potuerim.
Detecto per lanam vulnere, membrana crassa in superficie erat ali-
quantulum viscosa, & semiputrida, veluti pericranium, ob qua-
lem putredinem oleum rosarum non videbatur sufficiens, sed me-
dicamentum compositum, quod putredini membranæ valdè resis-
teret,

℞. Syrup. de col. sic. 3ij.

Terebinth. lor. in aq. Bethon. 3j.

Spir. vini gutt. vj.

M. in forma linimenti.

quo linteolum circulari imbui, & tepidè membranæ prædictæ im-
posui Tabul. XXXI. Figur. VIII. ossi filamenta & puluerem ex
Aristolochia rotunda & Iride Florentina adhibui, labijs vnguen-
tum conueniens admoi, desuper diapalmæ cerarum, & cataplas-
ma (quod conficitur ex farina fabarum, hordei, mica panis, vino

M 3

rubro

rubro & oleo rosato) fascia cancer dicta, Tab. XXXI. Fig. X. applicui. Die 8. bene habuit, & sc̄tor grauiſſimus membranæ aliquantulum remiſit.

Die 10. æger denuò ſumpſit potiſſulam medicam, à qua ſex ſedes habuit. Die 12. membrana cerebri craſſa, continuato linimenti uſu, ad rubedinem tetendit. Die 13. æger bene habuit, & dura mater rubicundior facta apparuit, quam die præterito, viſcoſam illam & ſemiputridam duræ matris particulam vndique ſeparatam, volfellæ dentibus Tab. IV. Fig. I. arripui, & per foramen extraxit. A die 14. uſque ad vigefimum benè habuit. Die Vigefimo Nouembris cranium deſquamauit officulum, quod, quia ab interna cranij lamina omninò ſeparatum fuit, volfella extraxi, vulnuſque beneficio cerati diuini ad cicatricem deduxi. Die 17. æger priſtinæ ſanitati reſtitutus, mihi gratias retulit pro habito labore maximas.

OBSERVATIO III.

Vulnus capitis in muſculo temporali cum rima cranij latiffima, & dura matris inflammatione.

Iohannes Vnuander, Ratiarius Kirchdorfenſis, Anno 1633. die 3. Ianuarij ad velperam acinace quodam vulneratus fuit in ſiniſtro tempore, cum ſiffura cranij adeo patente, vt digitum facillimè ipſi indicem imponere potuiſſem. Patiens ſecundo die læſionis, delatus eſt in ædes Chirurghi Iohannis Georgij Bauleri, vbi duræ matris inflammatæ ſtatim impoſui ſericum oblongum & oleo roſaceo imbutum, oſſi cum filamentis aridis, puluerem cephalicum atque vulneri digeſtiuum, ceratum diapalmæ (proſuiſſet etiam linimentum ſimplex) cataplaſma & fascia cancer dictam. Digeſtiui & cataplaſmatis appoſiti hæc eſt deſcriptio.

℞. Reſin. Tereb. lot. in aq. roſ. ʒij.

Ol. roſ. ʒj.

Vitell. oui num. j.

M. F. digeſtiuum.

℞. Farin. Hord.

Fabar. ana. ʒvj.

Mic. pan. domeſt ʒiiij.

Pulu. roſar. ʒß.

Ol. roſat. ʒij.

Oxym. ſimpl. & vini rubr. ana q. ſ.

M. ad ignem in formam cataplaſmatis.

Veſperi patiens ad reucllendos humores, coactus admittiſſe ſequens Enema:

℞. De.

℞. Decoct. herb. emoll. ℥x.

Flor. cass. rec. extract. ℥j.

Mel. ros. sol. ℥js.

Olei viol. & chamom. ana ℥js. Misc.

Tertiò secta fuit vena med. ana sinistri brachij & emissus sanguis ℥v. Vichus erat tenuis, panatella scilicet & cremor hordei Magistralis, cui ad levandam sitim interdum immiscuit cochlearia duo, vel tria sequentis syrupi.

℞. Syrup. Acetor. citr.

Gravator acid.

Tinctur. ros. ana ℥iij.

Misc. ad Ollam.

Religatum vulnus, ob remissionem membranæ inflammationem, iisdem medicamentis & fascia obligavimus.

Quarto, propter amarorem oris, de quo valde conquestus est eger, præscripsi potionem laxativam.

℞. Syrup. ros. sol. ℥ijs.

de mann. ℥j.

Elect. de succ. ros. ℥ij.

Aq. ceras. nigr. q. s.

M. F. Potio.

Ad cuius haustu patiens deiecit materiam biliosissimam. Quinto patiens melius habuit & inflammatio meningis crassæ omnino evanuit. Sexto membranæ lintheum Syrupo de ros. siccis illitum adhibui, & digestivo, quod plagæ labijs applicandum, mel rosaceum ad lidi, iisque vulnus & membranam quotidie tractavi donec ambo satis munda apparetent. Decimo vulnus & membrana omnino pulchra fuerunt quare, omissio lintheolo, plagam vnguento de Bethonica incarnavi, incarnatamque cerato diuino cicatrizaui. Die trigesimo sexto eger conqueri cepit de dolore pungitivo circa locum affectum, ob squamulam ossis, quam natura separavit, & ego vossella arrepta extraxi. His paucissimis remedijs patiens lethaliter vulneratus brevi temporis spatio, absque manuum opera, felicissimè restitutus fuit.

OBSERVATIO IV.

Vulnus capitis os frontis dividens periculosum, & adhibito trepano curatum. Sequentem casum ex Dn. Gregor. Horstij lib.

posteriorum observ. pag. 357. transcribere

non dubitavi

A NNO 1616. Die 11. Octobris Georgius Geik in vico Edelhausen annor. quadraginta, plus minus, nocturna tempore gla-

M 4

die

dio grauiter in capitis anteriori parte vulneratur, qui mox incidit in Empireum, qui pertusionem (seu rimam) Carnij non obseruans, adhibitis (pro more suo) sarcoticis vulnus externum consolidare nititur. Cum autem indies grauiora fierent symptomata, suasu suorum Vlmam sese confert, & 20. Octob. me, cum Clariss. Collega Domino Iohan. Sculteto, in Chirurgicis operationibus exercitato, consilij causa vocat. Consideratis ergo Circumstantijs, anguem in herba latitare suspicabamur, quam ob causam vi quodammodo dilatato vulnere cranium ipsum per vtramque laminam diuisum deprehendimus, sub eodem materia purulenta collecta, cuius egressus, *expiratione per naves ore clausa*, promouebatur. Prognostico facto, trepanum adhibendum esse diximus, quam ob causam, viribus constantibus adhuc, ægrum benè separare iussimus. 21. Octobris, cum Elect. Lenit. præcedente dia vacuatus esset, recta sectione cutim, ad rectitudinem fibrarum musculi frontis, vel supercilij potius diuidendam esse statuimus, ne per crucem, ut alias fieri solet, diuisione facta, læsis transuersum prædicti musculi fibris palpebra superior postea deprimeretur, quod Anno 1614. 7. Martij Eiseimbachij per lapsū ex alto, musculo hoc contuso, scæminæ cuidam accidisse memini. Facta itaque sufficienti incisione, cutis à cranio digitis separabatur, & lin-teolis rasis, puluere stegnotico conspersis, ac albumine oui parum per exterius humectatis, vulnus ligabatur. 22. sanguine firmiter subsistente, per collegam meum trepanum fuit adhibitum (Tab. XXXI. Fig. V.) cuius operatione peracto, dura mater etiam aliquantulum læsa & inflammata conspiciebatur, sanie tenui per foramen eius paruum ebulliente. Mox igitur inflammationem alterare, saniemque quotidie detergere conati sumus, non neglectis internis lenitiuis euacuationibus reiteratis, rum etiam ordinata victus ratione tenui, qua ratione post elapsas septimanas duas vel tres perfectè restitutus fuit æger, hætenus in annū tertium pristina sanitate gaudens. *Manifestum igitur non tantum in principio, sed etiā in progressu morbi trepanum concedi posse, modò laborantis vires adhuc consent.*

OBSERVATIO V.

Vulnus capitis cum depressione cranij maxima.

ANno 1634. Mense Aprili, Martinus Runk, Durcha Misnen-
sis à Præfecto militum seu Capitaneo in dextra occipitis par-
te, propè futuræ coronalis & sagittalis concursum, vulnus
acce-

accepit crassa compede, quæ non tantum pericranium, verum etiam
nagnum cranij spatium deprimeret. Hæc autem depressio, ob
tanguinis concreti copiam, à Barbitonfore, in principio morbi non
fuit observata, sed vulnus tanti momenti, veluti simplex, *vsque*
ad 14. læsionis diem ab ipso tractatum, cui sæua symptomata super-
uenerunt. His rebus ita stantibus, ego cum Clariss. meo Collega,
Dn. D. Gregorio Horstio ad vulneratum vocatus sum, & inspec-
to vulnere, inuenimus, circa futuram sagittalem & lambdoidem,
maximam depressionem cranij, quam communicatis consilijs (ob
febrem continuam, dolorem capitis atque vertiginem) cute prius
incisa & cranio aperto curandum esse statuimus. Vesper, ob con-
stipationem alui, æger vsus & clystere refrigerante & humectante:
Die 16. ablata fascia, & inspecto vulnere, depressionem digito
nonnihil terigi, & æger statim de punctorio dolore conquestus est.
Itaque foueam cutis atramento in crucem signavi, signa tam scal-
pello recto Tabul. II. Figur. II. incidi, pericranium vnguibus ab os-
se separavi, & vulnus dilatatum stappa cannabina & medicamen-
to (ex puluere stegnotico Galeni & albumine oui agitato) imbuta
obligavi. Die 17. Sanguinis fluxu restricto, stappaque remota in-
uenimus tam magnam cranij depressionem, *ut coacti essemus cra-*
nium septies modiolis in depressionis circumferentia perforare, & fo-
raminum interstitia forfice incisoria Tab. XX. Fig. I. excidere, quod
adhuc in cranio Tabul. XXXII. videre licet. Hisce peractis, oras cra-
nij instrumento lenticulari vndique læuigavi Tabul. XXXI. Figur.
VII. duræ matri pannum ex serico rotundum, oleoque rosarum
matrefactum; ossi puluerem ex radicibus Astrolochiæ rotundæ &
irid. Florentinæ & filamenta arida, labij filamenta digestiuo (ex
resina terebinthina in aqua plantaginis lota, vitello oui, & oleo rosa-
to) oblita, ac super hæc diapalma imposui, omniaque adhibito prius
cataplasmate (quod constabat mica panis domestici, farina hordei &
fabarum floribus ros. & benotica. oxymel. Simplic. & oleo rosato) fa-
scia Galeni cancer dicta obligavi. Die 18. missus est sanguis è ve-
na mediana sinistri brachij ad 3iij. Victus ratio fuit panatella, &
aqua hordei succo granatorum permixta. Die 30. propter amaro-
rem oris, (de quo ferè omnes in capite vulnerati conqueruntur)
vsus est hoc Syrupus.

℞. Syrup. ros. sol. 3ij.

Elect. Lenit. 3j.

Semin. citr. 3js.

Decoct. fl. & fr. q.s.

M.F. Syrup. liquid.

3 qna

à quo quinquies deiecit materiam biliosam & spumofam. Die 1. Maij æger placide dormiuit, & dura mater, circa futuram sagittalem, viscosa & semiputrida fuit, ideo ipsi linimentum, *ex syrupo de rosas siccis, spiritu vini & cerebinthina*, panno serico inductum imposui, atque vulnus reliquis remedijs tractaui. Die 2. magnam obfium æger sequentem sumpsit syrupum.

℞. Syrup. acetos. citr. ʒij.

Acetosell.

Oxy sacch. simpl. ana ʒss.

Aq. cerafor. nigr.

Fragar.

Borrag ana ʒij.

M. F. Haustus.

Die 3. cohibito, naribus oclusis, spiritu, copiosa & flava materia ex vulnere dimanabat: postea deterfo vulnere, frustulum ossis nigrum propè futuram lambdoidem in conspectum venit. Die 4. sitis remisit, & frustulum ossis modo dicti vossella extraxi. Die 5. propter fetorem ossis vulnus laui decocto diuino. Die 6. fetor ossis remisit, & ad maiorem vulneris exsiccationem digestium adhucui.

℞. Tereb. lot. in aq. scord. ʒij.

Pulu. myrrh.

Aristoloch. rot.

Irid. Florentin. ana ʒj.

Mell. ros. colat. q. s.

M. in form. Linim.

Die 7. æger rectè habuit, at cum alius non esset satis lubrica, vsus est Enemate.

℞. Decoct. commun. ʒviij.

Elect. Diacatholic. ʒj.

Olei violat.

Chamom. ana ʒi.s.

M. f. pro Clystere.

à quo ter deiecit. Die 8. æger placide dormiuit. Die 9. dura mater fuit rubicundissima, ex qua dum illam gossipio abiterfi, aliquot sanguinis guttulæ effluerunt. A die 10. vsque ad 14. benè habuit. Die 15. ob constipationem alui deglutiuit bolos ex elect. lenitiui ʒij. & sacch. s. q. formatos à quibus quatuor deiecit. Die 20. membranæ crassæ, & interstitio laminarum cranij caro inereuit rubra. Die 24. benè habuit, at pro maiore capitis roboratione, *enema plasmæ superiori vinum rubrum & parum sursurum misici addidi*. Die 30. Maij facta est magna desquamatio cranij, & vulnere carne solida repleto cetrarum diuinum apposui, ad cicatricem comparandum. Die 10.

Iunij

Iunij vulnus cicatrice obtectum, & 11. patiens in publicum prodijt
Die 10 æger pristinae sanitati restitutus, munus suum militare iterum cum laude obiuit.

OBSERVATIO VI.

Vulnus capitis aliud cum introessione calvaria permagna.

A NNO 1636. die 18. Nouemb. hora 9. ante meridiana, *Rufficus*
quidam Idelhusianus, temperamenti calidi & humidī, circa
32. ætatis annum, à quodam fabro ferrario, nescio osi quas lites de
finibus agrorum, coram iudico & arbitro, marra inuersa, in dextram
suprapitis partem ad eò percussus fuit, vt non tantum retro in terram
caderet, & sanguinem è naribus stillaret, verum etiam ibi sine sensu
& motu iaceret instar mortui. Hora 10. læsi coniux vocauit quen-
dam Vlmā chirurgum, qui vulnus puluere adstringente Galeni & al-
bumine oui agitato obligauit: *cum tamen statim, considerando cau-
sam, qua fortis erat, illud in crucem dilatare debuisset.* Die 19.
hora 4. post meridiem, lectica delatus est Vlmam, & circa septimanā
ipsum inueni cum insigni capitis dolore, febre, animi deliquio, &
tumore dexteri oculi. Vnde præscripsi aquam corroborantem, quæ
constabat sequentibus.

℞. Aq. ceras. nigr.

Acetos.

Borrag. ana ʒjss.

Spir. cephalic. Anhalt. ʒij.

Marg præp.

Corall rubr. præp. ana ʒj.

Lapid. Chrysol. præp. ʒss.

Man. Chryst. perlæ ʒss. M.

de qua sæpius cochlear vnum atque alterum assumpsit. Ob sitim &
nauseam vesperti vsus est dimidia parte huius iulepi.

℞. Syrup. è succo viol. ʒjss.

Tinct. ros. cum iulepo. ʒiv.

Aq. Endiu. ʒj.

Vini gran. ʒiv. M. pro 2. dosib.

Die 20. duabus horis ante meridiem, conuestus est de maximo
capitis dolore: soluta fascia, detecto & inspecto vulnere, specilli glo-
bula parte diligentissimè explorari vulneris latitudinem & profun-
ditatem, & cranium valdè depressum esse deprehendi.

Quamobrem, eadem die, vulnus spatula Celli, Tabul. II. Figur. I.
in formam Litteræ X. vel crucis dilatari, & membrana vngu-
bus

bus à cranio diducta, ad sistendum sanguinis fluxum, & vulnus apertum conseruandum, apposui stuppam canabinam, subacto oui candido madefactam, & puluere stegnotico aspersam: ad prohibendam inflammationem, totum caput & collum oleo rosato inunxi, spleniumque quadruplicatum, in vino rubro expressum, partibusque plagæ vicinis applicitum, fascia Tab. XXXI. Fig. X. alligavi. Vespere bibit syrupum refrigerantem, vñsusque pro potu aqua hordei, pro coena verò panatella.

Die 21. hora 10. ante meridiem, sanguine suppresso, solui fasciam, & remotis remouendis, inspexi vulnus, ac inueni non tantum depressionem in osse sinuipitis, latitudine vnus pollicis transuersi à sutura coronali, duorum verò transuersorum à sagitali distantem, verum etiam duarum rimarum dispersionem vi contusionis subortam, quarum anterior à modò dicta depressione per suturam coronalem ad dextrum oculum: posterior verò ad sinistram aurem protendit. Rebus ita confusis, ossi puluerem Aristoloch. rotund. & Iridis Florentinæ, labijs vnguentum digereus, & desuper ceratum diapalmæ applicui, ac propter tumorem insignem dextri oculi adhibui sequens cataplasma, quod constabat ex

Farin. hordei.

Fabar. ana ʒvj.

Mica panis domestic. ʒijs.

Pulu. ros.

Bethonic. ana ʒvj.

Ol. rosat. ʒiiij.

Oxymel. simpl. q.s.M.

Ante meridiem, horis duabus ante prandium, assumpsit bolos lenitiuos ex elect. lenitiui ʒj. sacch. albiss. l. q. formatos. *Die 23.* ob maiorem capitis inflammationem, dolorem, vertiginem atque tumorem dextri oculi, coactus fui cranium depressum, propè suturam coronalem & sagittalem, modiolis trepani perforare. Perforato cranio & foraminis asperitatibus per instrumentum lenticulare derasis, velle submisso os depressum reduxi Tab. XXXII. Fig. II. duræ matri particulam serico oleo rosato imbutam, filoq; firmiter annexam, imposui, & reliquum vulnus puluere noto, filamentis aridis, & digestiuo oblitis, cerato diapalmæ, & cataplasmate obligavi, non neglectis inunctionibus partium vulnere vicinarum, & colli. *Vespere ager melius habuit, quàm tempore matutino ante cranij perforationem,* vñsusque est suo syrupo refrigerante. *Die 24.* hora decima ante meridiem, patienti, qui multo melius habuit, quàm diebus præteritis, reuulsionis & refrigerationis gratia, incisa fuit vena mediana dextri brachij & emissus sanguis ad ʒiv. *Die 25.* lenito dolore, exhaust æger potionē,

ob

ob constipationem alui in vulneribus capitis valde noxiam.

℞. Elect. lenit. ʒij.

Syrup. ros. sol. ʒij.

Aqu. ceras. nigr. q. s.

M. F. Potio, omnis ferè caloris expers.

Vulnus mihi & oculus dexter optimè placuit: æger ad vesperam resumpsit Syrupum suum refrigerantem. Die 26. dixit patiens se per totam noctem quietissimè dormiuisse, nullumque aut capitis, aut oculi dextri dolorem percepisse. Die 27. iterum placidè dormiuit, & nullam circa vulnus molestiam sensit. Ex dura cerebri membrana, gutturæ aliquot serosæ materiæ effluxerunt. Ad maiorem igitur exsiccationem, *linimentum ex Syrupo rosarum, terabinthina & spiritu vini paratum*, & panno serico inductum, membranæ crassæ appositæ. Cataplasmati, loco oxymellitidis simplicis, vinum rubrum austrium immiscui, ad maius capitis robur. Die 28. æger tam benè habuit, quam die præterito; sed ego membranam cerebri ex contusione superficialiter denigratam conspexi. Die 29. ob alui constipationem, patiens assumpsit potiunculam suam laxatiuam, à qua tres habuit sedes. Membrana verò, à linimento imposto, ad suppurationem retendit, ut post deterisionem gossipio tentatam maculæ illius nigræ, & aliqualem sanguinis effusionem, rubra appareret. Die 30. iterum benè habuit, sed circa frontem & musculum temporalem conquestus est de dolore quodam pulsatorio. Die 2. Decembris dolor iste sponte cessauit, ægerque dixit, se ratione virium absque baculo ambulare posse. Materia purulenta, quæ à dura matre per foramen modiolis factum eo die affluxit, fuit alba & benè cæcta. Loco linimenti, & digestiui membranæ carnosæ & labijs plagæ adhib. Unguentum de Bethonica, cerato citrino permixtum.

℞. Succi Betonic. ʒij.

Pimpinell.

Marris sylu.

Consol. mai. ana ʒss.

Vini malu. v.

Bull. ad cons. vini, dein adde resin.

Tereb. ʒij.

Seui castrar.

Ol. ros. ana ʒj.

Pulu. Mastich.

Myrrh.

Mum. ana ʒjs.

Virid. ær. ʒij.

Cer. q. s. M. pro Vng. de Bethon,

Die

Die 3. & 4. æger benè habuit, & ego separatam duræ matris particulam Volsellæ dentibus extraxi, eademque remedia, quæ diebus præteritis, imposui. Die 5. dura mater vndique carne rubra fuit oblecta, quod optimum signum est Celso, qui lib. 8. scribit: *Vbi benè res cedit, incipit ab ipsa membrana caro increfcere*. Die 7. ad maiorem exsiccationem, duræ matri apposui ceratum diuinum. Die 8. 9. & 10. æger benè habuit: Die 11. nihil dormiuit. Die 12. conquestus est de dolore capitis. Die 13. parum dormiuit. Die 16. specillo nonnihil incuruato, inter primam & secundam cranij tabulam perueni, & ossis particulam lenticulà vndique separatam Volsellæ beneficio exemi. Die 16. aliud ossiculum circa frontem desquamatum *ακαραβδ-λιν* extraxi: Die 19. 20. 21. & vigesimo secundo benè habuit. At 23. conquestus est de dolore frontis grauatiuo, propter quem assumpsit, supra descriptam potiunculam, à qua quinquies desiecit: sed quia post prandium, aquam frigidam copiosè bibit, de ventriculi dolore conqueri cæpit. Die natiuitatis Christi, carnibus multis vescébatur, ynde nouus ad plagam humorum affluxus, calor totius febrilis, & caro in vulnere nigra apparuit. Quapropter ipsi esus carniū interdictus, & sola panatella pro cibo fuit concessa, sic purgato leniter corpore, & obseruata ratione victus tenuis, excrecentiam carnis nigram alumine vsto consumpsi, & spatio quinque dierum æger melius habuit. Mense Ianuarij vulnus cerato Diuino.

℞. Gum. Ammon.

Galb.

Opopon.

Bdell.

Pulu. Myrrh.

Thuris.

Mastich.

Aristol. long.

Virid. æris

Lapid. calam. præp.

Hæmatit. ana ʒj.

Lithargyr. aur.

Olei commun. ana ʒj.

Ceræ citrin.

Resin. Tereb. ana ʒvj.

M. F. Ceratum, quod vlcera citissimè glutinat, neque in ijs carnem inutilem gigni permittit.

Ad cicatricem duxi, & ægrum dictis remedijs pristinæ sanitati restitui.

OBSERVATIO VII.

Contusio capitis ob intermissum trepani usum, centesimo die mortem inferens.

Rusticus, Vir robustissimus, nunquam per dies vitæ suæ infirmus quadragenarius, ab alijs pugnīs exceptus, validè in nudo capite percussus fuit, crebrosque ac vehementes ictus sustinuit & factum hoc 11. Nouembr. Anni 1630. Ager non magni existimauit hoc, & per aliquot dies subsequentes consueta munia obijce quamuis dolores non paruos ex percussione senserit. *Decimo octauo*, eiusdem mensis die magis infirmari, doloresque maiores perferre cepit. Maxillæ inferioris motus difficilis accessit, ita vt vix os aperire, cibosque ingerere, tandem etiam os claudere, sine manus subsidio maxillâ comprimentis, non amplius potuerit. Barbitonsor Vilanus iūc vocatus, capitis plagas, nescio quibus remedijs curare cepit. Cum autem omnia ingrauescerent, Chirurgus quidam exercitatus post quadriduum, nempe *vigesimo secundo* eiusdem mensis, ex vicino oppido accersitus fuit, qui caput subrumidum ab ecchymosi repperit. Is varijs externis adhibitis discutientibus tumores repressit quidem, at dolores non submouit, qui totum caput & nucham etiā indies magis occupare ceperunt, & ita in valuerunt, vt nec caput mouere, nec oculos attollere posset; acceperunt vertigines, per vigiliæ, leuia deliria, membrorum debilitates, ita vt pedibus vix stare, minus ambulare, interdum etiam brachia sustollere non potuerit. Medicus tandē vocatus *septimo die Mensis Decembris* adfuit, qui ex lecto adductum & scamino affidentem, ipsum conspexit, toruū vultum exhibentem, ita vt non parū terreretur, & vel conuulsiones, vel alia grauiora ac periculosiora accidentia iamiam imminencia metueret. In habita signorum ac symptomatum exploratione, caput etiam, vt qua parte magis doleret, scire posset, manibus contrectando perquisiuit, & in posteriore ac suprema parte mollitiem quandā digito cedentem, ad cuius compressionem cauitas conspicua in cute manserat, deprehendit, adeoque sanguinis sub cute musculosa iam concreti & putrescentis effusionem, congestionem animaduertit, quem per cutis incisionem, ne cranij os ab eo corrumpatur, vel pericranium inflammetur, vel supra enumerata accidentia intendantur, & tandem necem adferant, euacuandum iudicauit. Factum hoc à Chirurgo præsentē, & crucis in modum cutis nouacula aperta est, & incisio facta vsque ad pericranium: & effluxit sanguinis nigricans, concretus & serosus. Ab apertione hac symptomata illa vt cunq; mitigata sunt, & capitis dolores magnā ex parte, remiserunt. De hac re alij, præsertim ij quidamnum ægro insulerunt, malè iudicare ceperunt

tunt, ac si ista incisio non necessario, sed frustranea, maiorque noxa capiti illita fuisset. Inde morus præsens Medicus, qui ex symptomatum prauitate, nõ paruum periculum imminere censuit, & insuper in istam suspicionem venit, ac si cranium rimulam ex ictibus contraxit (nondum enim tunc ipsi certum esse potuerat, an arma vel fustes præter pugnos adhibita fuissent,) vel sanguis sub cure collectus putrescens cranium inficere coeperit, vel oborta inflammatione in externa parte, suturæ sagittali vicina, portio saniosi humoris per suturam intus decesserit, vel venulæ quædam, quæ in cerebrum vel eius mēbranas contingunt, disruptæ sint, à quibus sanguis effluens inque saniem cōuersus symptomata illa excitauerit; proptereaque, ut etiam pericranium à cranio reuelleretur, imò etiam crani perforatio, si symptomata non recessissent, institueretur suauis, alium etiam Medicum in Chirurgicis exercitatissimum adesse voluit, qui vocatus, cum omnes circumstantias probè examinasset, cum illo planè consensit, & vt pro abundantiori cautela pericranium solueretur consuluit, alioquin certam securitatem nunquam promitti posse, quod rationibus & exemplis confirmauit; sed in hanc rem Medicus tertius & chirurgus, qui ab aduersa parte huc immissi erant, consentire noluerunt: eò quòd grauiora symptomata nulla amplius adessent, nec signa læsi cranijs vlla apparerent; hinc ab omni periculo immunem esse pronunciarunt, qua propter vt vulnus, quod per aliquot dies apertum adhuc seruari possit, interum consolidetur, suaserunt; reliqui ne viderentur non necessarias afflictiones superaddere velle, consenserunt; Factum ergò vt vulnus consolidatum. Ab hoc autem tempore denuò affligi coepit ingentibus doloribus totius capitis, maxime eius partis intimæ, qua incisio facta fuit, de quibus etiamnum conqueritur, diesque noctesque accedunt iterum uertigines & magna debilitates, noctes totas insomnes ducit, cibos fastidit, horrores & frigus partium inferiorum, superiorum autem æstus continuos, sustinet. Die 5. Februarij defluxionem grauem sensit per sinistram capitis partem, ac si aqua calida perfunderetur, humoribus per fauces delabentibus & in pectus irruentibus, ubi insignem grauitatem, qua se suffocatum iri putabat, induxerunt: sed post paucas horas iterum discussi sunt. Medicus præsens denuò vulnus aperiendum & dilatandum existimauit. Alter autem in id consentire noluit, sed omni periculo uacare pronunciauit.

Infirmior autem quotidie fit æger, corporeque suo indies consumitur & moritur.

Duplex hinc oritur quæstio. 1. An apertio uel incisio cutis in capite à præsentē chirurgo instituta necessaria fuerit. 2. An percussiones in capite factæ, periculum & ipsam necem afferre possunt.

potuerint? Ad primam responderetur, quod non solum à chirurgo tentata cutis in capite incisio, verum etiam ipsius pericranij dissectio, & cranij per modiolos perforatio, summè fuisset necessaria, ob symptomatum urgentium præsentiam, quæ aliquam sub cranio noxam indicarunt. Ad secundam, quod contusiones cum vel sine rima cranij, nunquam spernendæ, post centesimum læsionis diem ipsam mortem inferre possint, præsertim verò tunc, quando cranium fractum, ad expurgandam materiam illam, quæ per rimam ad membranam crassiã vel cerebrum paulatim, descendit, modiolis non aperitur. *Has quæstiones mihi proposuit Clariss. D.D. Jac. Eggoldus, Physicus Memmingens.* & responzionem meam confirmabunt quatuor sequentes observationes: quarum duas priores vt communicatas hic inferere visum fuit.

OBSERVATIO VIII.

Contusio cerebri nona septimana ex improviso necem inducens.

ANNO 1636. Mense Decembri, ex Clarissimi Domini mēz Collegæ, Iohannis Georgij Gockelij. Phil. & Med. Doct. & Reipubl. Vlmens. Ordinarij, fidelissima relatione accepi, funestissimi nostri Teutonici belli occasione (in quo vtrunque fortissimè sanguinis flumina effusa piorum promeritis lacrymis ansam dederunt.) Cæsareanum quendam militem, Austriacum, in excusionibus illis, & *imaginaris quadam pugna*, in qua ad gladios vsque ventura erat, à Suecico quodam equite, cestrà, duobus repitis ictibus, in capitis occipite ira multatum fuisse, vt, expugnatus, humique prostratus, capiti in aduersariorum suorum manus peruenerit, & receptui dato signo, cum alijs commilitonibus, semimortuus in Xenodochium Vlmense delatus fuerit.

Hos ergo omnes, Medicis, Amplissimi Senatus nostri in egros benignitate constitutis (ex quorum numero D.D. Gockelius alter aderat) & chirurgo suo traditos, alimentis necessarijs enutritos, internis & externis medicamentis, ex arte ita tractatos fuisse, vt plures illorum ad suos incolumes saluque peruenerint, huc nostrum attamen (sed sine cruento vulnere, absque vlla cranij aut fissura, aut euidenti quadam depressione) percutsum, elapsis circiter nouem septimanis, cum & expedite loqui & ingredi valeret, nullosque amplius ex contusione dolores sentiret, & recreandi animi gratia sædiusculè obambulando genio suo indulgeret; de abitu, vel tandem etiam in patriam cogitare cœpisse; verum dum proxima quauis data occasio-

N
ne,

ne, cetero sibi nauigio discessum decreuerit, noctu saluus, vt quidem omnibus videbatur, somnum atque quietem capiens, subito, in ipso sapore, extinctum & mortuum esse.

Ne ergo omnino insperati huius ex vita discessus causa lateret, præfatum Dominum meum Collegam à nobiliss. Zenodochij Vlmani præfectis humiliter petiisse, vt aperta per chirurgiam caluaria, ponderatis matribus, & inspecta ipsa cerebri substantia, liberam ipsi indulgentiam & potestatem cōcederent, in fundamenta vltius inquirere, & totam quasi rem, ab ouo, vt dicunt repetere: Du. Præfectis lubentissimè annuentibus, se cruciformi cutis incisione, pericranij ab osse separatione, & ipsius craniij, iuxta vstatum modum, serra in orbem facta dissectione, partiumque omnium diligentissima inspectione & consideratione, ne minimam in cranio rimulam, nec vllum etiam leuissimæ depressionis vestigium animaduertere potuisset, verum in percussæ parti subiecta cerebri substantiæ, non secus ac in putridis pomis vsu venire solet, ad digiti crassitiem, enormem & ad ventriculos ferè anteriores penetrantem putredinem, & aliqualem piæ matris corruptionem inuenisse; reliqua autem cuncta omnino illæ sa apparuisse.

Communicatis nostris super hunc casum opinionibus, de externa & violenta causa, percussione dubitare nullo modo potuimus, cum illa & morbum & necem militi huic intulerit: sed hoc nobis scrupulum iniecit, & admirationi iustæ fuit; I. Quod lædens illa vis non proximas potius, sed interiores magis partes percutiendo læserit: quamuis experientia plura talia obseruarit exempla. II. Quomodo & in cerebro temperati illi & pellucidi animales spiritus tam grauitur turbari possint, vt & ipsis in momento quasi, cerebri fiderationem admittant, partibus exterioribus saluis? Et III. Quare putredo illa insignis, in ipso cerebro suborta, & piæ matri communicata, nullos vnquam partium internarum dolores, nullamque vel externorum vel internorum sensuum deprauationem induxerit, sed ex improviso omnem sentiendi facultatem cum ipsa vita abstulerit? Hæc igitur obseruatione chirurgi notens, vt nullas capitis percussiones, etiam si partes cerebrum continentes illas inuenerint, leues indicent, in illa nunquam indubitatam salutem promittant, nullosque in diata præsertim, errores concedant, sed potius arte cauta, & prudente dissidentia agrotantes ita tractet, quo sacra nostra artis vera lumina eriscent.

OBSERVATIO IX.

Intrussio cranij ; & punctura matris, qua ob denegatum instrumentorum apparatus, inseremis agrum.

Prefatus modo Dn.D. Gockelius mihi narravit, dū Anno 1623. die 23. Februarij, ad Physicatum Biberacensem vocaretur, & ob bellicos ibidem tumultus, spem inter & metum versaretur, quod paganus quidam, ab innadente hoste, ob spem prædæ, in priuaris suis ædibus direptus, & ensis manubrio, sed sine cruento vulnere, ad verticem ita percussus fuerit, ut calvaria os, ad instar foueæ, insigniter depressum, duram cum pia matre vellicarit, atque febrem, cum mentis abalienatione, induxerit. Medicus iste salariatus ad agrum vocatus, dato pharmino laxativo, adhibita venæ sectione in brachio, & præscriptis alterantibus, febrem cum symptomatibus emollire tentavit, ac insuper omnem lapidem movit, quo communibus & præsentibus instrumentis, depressionem elevarer attolleret, & ad statum naturalem reduceret; ac omnia frustra. Nam ob trepani defectum, quod aliunde propter viarum inseguritatem tam cito afferri non potuit, innocentissimus ille vir, altero mane vitam cum morte mutavit, adeo ut defectus necessariorum, supra depictorum & descriptorum instrumentorum, & debitæ manualis operationis denegata administratio, salutis spem huic ademerit. Hic notandum, si prima læsionis die cutis in crucem fuisset incisa, & consistente sanguine eodem die cranium modiolis perforatum, ut ossiculorum membranas cerebri pungens eximi potuisset, æger forsitan mortuus non esset.

OBSERVATIO X.

Vertigo cuiusdam ouicula, ex abscessu cerebri promeniens.

ANno 1634. die 24. Decēb. cū essem in tōstrina Nicolai Reutte, is mentionem fecit suarum ouicularum, quarū una laboravit vertigine, Germanis Mirbling appellata. Hoc malum dixit pecoris magister, pulchrioribus ferè ouiculis esse commune, ipsasq; toto cerebro in aquam conuerso, tandem subitanea morte perire Chirurgus igitur ouiculam vertigine & circumgyratione debilitam mactari iussit, mactariq; caput in ædes meas misit, ut illud aperirem, & in venam huius symptomatis causam diligenter inquirerem. Vnde detectum prius cranium, ambas meninges, cerebri substantiam, eiusque anteriores ventriculos perlustrans, ne guttulā alicuius aquæ reperi. Hinc tertium quartumque ventriculum inspexi, in quibus pariter nul-

lium vestigium inuenire licuit, sed rectius copioso sanguine repletus comparuit. Postea olfactus organa, manubrio scalpelli anatomici osseo eleuauit & in sinistro latere inter cerebrum nempe & eiuspiam matrem inueni abscessum, instar vesicæ piscium, aqua limpidissima repletum, propeque oculum sinistrum, substantiam cerebri subnigram. Ego miratus fui, cum in hoc malo ipsissimum cerebrum afficeretur, cur ouicula non potius conuulsionibus aut paralyti, quam vertigine laboraret.

OBSERVATIO XI.

Contusio capitis, cui successit vertigo, & apoplexia.

ANno 1540. die 25. Ianuarij secui caput ouiculæ meæ quæ simili vertigine interijt. Ablato cranio, substantiam cerebri cum suis omnibus integumentis examinaui, statimque in sinistro, occipitis quasi, latere sub dura matre folliculum, instar piscium vesicæ crassum, aquaque & vermiculis, quales in cascis generantur, repletum, incipiebat enim ad fundum putrescere. Hic autem tumor tunicatus magnitudinis ouum gallinæ superans, in cerebri substantiam ita se inclinauit, vt tertium ventriculum nonnihil comprimeret. Hæc ouicula, opilione teste, tota sui interitus die in dextram sese partem circumgyrauit. Quod accidit superioribus ouiculis, illud etiam hominibus potest euenire. Obseruaui namque similem cerebri affectum cum Barbitonfore Iohanne Burausi & Chirurgo Georgio Riedlin, in Maria Ochmarhmanuen, quæ post contusionem syncipitis à me curatam, per integrum annum de sola vertigine, grauissimas querelas habuit, remedijsque frustra vsurpatis, ad cœnam aliquando sedes apoplexia fortissima subito obiit. Huius parentes à me petierunt, vt cranium aperirem ad leuandam, vel confirmandam illam veneni suspensionem, quam ex certo quodam facto conceperant. Aperta igitur caluaria, inspectoque cerebro, in sinistro latere reperi tumorem quoad folliculum & materiam contentam, superiori non absimilem, qui magnitudinem oui gallinæ mediocris adæquans tertium ventriculum ex parte compressit. Quærentibus, quænam huius tumoris tunicati causa extiterit; respondi, nec forsitan adeo malè, quod cerebrum ea parte vehementer percussum debilitatem quandam contraxerit, propter quam affluens alimentum non in cerebri, sed modo ostensam substantiam, fuit conuersum. Ex his iterum patet omnes capitis percussiones esse magni faciendas, quoniam nullus tam perspicaci ingenio prædi us, quin pariter interiores ad interitum disposita illud aliquando effugiant.

OB-

OBSERVATIO XII.

Vulnus capitis cum incisione falcis, membrana crassa, & pia matris.

ANno 1635. Michaë Ochneider. Miles Vlmensis, & præsidarius Elchingensis, à milite Cæsariano in vertice & occipite, acinace vulneratus fuit: vulnus in occipite erat simplex, illud verò in vertice, non solum cum depressione & fissura crani, verum etiam læsione membranae cerebri crassæ, & falcis, quæ ramos arteriæ carotidis & venæ iugularis admittit. Hæc duo vulnera Barbitonfor imperitus more suo tractavit, & per primam intentionem curavit. Quid sit? miserrimus patiens abhinc atrocissimos sustinet dolores, quos sequuta est phrenitis, convulsio totius, & tandem Apoplexia. His ita se habentibus, sexta à læsione septimana, ad vesperam, à coniuge ægri adhuc vivente, in cõsiliu vocatus ægrum apoplexia correptum inveni, cuius causa fuit obstructio nervorũ à copioso pure, quod per vulnus expurgari debuisset, dependens, imo tanta erat puris nigri & fœtidi copia, ut etiam per nares & palatum exitum quæsierit, apoplexiam soluerit, & mihi certissimam ossis fissuram & læsionem internorum significarit. Locum verticis consolidatam digito tangens, inveni maximam foveam, quæ depressionem crani evidentiissimè significat. Facto prognostico, ægrum in maximo versari periculo, clysterem laxativum injeci, eoq; reiecto venam cephalicam aperiri curavi. Secundo die cutem & pericranium in crucis formam scalpello Tab. II. Fig. I. incidi, pericranium digitis ab osse vehementer depresso & multoties fisso diduxi, vulnusque medicamentis stegnoticis dilataui, ut in peragendis operationibus in hoc affectu maximè necessarijs satis hiet. Tertio die, sanguine firmiter subsistente, cranium quinquies ad depressionis circumferentiã trepano Aquapendenteis perforavi; & per vnumquodque foramen linteolum oleo rosaceo imbutum ad duram matrem demisi, ossi pulverem notũ inspersi, vulnerisq; labia digestivo, cerato diapalmæ, linteo triplici vino austero calido expresso, & fascia commoda obtuxi. Die 5. foraminum interstitia ferrula mea versatili Ta. XXXII. Fig. I. intercidi, cranium depressum, sed dicta ratione ab integro & sano liberatum, cuius interior lamina ad diploidem vsq; fuit corrupta, vossella externi eminentiasque submisso prius membranae custode abrupti forcipibus Tab. XXXII. Fig. III. IV. & V. Hoc factò, instrumento decussorio Tabul. II. Fig. X. cerebrum modicè depresso, & materia purulenta in maxima copia, per datam viam, effluxit. Meningi deinde crassæ, (cuius falx transversum incisa continuo stillabat sanguinem)

nein) atque tenui linteam foramini respondens, & vnguento Hier. Fabrit. imbutum apposui, ossi puluerem & filamenta sicca, labijs digestium, & desuper ceratum diapalmæ, cataplasma & fasciam. Vespera patiens melius habuit, & materia purulenta per nares & palatū expurgari desijt. Die 6. iterum membranam, eiusque falcem inspexi, & deprehendi sanguinis stillicidium, quod ob vasi profundiorē situm compesci non potuit. Vasa namque incisa immediatum adstringentium & consolidantium contactum, & aliqualem compressionem requirunt, quorum vtrumque hic non fuit concessum, ob nouæ hæmorrhagiæ & apoplexiæ metum. Quapropter ægri consanguineis & coniugi indicaui, virum citra vitæ periculum integrè sanari non posse, quia vulnere ad cicatricem ducto, materia extillās iterum in pus muratur, & exitum per superiora non inueniens, prædicta symptomata excitare, & mortis causa fieri potest. Præmissa hac prædictione membranam, os & labia pro mote tractavi, & vulnus instat fonticuli in suturæ coronalis & sagittalis concursu inusti apertum detinui, per quod materia sensum quoque & paulatim exiuit, & inde patiens suo functus est officio per dimidium anni spatium. Hic vino inebriatus vlcusculum neglexit, vt spatio 24. horarum consolidaretur, & ne guttula materiæ amplius exiret. Symptomatibus præuis non statim occurrentibus, æger cum coniuge de tutissima sanitate non dubitauit, donec post trimestre iisdem symptomatibus correptus subito obierit. Post obitum ægri, si cranium serra aperuissem (sed concessum non fuit) citra dubium materiam sub cramo inuenissem. *Ex hac historia luculenter patet, perforationē non primis saltem diebus, verum etiam non raro longè post lationis tempus summa cum fructu institui posse.* Constat etiam ex sequente, symptomata praua quandoque comparere statim, quandoque post centesimum diem, quæ si cranium à principio, veluti supra fol. 106. monui, fuisset apertum, nunquam, omni proculdubio, ægrios corripuissent.

OBSERVATIO XIII.

Vulnus capitis vigesima nona septimà per trepanum curatum

ANno 1629. Mense Septemb. Domini N. Iisdilers, Magistri Equitum agnatus, Medionali in capite accepit vulnus, quod chirurgus ob symptomatum absentiam, per primam intentionem intra quatuordecim dierum spatium curauit. Anno 1630. Mense Martio curatus venit Vlman, de summo totius capitis dolore, verrigine, oculorum caligine, & paralyfi dextri brachij, conquerens. Huic ego ob suspicionem fissuræ cranij post vigesimam octa-

octavam à læsione septimanam, cutim & pericranium in triangulum incidi, cranium modiolis Die 13. Martij, in ædibus Nicolai Reutte, ad latus rimæ angustissimæ bis perforavi, foraminumque interstitium ferra versatili excidi. euacuata materia, quæ per rimam sub cranium paulatim descendit, dicta symptomata cessarunt ita ut æger mensis spatio vnus, pristinæ sanitati felicissimè restitutus fuerit.

OBSERVATIO XIV.

Rima & depressio cranij lamina interioris, exterioris salua.

ANno 1626. Mense Julio, Nobiliss. Inclytæ Reipublicæ Vlmensis Duumviris scripto retuli quod Bartholomeum Echaffer, militem Cæsarianum, à rusticis Altenstattenbus in capite læsum visitare volens, iam mortuum inuenerim, & præsentibus multis, in mortis, qua vigesimo occubuit, causam diligentissimè inquisiuerim, cuius solitaria fuit occipitis circa suturam lambdiformem vulnus in dextra parte, cum læsione & introcessione interioris solū, exteriore salua, cranij laminæ, quæ cerebrum continuo compressit, à barbitonforibus simpliciter curatum: cum enim in hac cranij noxa, materia, quæ per rimam occultam ad cerebrum delapsa, absque chirurgiæ neglectæ auxilio, non potuerit expurgari, multò minus cranium, continuo cerebrum deprimens, sine idoneis instrumentis, eleuari, ortus est abscessus, sub caluaria, qui introducta prius febre & phrenetide, ruptus dextrum cerebri ventriculum repleuit, & subitaneis cōuulsionibus necem intulit ei, cuius vita in principio læsionis, debita cranij perforatione & eleuatione (quæ ilux operationes in Italia citra vllum lædendi periculum ferè quotidie instituuntur) procul omni dubio conseruari potuisset.

Et quia in nostro territorio non hic solus, verùm ante hac plures ob neglectum vel potiùs incognitum in cranio operandi modum interierunt, inclytus Senatus merito decreuit, vt barbitonfores quantum possibile informarentur, quomodo se in casibus tam periculosis gerere debeant, ne patientes, ob denegatum manus præsidium, vitam cum morte commutare cogantur.

OBSERVATIO XV.

Vulnus capitis, post apertionem cranij, ex potu vini interdicto lethale.

ANno 1634. die 19. Maij. Henricus Debich, à victoribus vulneratus fuit, in capite circa suturam coronalem & musculum

lum temporalem, quæ primis diebus tractauit Nicolaus Reutte, qui me tertia die ad ægrum vocauit, è cuius vulnere statim frustulum cranij vndique separatim vossella extraxi. Die. 4. propter magnam vulneris inflammationem, idonea medicamenta adhibui, vsque in diem à lésione nonum, quo patiens de punctorio & grauatiuo capitis dolore cepit conqueri, qui certissimum signum fuit, quod materia purulenta sub cranio contineretur, & membranzæ cerebri ab osse pungerentur. Die 10. ægri parentes iuconsilium vocarunt Clariss. & Excellentiss. Dominum Gregorium Horstium, qui mecum consuluit, vt cranium modiolis aperiretur, quo materia, quæ sub craniũ descendit, exitum habeat, & ossiculum extrahi queat. Cranium die 11. Iunij in præsèria Domini D. Horstij perforaui, & statim membranas cerebri inflammatas obseruapi. Tertia post apertionem die, *ob dura matris insignè inflàmationè purulenta materia sufficienter expurgari non potuit*, qua propter cum consensu & in præsèntia Dominorum D. D. Gregorij Horstij, & Iohannis Reguli Villingeri, modiolis aliud foramen paraui, amborumque foraminum interstitia serula mea versatili intercidi. Post secundam perforationem, ossiculum ab interna lamina separatim, quod cerebrum & eius membranas assiduò pupugit, vossellà exemi, quo exempto dolor ille punctorius per aliquot dies omninò remissit, donec à *largissimo vini potu*. ab scelus in ipsa cerebri substantia genitus, febrem symptomaticà delirium, & conuulsiones totius exciearit, & interitus (nam die 20. Iunij patiens vitam cum mortem mutauit) causa existerit.

OBSERVATIO XVI.

Contusio capitis, tribus mensibus, instante nouilunio, conuulsiones inferens.

M Arcus Boët, Vlmenfis, Danielis filius, Anno 1629. die 15. Nouembris delapsus est in caput, & statim parentibus echymosin, in dextra syncipitis partè prope futuram coronalem & sagittalem, monstraui, cui successit primò dolor capitis, deindè conuulsiones totius. Vocatus exhibui interna, à quibus conuulsiones cessarunt, & tumorem admodum recens mactati agni pelle ferè resolui. Nihilominùs tamen circa nouilunium puer conquestus est de capitis dolore, quam sequabantur prædictæ conuulsiones. Post duos menses tumor capitis indies maior fractus est, ita vt eadem symptomata, tertio & quarto mense circa nouilunium puerum infestarent. A parentibus denuò accersitus, inspexi tumorem, & adstantibus indicaui, huiusmodi symptomata, meo iudicio, exci-

excitari à materia acri, erodente & vellicante pericranium, neque etiam mea me ſeſellit opinio. Siquidem facta per ſcalpellum Tab. II. Fig. II. cruciformi ſeſſione Tab. XXX. Fig. X. uſque ad cranium, & euacuata materia vulnus dilatavi. Die 2. ſubſiſtente ſanguinis fluxu, religavi vulnus, & reperi cranium ſubnigrum & aſperum. Die 3. cranio ad medullium prius deaſo inſperſi puluerem cephalium, & filamenta ſicca appoſui, donec optima carne obtegeretur. Vulnus autem tractavi primo digerentibus, ſecundo mundificantibus, tertio incarnantibus, & denique quarto cicattizantibus. Hac ratione puer ſeptennis vigeſimo poſt ſeſſionem, vel centeſimo & vigeſimo poſt morbi principium die priſtinæ ſanitati reſtitutus fuit, qui adhuc viuit, & veſtigia incisionis monſtrare poteſt.

OBSERVATIO XVII.

Vulnus capitis cum dedolatione exterioris calvaria tabula.

ANNO 1631. die 4. Nouembr. Nobiliſſ. Patricius *Vlmanſus*. in vertice & occipite læſus fuit, cum deperditione cutis & dedolatione: cranij, ad magnitudinem illius monetæ. quam Thalerum imperialem vocant. Vulnus hoc Nicolaus Reutte, ſtatim repleuit ſtegnoticis, & ego patienti, iniecto prius reiectoque clyſtere laxatiuo, venam cephalicam incidi, & 3 vi. ſanguinis educi curavi. Die 5. religato vulnere, oſſe ad medullium uſque reſecto, inſperſi puluerem cephalicum, ipſique filamenta decerpta appoſui, labijs plagæ adhibui digeſtiuum, & deſuper diapalma atque cataplaſma ad præcauendam inflammationem. Die 3. vulneratus ob amaritudinem oris aſſumpſit medicamētum cholagogum, à quo ſæpius deiecit materiā biliolaſam, quæ ventriculum, œſophagum & os amarum reddit. Die 5. æger melius habuit. Die 8. ob conſtipationem, alui patientes conqueſtus eſt de dolore capitis circa vulnus, quare admiſit clyſterem laxatiuum, quo reiecto, dolor etiam remiſit. Die 9. Vulnus coxit pus album & æquale, vnde digeſtiuo aliquod detergens imiſcui. Die 12. Cranio caput caro increſcere: quamobrem labijs ſarcoticum, ex vnguento de bethonica & cerato citrino applicui, donec cranium, beneficio huius ſarcotici & pulueris cephalici, carne ſolida obductum fuiſſet. Vulnus carne repletum tandem cicatrizaui cerato Dinino, atque his leuibus remedijs (*quæ tamen chirurgum rariffimè fallunt, ſi modo, præmiſſis vniuerſalibus, bonam viuendi regulam præſcribat, diligenterque in id incumbat, ut patientes tenuiori victu ſint contenti, & vino & Venere abſtineant, & aluum lubricum conſeruent*) Nobiliſſ. virum. adhuc ſuperſtitem, alioſque plurimos citra deaſionem aut perforationem cranij feliciffimè curavi.

OBSER-

OBSERVATIO XVIII.

Punctura cranij utramque laminam penetrans.

ANno 1631. Die 29. Augusti Miles quidam Cæsarianus vulneravit instrumeto quodam acuto *Iacobum* Mirth, Aichensem, in vertice, quem Barbitonfor istius loci obligavit, & intra septimanam curavit. Octavo post curationem die, æger conquestus est de insigni tumore, & dolore capitis circa locū affectum Nono delatus est *Vlmam*, cui decimo die cutim & pericranium scalpello Tab. II. Fig. I. in formam litteræ X. incidi, & cranium denudavi. Undecimo inveni puncturam cranij, quam eodem die, terebello Tab. XXXIII. Fig. I. delere tentavi. Cum autem punctura ista vsque ad secundum laminam pertingeret, atque de penetratione suspicio esset; cranium duodecimo (*omisso terebello*) modiolis perforavi & materia, quæ supra membranam descendit, exitum paravi. Expurgata materia, membranæ apposui linteolum oleo rosato imbutum, ossi pulverem cephalicum, labijs digestium, & desuper diapalma cum cataplasmate noto, atque fascia cancer dicta. Die 13. dolor remisit, decimo quarto inflammatio declinavit. Die trigesimo cranium se desquamavit: quadragesimo vulnus cicatrice obductum fuit.

OBSERVATIO XIX.

Vulnus capitis, cum duobus fungis, lethale.

Conradus Ocheiffelen *Vlmensis*, miles Cæsarianus, 23. annorū, temperamenti calidi & sicci, in cruento & acerrimo conflictu propè *VVittenvveier* die 9. Augusti, anno 1638. acinace sauciatus est, in parte posteriore capitis, cum læsione ossis. Hoc vulnus à principio tractavit quidam empiricus, quasi simplex esset. Die 24. Decembris patiens *Vlmam* venit, & iterum in manus cuiusdam imperiti balnearioris incidit, qui vulnus obligavit veluti primus, vsque in 31. diem Ianuarij Anno 1639. quo fuit receptus æger in Nosocomium patrum, ubi Balnearior iste partim cicatrice, & partim excrecentia carnis obductum vulnus, specillo obtuso & tenui exploravit, dictumque modò specillum per tertiam suæ longitudinis partem recto tramite non tantum in fissuram cranij, utrasque cerebri membranas, verum etiam in ipsissimam cerebri (*heu quantum error!*) substantiam, ex qua puris copia effluxit, immittens. Die 1. & 2. Febr. præparato & purgato corpore, patiens de oculorum gravitate conquestus est. Die 3. Balnearior imprudens iussu patientis, me, ut & clarissimum

Colle-

Collegam Dn.D.Moyſen Heldium, & peritiſſimum præ cæteris chirurgum Georgium Riedlin, in conſilium vocavit. Inſpecto vulnere, & conſideratis circumſtantijs, ob intromiſſionem imprimis ſpecilli tam profundam, anguem in herba latitare ſuſpicari ſumus. Vnde cum ſcalpello Tab.XXXI.Fig.II.in trianguli formam ſtatim incidi, vulnusq; dilatatum ſtegnoricis obligavi. Die 4. ſubſiſtente ſanguine, & inſpecto vulnere, rimam cranij magnam & ſatis latam, cum duobus fungis inuenimus. Rebus ita ſtantiſus, cranio puluerem cephalicum & filamenta ſicca, labijs digeſtuo quodam oblinita, & deſuper diapalma appoſui, cum cataplaſmate Hippoc. inflammationem prohibente, & ſcælia quatuor capitibus prædita Tab.XXXI.Fig.IX.& X. Die 6. æger cõqueſtus eſt de capitis vertigine & dextri oculi dolore. Die 7. melius habuit, & ſumpſit bolos ex 3 vj Elect. lenitiu. & 3 ij Elect. de ſucco roſarũ, cum ſaccharo, à quibus quater deiecit biliola. Die 8. ægrotus iterum cõqueſtus eſt de oculi dextri dolore, & fungis impoſui vnguentum Ægyptiacum Hildani, puluere aluminis uſti permixtum, quod tamẽ medicamentum prædictos duos fungos non cõſumpſit, ſed ita optimẽ ſaltem deterſit, vt ſpecillum obtuſum Tab. VIII. Fig.VI.inter vtrumq; fungum intromittere poruiſſem. *Et cum rimam ſatis & longa & lata eſſet*, & tot errores à barbitonfore commiſſi, ad trepanum, ſeu perforationem cranij peruenire nolui, ne operatio tam inſignis, & quæ plurimis fuit ſalutaris, infamaretur: ex relatis enim conſtitit, non duntaxat ambas cerebri membranas eſſe læſas, verũ etiam ipſum pari cerebrum. Quare die 9. ob capitis dolorem patienti ſecta fuit vena mediana dextri cubiti, & emiſſus ſanguis ad 3 iiij. veſperi melius habuit. Die 14. parum dormiuit ob frigidum hypocauſtum, ſicut enim vulnera capitis gaudent calore temperato, ita illis frigiditas æris eſt aduerſa. Die 15. benẽ habuit, labia vulneris recenter facti fuerunt rubra citra dolorem: fungi autem maiores viſi. Pro exſiccatione fungorum uſus ſum decocto Diuino.

℞. Vini Maluati. ℥ jſ.

Rofar. rub. p. jſ.

Bethonic.

Marris ſylu.

Pirapinell.

Centaur.

Stoech. Arab. ana p. ij.

Rad. uift. long.

Ireos Flor.

Corric. thuris ana 3 ij.

Bullians omnia ad cõſumptionẽ duarũ partium (ſed roſa bullians e-bullitione unica) & colatur. Colatura addantur mellis roſarũ optimũ deſpu-

despumati 3ij. M. absq; vlllo fructu, quod tamen in alijs fungis sepiùs presentaneum fuit remedium, ob id particulam maioris fungi in superficie nouacula abscidi. Die 16. æger quidem benè habuit, sed conquestus est de ratione victus admodum tenui. Die 17. conquestus est egrotus de totius dextri lateris stupore, ac vterque fungus maior apparuit, quam diebus proximè præteritis. Die 18. patiens cibis à me præscriptis non fuit contentus, vnde eius soror dedit panatellam, è pomis alijsque rebus confectam, quam assumptam statim euomit, & quàm pessimè indè habuit. Die 19. magna puris copia per fungorum interstitium effluxit, & cranium non nihil ad flauedinem, cum *depressis plaga labijs*, tetendit. Die 20. dextrū larus omninò fuit paralyticum, patiens totà nocte dormiuit, & de nihilo conquestus. Die 21. fungus vterque planè albus, craniumque omninò liuidum apparuit. Die 22. patiens loquelam amisit, cerebrum caro correptum, & brachium dextrum motibus conuulsis agitatum. Die 23. horà ante meridiem nona, patiens obiit. Die 24. Febr. inspexi vulnus, in quo *guttur* seu fungi adedò subsederunt, vt digitum annularam facilli- mo negotio potuerim fissuræ inferere. Aperto serra cranium, superfici- cies ossis læsi interna in tantum fuit corrupta, vt totum occipitis os vsque ad suturam lambdoidem tenuius esset, quam os petrosum. *Hic notandum, quod ad fracturam cranij cognoscendam non opus sit, vt æger frangat nuces, vel officula alicuius fructus, quando non adest depressio cranij, qua possit cerebri vel animæ pun gere, atque adedò dolo- rem inferre grauem: fregit enim hic nuces auellanas & inglandes, of- ficula etiam cerasorum & persicorum, obinix officium militare & nunquam conquestus de minimo capitis dolore.* Mox specillo obtuso intra fungos posito abscessum deprehendi magnum, qui in sinistro cerebri latere latitauit, proprio folliculo circumseptus. Remotis pro- ximis cerebri integumentis, cerebrum ipsum cum abscessu tunicatò mostrauit, & procelsum duræ matris, *qui falx dicitur*, eleuauit, vt spa- tium, quod est inter dextram & sinistram cerebri partem, cū suis vas- sis & spiris inspicere posset. Cerebro transuersim inciso, & magna eius portione, citra læsionem ventriculi sinistri, ablata, abscessus in con- spectum venit, ex quo pus foetidum in magna quantitate effluxit: deteriso per gossipiū abscessu, in circūferentia apparuit crassa aliqua membrana, quæ materiam purulentā continuit: in vicinis enim par- tibus nullum adfuit vel inflammationis vel corruptionis signū. His consideratis ventriculum sinistrum aliquantulum compresum; dex- trū verò minimè depressū, sed aqua limpida distētum ostēdi. In si- nistro plexus choroides pallidus, in dextro rubicūdisimus apparuit.

Ex his causā paralyseos dextri lateris, per vertiginis, doloris dex- tri oculi, & hæsternæ conuulsionis dextri brachij habemus. Ideoque

vbi læsum & fissum cranium, & fungosa caro subetescit, quæ supra cranium & carnem emineat, certissimum signum est, quod, si non substantia, saltem cerebri membranæ contusæ, vel laceratæ sint.

OBSERVATIO XX.

Vulnus oculi, cum infixo fusi aculeo.

ANNO 1644. Die 21. Martij Rosina Pfeifferin, filiola militis 4. annorum, cecidit in mucronem fusi, qui non solum palpebram superiorem oculi sinistri læsit, verum etiam fractus, in orbita oculi relictus, & ita intusus fuit, ut videre minime potuerit. Hoc vulnus barbitonfor obligavit, & tanquam simplex consolidavit. Inde oculus quotidie maior factus est, & membrana palpebræ internæ omnino adnata. Rebus ita stantibus, palpebras digitis nonnihil deduxi, & membranam specillo lato ab oculo separavi, vid. Tab. XXXIII. Fig. I. quo facto, cataplasma, (quod ex pomo dulci, albumine oui, aqua sequenti erat confectum.

℞. Aq. Plantag.

Rosar. ana ʒj.

Tut. præp. ʒj.

Lapid. chrysol. præp. ʒʒ.

Alumin. crud. ʒʒ. M.

oculo repide adhibui, & fascia ad oculum Galeni obligavi. Die 22. sumpsit diacydon. lauatiu. ʒijs à quo quinquies deiecit. Nuchæ applicari iussu vesicatorium. Ab usu horum medicamentorum dolor, & tumor inflammatorius remisit. Die 23. & 24. bene habuit. Die 25. puella conquesta est de magno oculi dolore. Ob id oculum ipse reli-gauit, palpebras digitis ab oculo *diduxi*, & mucronem fusi volsella extraxi, quo extracto, dolor omnis mox cessavit. Et hæc sunt medica-menta, quibus filiolum militis sanitati pristinae felicissime restitui,

OBSERVATIO XXI.

Coniunctio oculi, ex concussione cerebri.

ANNO 1639. die 5. Septemb. hora prima post meridiem, Geor-gius Merdlen, Miles Vlmensis, à commilitone suo, iactu ra-phani libram pendentis, in dextro oculo adeo læsus fuit, ut illico hu-mi prostratus, instar mortui iaceret. Sic attonitus æger in Xenodo-chium delatus, cui sequentia fuerunt adhibita. Primum palpebras di-gitis *diduxi*, & oculum affectum inspexi, quem (ut etiam sanum) su-periora

periora versus omninò conuulsum inueni. Rebus ita stantibus, mihi in mentem venit Hipp. Aphorismus § 8. lect. 7. *Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, mutas proinus fieri est necesse:* quod etiam in nostro percusso euenit. Vnde reuulsionis gratia præscripti Enema sequens:

℞. Mell. ros. sol. ℥ij.

Anthosati ℥j.

Elect. de succ. ros. ℥℥.

Diacatholic. ℥vj.

Decoct. carmin ℥ix. M.

Post reiectum clysterem, secta fuit vena mediana vtriusque brachij, & emissus sanguis ad ℥viii. Interim sæpissimè exhibita fuit Aqua confortatiua, spiritu cephalico Anhaltino permixta: Die 6. Septembris, qui secundus erat à læsione, apoplexiæ superuenerunt conuulsionēs totius corporis, per integram noctem durantes: pulsus ægri fuit æqualis. Ob id reiteratus est clyster, & spiritus cephalicus diligenter exhibitus.

Reiecto clystere æger melius habuit, neque oculi amplius fuerunt conuulsi, sed in suo naturali statu, & quod maius est, me & adstantes denuò vidit & audiuit; loqui tamen non potuit, proculdubio propter compressionem aut obstructionem neruorum recurrentium. Die 3. tota nocte dormiuit, de nihiloque alio conquestus, quàm de laryngis compressione. Quare sumpsit potionem purgantem:

℞. Syrup. ros. sol.

Mann. elect. ana ℥vj.

Extract. Rhab. ℥j.

Diacarth. ℥℥.

Aq. pimp. & veronic. ana q. s.

M. F. Syrup. liquid.

Post cuius operationem per interualla vsus est seq. lambituo:

℞. Syrup. viol.

Oxymel. simpl. ana ℥j.

Flor. Benz. ℥℥.

Aq. veron. ℥ij. M.

Die 4. æger melius habuit quàm die præterito, digitisq. monstrauit, se velle comedere ouum. Die 15. iterum benè habuit, petijt eadem ratione melli cratum, sed ob loquelam nondum restitutam bibit potionem medicam, hora 8. ante meridiem.

℞. Syrup. ros. sol. ℥ij.

Elect. diacarth. ℥vj.

de succ. ros. ℥iiij.

Decoct. fl. & fr. q. s.

M. & F. Potio.

Hora

Hora quarta à sumptione potionis Medicæ æger expeditè loquutus est. Die 7. pulcherrimè vixit, & pristinæ sanitati, citra topicorum auxilium, restitutus in publicum prodijt.

OBSERVATIO XXII.

Vulnus & Fractura Nasi.

ANno 1644. die 22. Aprilis nobiliss. & strenuus Vir, Dominus Vvolfgangus à Bartenheim, Teutonicus Vlmensis, rura sua visitans decidit ex equo, qui ipsi nasum calcaneo fregit, & adeò laceravit, vt vulneris labia propter insignem hæmorrhagiam & nasi frigiditatem ad mutuuum contactum adduci vix potuerint. Ea nocte sanguinis fluxum Chirurgus Iohan. Iacob. Riedlin, medicamentis stegnoticis sistit. Die 23. in subsidium vocatus, nasum omninò depresso, valdeque laceratum inueni. Rebus sic stantibus septum narium transuersum, ossiculaque nasi depresso specillo nunc lato, nunc obtuso reposui, & naribus tubulum plumbeum, cerato diapalmæ ac linimento simplici obductum imposui, vt septum & narium ossa iam reposita in loco conseruarentur. Vulneris labia sine sutura ad mutuuum contactum reduxi, adductaque linteolis oblongis ex medicamento sequenti imbutis,

℞. Album oui optim. agit. num. j.

Pulu. Tut. præp. 3js.

Lapid. chryf. præp. 3j.

Aq. plantag. 3ss M.

& in crucem adhibitis conseruaui, atque sic membrum affectum fasciâ Galeni ad nasum obligauî. Ob vehementem capitis dolorem, fronti & temporibus applicui oxÿrrhodinum.

℞. Albumin. ouorum. num. ij.

Aceti Rosac. 3ß.

Aq. Rosac. 3iv.

Ol. Rosac. 3ij. M. pro Oxÿrrh.

stappa cannabina exceptum. Collum ex oleis adstringentibus inunxi, eique splenium in vino rubro austero adhibui, ad impediendum humorum in caput affluxum. Ob animi deliquium præscripsi aquam cordialem:

℞. Aq. Ceras. nigr.

Pimpinell.

Fragar.

Rosar.

Rosar.ana ʒj.
 Marg.præp.ʒj.s.
 Mag.corall.rubr.ʒj.
 Pulu.Lapid.chryf.præp.ʒß.
 Man.Christ.perlat.ʒß.
 M.F.Aq.cordialis.

de qua sæpius per intervalla sumpsit patiens. Hora nona ante meridiem vsus est elystere refrigerante, aluum laxante, & per consequens humores à capite reuellente.

℞ Herbar.Mal.
 Pimpinell.
 Violar.
 Borrag.
 Nymph.
 Flor.Chamomill.ana M.ß.
 Semin.Lini.
 Melon.
 Fænicul.
 Citri ana ʒj.

Coq. in f. q. aq. font. & colatur. ʒviii.
 Adde Mel. ros. sol. ʒiv.
 Ol. Violar. ʒij.
 Chamom. ʒj. M.F. Enem.

& inde bis deiecit materiam valdè crassam & adustam. Hora decima Chirurgus incidit venam medianam dextri brachij, & vncias quinque eduxit sanguinis, qui biliosus & semiputridus fuit. Vesperis sumpsit haustum accidularum Vberkingensium vino granatorum permixtum, ad extinguendam sitim intolerabilem. Victum ordinavi tenuem, pro cibo cremorem hordei, interdum panatellam, nonnunquam iusculum carnis, in quo luteum oui fuerit dissolutum; pro potu decoctum C.C. vsti vino granatorum correctum.

Die 24. Aprilis æger quoad vires & dolorem capitis melius habuit, quam die præterito: vulnus linteolis emplasticis tractavi, & patienti ob nimias vigilias, & totius incendium præscripsi sequens pediluvium & emulsionem.

℞ Herbar. Bethon.
 Lactuc.
 Violar.
 Flor. Nymph.
 Rosar.
 Papau. ana M. j.
 M. Pro decoct. pedum,

℞. Semin. melon ꝑjss.

Papau. alb. 3 ℥.

Aq. nymg.

Fragar.

Ceras. nigr.

Acetos. ana ꝑiv.

E Emuls. cui adde

Mag. corall. rubr. ꝑjss.

Perl. præp. ꝑij.

Sirup. violar. ꝑij.

Misce pro trib. dosib.

quarum quælibet sumatur post coenam & pediluvium. Die 25. patiens interrogatus respondit, se aliquantulum dormisse, & conquestus est de summo calore & rubore oculi dextri, quem post reiterationum clysterem, sequens cataplasma statim iuuit.

℞. Pom. dulc. in lact. coct. & fort. expr. num. ij.

Album oui conq. num. j.

Pulu. Tut. præp. ꝑjss.

Aq. ros. parum. M. F. Cataplasma in oculorum inflammationibus, & epiphoris expertissimum.

A die 26. usque ad trigessimum Aprilis tubulos plumbeos vnguento de Tutia Magist. obduxi, pulvereque carnis excrecentiam prohibente,

℞. Pulu. Alum. vsti ꝑjss.

Tutiz præp. ꝑij. M.

asperso naribus indidi, exterius ceratum diuinum applicui; quibus medicamentis vulnus intra & extra nasum, consolidavi. Post vulgoris curationem patiens ipse tubulos solo vnguento de tutia infectos naribus immisit, & fascia Galeni firmavit, donec etiam ossicula prius fracta & depressa callo quodam fuerint colligata. Iisdem remedijs externis curavi Dominum *Christophorum Schlescherum*, & *Malchiorum Frid.* qui præter vulnus in naso, & capite acceptum, passus est vulnus thoracis cum læsione diaphragmatis & ventericuli, de quo infra singularis observatio.

OBSERVATIO XXII.

Tumor cum follicula excisus in maxilla superiore.

ANno 1631. Rosina Otenglerin, Gieglingensis, temperamenti melancholici mihi narrauit, quod ipsa ante quadrienniam caruncula in oris sede sinistra, circa superioris maxillæ

o

dentes

dentes molares, enata fuisset, moles scilicet rubra, pendula, & magnitudine nucem moschatam adæquans, quam septimo mense istius loci Barbitonfor, ante ullam corporis præparationem, aut medicamentorum topicorum usum extraxit. Paucos post menses denuò excreuit dura, rubra, venis obfita, & maximè dolens, usque in quartum annum, quo magnitudinem oui anserini superauit, ita vt non tantum prædictæ maxillæ, & dentibus moraliibus, sed etiam canino, & mediæ palati parti adnata, deglutitionem & loquelam impediret, quare eius excisionem à me instanter petijt. Hic tumor circa dentes molares, non ratione malignitatis, sed aceti acerrimi, quo sæpius os ob fœtorem colluit, aliquantulum exulceratus fuit. Cum autem viderem, tumorem alia ratione tolli non posse, quàm chirurgiâ: ad corpus præparandum præscripsi, die 4. Octob. medicamentum, quod

℞. Hydromel. Tartarif. ʒij.

Aqu. borrag. ʒiiij

Cordial. Saxon. ʒij. M. pro dos. j.

Hoc syrupo patiens vsa est per triduum, bis in die, nimirum mane ante prandium, & vespere ante cœnam. Die 8. deglutiuit quinq; horis ante prandium sequentes pillulas.

℞. Mass. pilular. aurear.

sine quib.

Extract. coch. ana ʒj.

Mag. mech. nigr. gr. viij.

cum syrupo de bethonica form. pilol. paruz, quæ de aurentur.

à quibus decies deiecit materiam serosam, biliosam & adustam. Die 10. ad inspiciendum sanguinem ipsi secta fuit vena mediana sinistri brachij, & emissus sanguis ad ʒiiij. omninò serosus & adustus. Vnde ordinaui sacculum medicatum.

℞. Radic. Fœnicul. ʒij.

Polypod. ʒß.

Com. absynth. pontic. p. j.

Herb. Bethon.

Veronic.

Agrimon. ana p. ʒ.

Flor. Borrag. p. j.

Fol. sen. Alex. stip. ʒjs.

Radic. mechoac. nigr. ʒij.

Rhab. elect. ʒiiij.

Hermod.

Turbeth. ana ʒjs.

Scm. chartam. excort. ʒvj.

Anis.

Aniſ.

Fœnicul. ana ꝯjs.

Crem. Tartar. ʒiij.

Gingib.

Cinam. ana ꝯj

Incifa & contuſa dentur ad ſacculum, in menſura vini Nicarini, per 24. horas infundendum, de quo alternis diebus duabus horis ante prandium hauſit ʒ iij. Ab uſu vini cathartici remiſit frequens illa ſaliuz expulſio, quæ ſanguinis inſpectionem & expurgationem indicauit. Interim patiens non neglexit bonam victus rationem, & loco vini bibit decoctum ſarſaparillæ. Die 20. & 21. manè, veſperi, & poſt cœnam ſumpſit de ſequentē mixtura tantum, quantum cuſpis cultri latoris comprehendit.

℞. Conſeru. Borræg.

Rofar. ana ʒj.

Cortic. citr. cond ʒij.

Nuc. moſch. cond. ʒj

Mag. corall. rubr.

Marg. ana ꝯj.

Lapid Hæmatid. ʒ ſ.

Syrup. acetof. citr. q. s.

M. F. conditum.

Die 23. cum ab uſu conditi patiens benè haberet, ad conſervationem virium ſæpius aſſumpſit cochlear vnum, atque alterum de ſequenti Aqua corroborante.

℞. Aq. ceraf. nigr.

Borræg.

Rofarum ana ʒj.

Spir. Cephal. Anhalt.

Marg. præp.

Magiſt. corall.

Lapid. Hæmatit.

Chryſolit. præp. ana ꝯj.

Man. Chriſt. perlat. ʒ ſ.

M. ad vitrum.

Et ne aliquid deſit inter benè operandum, præſcripſi aquam hanc odoriferam.

℞. Aquæ odorif. Fuchſij.

Rofar. ana ʒj.

Aceti roſ. ʒvj. M.

His præparatis, ore patientis aperto, & eius capite ab adſtantibus firmiter detento, tumorem ante, retrò & poſt molares dentes

scalpello separavi, & in medio forcipe Tabul. XI. Figur. V. abscissum extraxi.

Post tumoris extractionem, patiens, ad sistendum sanguinis fluxum, os sæpius colluit mixtura.

℞. Aq. plantaginis.

Prunellæ.

Rosarum ana ʒiij.

Acet. ros. ʒj.

M. pro collutione oris.

Cum autem post repetitam oris collutionem, sanguis non substitisset, venulas & arterias ferramentis è Tabul. XIX. candentibus tetigi, ipsisque spongiam vstam, & pulvere adstringente Galeni aspersam, atque splenium albumine oui agitato & vino rubro expressum, imposui. Maxillam exterius linteo quadruplici expresso, & fascia duobus capitibus prædita obligavi. Vespero patiens benè habuit, & subsistente sanguine, serosi humoris magna copia ex ore defluxit. Die 24. patiens de insigni capitis dolore conquesta est, sed medicamenta in ore relicta fuerunt, ob timorem novæ hæmorrhagiæ. Die 25. sanguine firmiter consistente, spongiolam adustam & splenium extraxi, & præscripsi gargarisina seq.

℞. Aq. Plantagin.

Prunell.

Veronic.

Rosar.

Quinque sol. ana ʒ iij.

Mel. ros. col. ʒij.

Tinctur. ros. ʒjs. M.

Ore eloto, vlceri filamenta carpta vnguento ex pulueribus Galeni adstringentibus, & albumine oui agitato oblita imposui, fasciaque & linteo triplici maxillam exterius obligavi.

Vespero ob ventris constipationem ægra admisit Enema laxativum.

℞. Decoct. carmin. ʒ viij.

Mell. ros. sol. ʒijs.

Elect. Diacarth. ʒj.

Ol. chamomil. ʒ j ʒ.

Amygd. dulc. ʒj.

M.F. Enema, à quo sexies deiecit.

Die 26. per totam noctem se quietissimè dormivisse dixit, & quoad fauces benè habuit. Die 27. extractis medicamentis, quæ nudius tertius apposui, circa palatum & dentes molares apparuit quædam particula viscosa, quam specillo, lana in spiritu vitrioli madefacta,

inuo-

inuoluto aliquoties terigi, osque cum faucibus gargarismate ordinario lauari iussi. Die 28. extractis denuò medicamentis, omnia circa dentes molares, atque palatum pulcherrimè habuerunt. Die 29. Eschara, quam ignis induxit, ablata, sæpius per diem lauit os medicamento hoc:

℞. Mell. ros. colat.

Tinct. rosar. ana ʒis. M.

Die 30. ob capitis dolorem repetijt vsum pilularum cēphalicarum, a quibus dolor omninò cessauit. Die 31. vlceri cicatrix induci, & paxiens articulatè, citraque omnem hæitationem linguæ, loqui cœpit. Die 1. Decemb. ægra benè quidem habuit, sed ad maiore oris excitationem bibit decoctum sarsapatillæ. Die 2. omnes oris partes cicatrice ferè obductas vidi, & ad præcauendam mali recidiam consului, vt vsum vini medicati repeteret. Die 3. vlcus omninò consolidatum apparuit, & paxiens exinde lætissima in publicum prodijt.

OBSERVATIO XXIV.

Excreſcentia carnis in palato.

IN palati anteriore parte, retrò dentes incisórios, foramen est notatu dignissimum, per quod ex palato in narium amplitudinem, vena, atque arteriola, vnà cum tunica palatum succingente, transmittitur. Ex hoc foramine, ante tres menses, nascebatur Nobili Matronæ, & coniugi Domini Alberti Ochleichers, quædam excreſcentia carnis instar fungi, ex qua magna sanguinis copia effluxit, quotiescunq; illum vel leuiter lingua terigit. Tandem cum ille fungus, seu excreſcentia carnis, ad nucis iuglandis magnitudinem, ita vt loquelam interciperet, peruenisset, vſa est consilio sui Barbitonſoris, qui quædã medicamenta, at sine fructu, adhibuit. Anno 1641. die 10. Martij vocatus, locum affectum inſpexi, specilloq; excreſcentiam circa basin terigi, ex qua statim sanguis copioſè effluxit. Hiſcè cōſideratis manifestum erat, malum hoc ex prædicto foramine originem traxiſſe; qua propter aliquoties vſa est pilulis Aquapendentis, quæ caput optimè purgarunt, & bonà victus ratione. Excreſcentiã medicamento, quod constabat spiritu vitrioli rectificato, succo portulacæ, & tinctura rosarum, terigi, ac diminui. Deniq; instrumento, quo extrahere polypum ſoleo, reſiduum extraxi. Sic ſpatio 10. dierum, ſumma cum admiratione, ſanitati reſtituta fuit. Ante huius mali inuaſionem per biennium conqueſta eſt de inſigni dolore & grauitate auditus: iam verò poſt ſanguinis effuſionem, abſque dolore benè audit: Ideò arbi-
tror per *metaſtæſin* eſſe factam morbi curationem.

OBSERVATIO XXV.

Sinus callosus & corruptio ossis palati.

Nobilissimus & reuerendissimus Decanus, Dominus à Cronburg, Anno 1626. conquestus est per Clarissimum Medicum Augustanum, Iohan. V Volfgangum Beern, de periodico dentis dolore, & molestissimo quodam Palati sinu, petijque à me consilium & operam. Cum igitur huiusmodi affectus primam suam originem traxerint à consuetis hæmorrhoidibus suppressis, consului, vt Reuerendus admodum patiens post sufficientem sanguinis è vena basilica sinistra brachij missionem, corpus vino medicato à superfluis & excrementitijs humoribus expurgaret, hæmorrhoides dein hirudinibus aperiri, fonticulumque sinistro femori inuri concederet, quo humores è toto in caput ascendentes & sinum cum dolore dentis fouentes ad inferiora quasi reuellantur, & per fonticulum educantur: Ad præcauendum doloris impetum, proposui Chirurgiam in anthelice peragendam, quam præfatus Medicum, scolpomacherio meo candente, dexterrimè instituit. His omnibus factis, dentem cariosum extrahi curauimus, quo iniectiones ex decocto in cutanda ossium carie diuino, per cavitatem vulsi dentis ad sinum palati fistulosum peruenirent. Cum verò cavitates illa dentis, & callosus palati sinus non corrent, neque patiens citra ignis vim curari posset, quæsiui, vtrum ignis efficaciam adhuc residuam, cum bona spe salutis, vellet experiri. Egro annuente, Domino Doctore Beern, illud instrumentum Tab. I Fig. IV. Armamentarij adumbratum Augustam misi, quo optimè ignito sinum callosum, & cariem palati obtegentem, citra guttulæ sanguinis profusionem incidit vsque ad dentis cavitatem, eoque in orbem circumuoluto notabile vestigium ossis impressit. Eschata ablata, in conspectum venit palati caries, quam ter quaterue ferramenti candentibus Tab. XIX. Fig. VIII. & IX. tactam, natuta medicamentis exsiccantibus assumptis & adhibitis adiuta separauit, & vlcere consolidato patiens pristinam sanitatem adquirens fonticulum in femore per plures annos cum maximo fructu conseruauit.

OBSERVATIO XXVI.

Tumor alius cum folliculo in maxilla superiore separatus.

EX consilijs Medicis & *auto. l. i. a* constat mala, de quibus con-
queritur nobilis & honestissima Domina *Maria Cordula Zrap-*
pia, esse Hemicraniam, & steatoma, vel meliceridem superioris ma-
xillæ subcutaneam. Causa horum affectum est materia pituitosa,
tenuis & bile permixta. Queinadmodum bilis originem habet a
caliditate hepatis, & obstructione lienis; sic illa partim ex capite,
partim ex ventriculo, & vtero provenit. Pro curatione affectuum ne-
cesse est, ut humores pituitosi & biliosi euacuentur, hepar res igere-
tur, lien ab obstructionibus liberetur, caput exsicceetur, ventriculus &
vterus corroboretur, ne huiusmodi humores in corpore generentur,
colligantur; & postea in caput ruant. Hisce indicationibus, ut pro-
gnosticum attingam, credo nos satisfacere non posse, considerando
talem capitis & inferiorum indispositionem, qui difficilis sit curatu.
Nihilominus tamen (ne paucorum mensium spatio, malum peius
fiat, quod certè fiet, nisi primo quoque tempore idonea vsurpentur
remedia) proponam, quæ in hoc casu fieri debeant. Aperienda igitur,
meo iudicio, venæ cephalica dextri brachij, & vnciæ sex vel se-
ptem sanguinis emittendæ. His peractis reuulsione & deriuationis
gratia, Domina patiens sibi curet inuri setaceum, inter primam &
secundam cervicis vertebra, vel loco huius, singulis tribus mensi-
bus nuchæ adhibeat vesicatorium, & quatuor digitis supra genu
Tab. XLIII. Lit. l, sinistrum, atque incommodo brachij dextri loco
Tab. XLIII. Lit. H. inuratur fonticulus. Tumori duro, ante usum aci-
dularum, & decocti farsaparillæ, nullum topicum adhiberem. Cor-
pus præparetur & purgetur medicamentis blandis. Utatur igitur sy-
rupo cathartico.

R. Syrup. de mann. lax. ʒj.

Extract. Rhab. ʒj.

Diacart. ʒiij.

Mag. Tartar. ʒj.

Aq. ceras. nigr. q. s.

Ol. macis. gutt. ij.

M. F. Syrup. liquid.

Posteaumat hydromel Tartarificatum, & denuò purgetur infusione
Agarici, Rhabarb. foliorumque sennæ, syrupi ros. solutio & manna.
Hoc facto hepatis caliditas temperetur, lienque obstructus aperiatur
usu acidularum. Deinde totum corpus, præcipuè verò caput, propter
hemicraniam, purgetur sequentibus pillulis:

O 4

Mass.

℞. Mast. pilul. aurear.
 Cochiar. ana ʒ i s.
 Mag. Gelapp. gr. viij.
 Cum syrup. de bechon.
 Form. pil. num. xxj. deaurentur.

Postea caput expurgetur errhinis & masticatorijs blandis, ne irritentur humores ad oculos & thoracem. Caput etiam roboretur spiritu cephalico, cuius gutt. xv. manè & vesperi, in aliquot cochlearibus aquæ cerasorum nigrorum sumantur. Tempore autumni, post totius expurgationem, hepatis attemperationem, obstructi lienis reperationem, & capitis corroborationem, nihil præstantius est ad dissoluendum tumorem in maxilla superiore durum, quàm decoctum sarsaparillæ, quod habet hanc prærogatiuam, ut omnes tumores duos digerat & dissoluat: ita tamen exhibeatur, ne sanguinem calefaciat.

℞. Radic. Sarsap. ʒ iij.
 Lign. Guaiac. pro corroboratione ventric. ʒ ʒ.
 Aquæ fontan. ℥ viij.

Fiat infusio per 24. horas, dein coquantur ad consumptionem mediæ dietatis, & colentur pro syrupo sudorifero, de quo sumat manè, quinque horis ante prandium, ʒ v. & quatuor horis ante cœnam, ʒ iij. & singulis diebus, manè tantum, hora una post assumptum syrupum, in lecto blande & sine vi sudet per horulam. Pro potu ordinario fiat secundum decoctum, coquendo eandem materiam, primi decocti in ʒ x. aquæ ad consumptionem tertix partis, cui in fine ebullitionis addantur ʒ iij s. vuarum passarum & ita decoctorum vsum per 30. dies continuet, renouando secundo quoque die decoctum secundum. Inrer vsum sudoriferi animaduertendum, ne aliud constipetur, ideoque alternis diebus vtatur enemate, aut potione medica laxatiua. Singulis quoque Septimanis sumat semel præscriptas pilulas, vel medicamentum æquiualens, & eo die, quo siue purgans siue laxans per os assumit, à decocto primo absteineat. Pro debilitate ventriculi recipiat semicochlear spiritus mastichini sequentis.

℞. Mastich ʒ iij.
 Galang. ʒ j.
 Cinam. ʒ ij.
 infund. in f. q. spir. vin. & destill.

Exteriori ventriculi regioni applicetur ceratum, ex Catanna & Tamacha, aut aliud simile, Si his medicamentis tumor iste non cedit,

dit, ad sectionem deveniendum est. Et hæc sunt pauca illa remedia, quibus Nob. patiens tutissimè potest uti: ea tamen omnia Clariss. & Excellent. Medici præsentis iudicio relinquo Vlm. Suev. die 20. Aug. Anno 1642.

Curatio prædicti tumoris.

Tumor, cuius in præscripto consilio mentionem feci, fuit in dextra maxilla superiore, & magnitudinem oui gallinæ superavit, albus, immobilis & durus. Præterito autumno (præparato corpore, & educto sanguine) usæ est patiēs decoctio sarsaparillæ, quo tumor ferè discussus, ut ex epistolis Domine patientis ad me datis patet.

*Extractum literarum die 7. Mart. Anno 1643. ex-
tractatum Heilbrunnæ.*

Tumor in mala dextra post usum decocti sarsaparillæ minor factus est, ita ut ferè evanesceret. Sic Deus Optimus Maximus direxit curationē. Ego putavi perfectè curatum esse tumorem. Quid sit? Infelix post Bacchanalia, in balneum ordinarium, consilio & consensu Medici, ingressa sum, & vix iterū egressa, animaduerti alterationem atque augmentum tumoris. Hinc quotidie maiorem compressionem, non absque dolore, sentio, veluti tempore præterito, &c. ex his patet fructus & utilitas decocti sarsaparillæ.

Sed post aliquot menses, cum vtererur balneo, caput calefactum est, & tumor propter mœrores & continuas lachrymarum effusiones ad priorem magnitudinem auctus. Rebus sic stantibus, patiens Heilbrunnæ venit Ulmam, ut ibi tumor chirurgiâ curaretur. Communicatis cum Excellentiss. Domino D. Christophoro Eysenmengero, Reip. Heilbrunnēsis Physico, consilijs, datoque prognostico, nos optimam sperare sanitatem, si modo os illæsum fuerit, præmissa purgatione & venæ sectione, Dominam ægram Anno 1643. die 2. Maij, in lectum, ligatis ad latera manibus, collocaui: deinde vnus ex adstantibus hamulo labium superius nonnihil sursum traxit, ut commodè inter tumorem & muscolum primum, qui labium attollit, cultello separatorio peruenire possem. Hoc cultello superius vsque ad ossis iugallis sursum perueni, & tumorem à prædicto musculo separavi. Inferius autem, prope dentes molares & gingivam cartilagineam tumoris tunicam, quam ab osse quarto maxillæ superioris eodem scalpelle diducere frustra tentavi, inveni, ita ut coactus fuero folliculum incidere, quo inciso effluxit materia quædam crassa & flava, instar mellis, tumorque subsedit. Effluxa materia, & cartilagine per-

foreipem excisa, vulnus albumine oui, puluere chrysoliti præpar. & adstringente Galeni obligavi. Die sequente, & subsistente sanguine, propè musculum secundum, qui labium abducit, inveni quoddam tuberculum, sub quo erat foramen, per quod specillo obcuso, citra negotium in cavitatē osseam perueni. Die 12. in præsentia D.D. Eysenmengeri tuberculum illud incidi, & foramen illud dilataui. Die 13. post abitum D. D. Eysenmengeri, propè dentem caninum aliud tuberculum instar ossis durum reperi, quod etiam forcipe Tab. XI. Fig. II. excidi. Interstitium extracti folliculi, ab ultimo dente morali vsque ad cranium, ita consolidatum fuit, ut ne guttula puris exiret, foramen autem globulis apertum conseruavi, donec ossiculum beneficio decocti sarsaparillæ desquamaretur. Ossiculo oblato, vulnus cicatrice obduxi.

OBSERVATIO XXVII.

Vulnus sclopeti in maxilla inferiore.

ANNO 1634. die 27. Augusti Tesserarius equitum Suecicus, in cōsuetu Nordlingensi, in maxilla inferiori paulum infra dextram aurem, duobus sclopeti globis sauciatus est, quorum uterque linguam læsit, & oppositam maxillæ partem fregit cum offensione consillarum, omnium dentium molarium, insigni fluxione sanguinis, animi deliquio & febre. Die 5. læsionis ob insignem sanguinis fluxum, animi deliquium & febre adhibui sequentia:

℞. Syrup. Acetos. citri.
Jalap. ros. cum Tinct. ana ꝑjss.
Aq. Endiuiz.
Plantaginis ana ꝑijss. M. q. Syru.

Vespere usus est posio cordialis:

℞. Margarit. præp.
Corall. rubr. præp. ana gr. vij.
Lapid. Chrysol. præp. gr. vij.
Aq. rosarum.
Plantaginis.
Ceras. nig. ana ꝑj.
Syrup. corall. ꝑij.
Acetositatis Citr. ꝑijss. M. F. potio.

His peractis, remissionis gratia, præscripsi clysterem refrigerantem.

℞. Mell. ros. (ol).
Olei violat. ana ꝑijj.
Decocti emoll. ℞. Misc.

à qua

à quo ter deiecit materiam nigram, & sanguine mixtam. Post vsum clysteris, & sanguinis fluxu compresso, religavi vulnus, & non solum inferiorem maxillam in vtraque reperi parte lасam, verum etiam linguam, cum insigni inflammatione faucium & amissione loquelæ. Ideoq; illico adhibui pro lotionе oris gargarismum adstringentem. Elotis faucibus, tam internè quàm externè imposui spongiolam cōbustam, albumine oui agitato imbutam, atq; pulvere stegnotico Gal. & lapid. chrysl. præp. aspersam, partibus vicinis oleo rosato inunctis fasciam adhibui: & hac ratione sistebatur enormis ille sanguinis fluxus. Die sequente aliquid melius habuit, nihilominus tamen de insigni dolore capitis, laterisq; dextri pulsatorio conquestus est. Ob id secta fuit vena mediana eiusdem lateris ad emittendas ℥iv. sanguinis. Post horam sumpsit iusculum hordei, per infundibulum Tab. XXVI. Fig. III. iniectum. Tertio quoque die monstravit digitis insignem dolorem musculi temporalis. Quapropter adhibitum sequens cataplasma.

℞. Farinæ hordei.

Fabar. ana ℥vj.

Micæ panis domest. ℥iv.

Olei ros. ℥iiij.

Vini rubr. &

Oxymel. f. ana q. s. M. ad

ignem in formam cataplasmati.

Vesperī sumpsit panatellam per siphonem; & parum aquæ hordei. Media nocte sumpsit haustum syrupi acetositaris citri, & vini Granator. ana ℥is, cum Aq. ceras. nig. ℥ij. Die quarto monstravit digitis & scripsit, se in faucibus, hoc est, circa columellam, seu plectrum vocis, insignem dolorem pati. Subsistente sanguine vulnus religavi, ex quo pus fluxit cum tanto fetore, quem ferre non potui: elotis faucibus sequenti Gargarismo.

℞. Aq. Plantaginis ℥ij.

Prunellæ ℥j.

Bol. Armeni. ℥j.

Salis Prunell. ℥ij.

Aluminis ℥j.

Syrup. Mytrini ℥j. M.

Vidi circa columellam, & specillo obuso tetigi quandam duritiem vacillantem, seu frustulum ossis, quod partes circumstantes pupugit, & dolorem circa fauces induxit. Hanc ossis particulam vellellæ dentibus exemi. Vesperī, propter cōstipationem alui, vsum est præscripta clystere. Die 5. aliquid melius habuit, & religato vulnere, magna puris semicocti copia exiit. Die 6. sumpsit potionem medicam.

℞. Syrup.

℞ Syrup. ros. sol 3js.

Extract. Rhabarb. 3j.

Aq. Plantaginis q. s.

Lap. Chrysol. præp. gr. vj. M.

à quo quater deiecit materiam flauam, vulnus obligatum fuit digestiuo.

℞ Terebinth. lot. in aq. scordij. 3ij.

Pulu. Iridis Florent.

Aristolochiæ rotund. ana 3ß.

Syrup. de ros. siccis 3ij.

M. p. digestiuo.

Exterius applicata fuit rurunda oleo violato, & lumbricorum terrestrium oblita, ad linguam nihil vsus est præter Aq. ros. & gargarismum. Die 7. cœpit balbutire, dixit, monstrauitque digitis fauces iterum dolere: inspexi & extraxi ossis particulam, vulnus dein obligans, vt die præterito. Die 8. conquestus est de dolore colico, sed post vsum clysteris ordinarij, cui addita fuit portio quædam olei amygdalar. dulcium, melius habuit.

OBSERVATIO XXVIII.

De dolore dentium periodico felicissimè curato.

Quamuis pilula D. D. Herlicij in ore detenta omnem dentium dolorem mirificè sedet, quæ conficitur ex seminibus, opio, hyoapijcyamo, & syrupo papau.

℞. Semin. apii. gr. ij.

Hyoscyam.

Opii. ana gr. iv.

Syrup. papau. q. s.

M. F. Pilula num. j.

Nihilominus tamen ad periodicam dentium exacerbationem, quæ præstantissima sæpè elusit remedia, curandam & præcauendam, D. D. Spigelius, sclopomachærio Tab. XII. Fig. I. & c. candente, eam antheleicis partem, quæ superiorem tragi immediatè contingit, felicissimo semper successu incidit, vulnusque deinde iterum consolidauit. Hac noua chirurgia ille ramulus arteriæ carotidis, qui ab auris antheleice ad dentes pergit, transuersim inciditur, ita vt, intercepto humorum affluxu, dolor non amplius reuertatur. Huius præsidij chirurgici miram virtutem in se primum expertus est Author, postmodum, me præsentè, in non paucis alijs.

OBSERVATIO XXIX.

Apoplexia fortis ob dentitionem difficilem.

ANNO 1638. Die 27. Febr. hora noctis 8. Illustris & Generosus Baronis *Ferdinandi Geizkoflers filius* Ordolphus, inter duodecimum & decimum tertium suæ ætatis Mensem, ob difficillimam dentitionem, apoplexia forti mortuus est. Quarto ante obitum die parentibus inuisionem occipitis, *alias valdè proficuum, mihiq; pluries compertam*, proposui, quam parètes recusarunt: vnde talia adhibui remedia, quæ in huiusmodi magna intumescencia & gingivarum pruritu, febre & catarrho non sine fructu vsurpari solent. Nihilominus tamen sine manifesta membrorum conuulsione, clamore & dentium stridore spes vltima totius familiæ vniuersali apoplexia correpta è vita discessit. Quod autem hoc tempus dentiendi valdè periculofum sit, præsertim, quando pueri caninos edunt dentes, hoc est inter 12. & 13. à natiuitate mensem, ex Hipp. Aphor. 25. Sect. 3. constat & prouerbio: Parentes de liberis suis gaudere non posse, donec dentes sub oculis, canini dicti, editi fuerint.

OBSERVATIO XXX.

Vincula lingua vnguibus malè disrupta.

ANNO 1628. die 2. Martij coniux *Iacobi Eimmermans*, peperit pulcherrimum filium, cui obstetrix, cuius famæ parco, ligamentum vnguibus more suo incidit, vt in futurum articulate loqui posset. Huic operationi successit dolor & inflammatio, quæ papillarum apprehensionem, vel lactis potius suctionem scœtui prohibuit. Parentes lactendi impotentiâ linguæ vinculo adscripserunt, & existimantes quod obstetrix linguâ nondum satis à vinculo liberarit, vocarunt chirurgum, qui pari imprudentia, ligamentum & vasa linguæ incidit, è quibus sanguis in asperam arteriam defluxit, & scœtu tertia die suffocauit. Extincto infante, mater cepit conqueri de tumoribus mammarum à lacte concreto, quorum dexter malè tractatus tandè degenerauit in cancerum exulceratum, & scœminam, post perpeffos grauissimos dolores, enecauit. Fœmella quædam recens nata, postquàm ipsi chirurgus vinculum linguæ phlebotomo vulgari incidisset, propter dolorem linguæ parum lactis materni sugere valuit. Lacte in mamma dextra concrefcere, mater scœtū admouit papillæ sinistræ, qui, mitigato prius sub lingua dolore, lac in vtramq; traxit mammam, ita vt tumor ex

con-

concreto lacte durus minimè emolliri, & resolui potuerit nisi scē mella ablactaretur. Quo facto mater in filiola obseruauit vertebrae dorsi versus dextram distortas, cui distortioni vix emendabili ansam praeiuit scetus vnicæ papillæ admotio. Ex his duobus saltem exemplis satis apparet, quam periculosè vinculum linguæ vnguibus obstetricum, & chirurgorum phlebotomo non tarò dilaceretur, & quanti facienda sit legitima huius vinculi chirurgia, quam multis cū animadnersionibus nobis proposuit Hieron. Fabricius ab Aquapend. de qua vid. Tab. XXXVI. Fig. VIII.

OBSERVATIO XXXI.

Scrofula totum collum occupantes.

ANNO 1631. Mense Ianuarij charissima coniux *Iosephi Ronigs*, scrofulis totum collum occupantibus obnoxia, me in consiliū vocauit, cui præscripti puluerem mixtum ex partibus æqualibus sacchari è gingibris & turpethi, qui pituitam, scrofularum coniunctam causam; ex profundioribus & remotioribus locis peculiariter expurgat, teste Auicenn. l. 4. Fen. 4. Tract. 2. c. 10. quia ramen honestissimæ huius scēminæ natura ab vsu pulueris in vino exhibendi, abhorruit, sequentem mixturam tribus vicibus, citra nauseam, assumpsit.

℞. Pulu. Turpeth. ʒiv.

Gingib. Indic. cond. q. s.

M. in form. Elect.

Corpore ab humoribus crassis sufficienter expurgato, parti affectæ apposui caratum oxelæum, oleo *Logadornis* seu de lacertis emollitum, cuius descriptio hæc est: Recipiūt *lacerta virides vna*, quantum placet, conquantur in oleo communi, donec *lacerta comburantur*, & oleum fiat nigrum, Colatura indatur vitro, & reponatur ad solem, usque dum facies subsideant, oleum clarescat, & fusci coloris acquirat, & exhibui per triginta dies singulo manè ʒvi. de Electuario, quod *Hercules Soxonia*, & *Ioannes Prewocius*, tanquam longè certissimum ad curandas scrofulas remedium, pro secreto habuerunt, & ita pararunt.

℞. *Lacertarum* siue communium, siue virid. N. C. Abscissis capitibus & caudis, exemptisque intraneis infundantur in aceto vini albi per se acerrimo, & sine pipere salso, per 4. dies: deinde exiccantur, & macerantur in alio aceto, siccenturque iterum in umbra aut sole, & in puluerem redigantur. Quo facto pulueris ʒi. admisc. mell. ʒiij. Fiat mixtura, de qua per 30. vel 40. dies pueris dentur ʒij. adultis verò ʒss. ʒ vi. vel ʒi. ad summum

His

His remedijs exhibitis & appositis nostra patiens spatio mēis curata est. *Iohan. Riol. 2. Antropographi* 1 f. de mesenterio scribit; schrofulas in corpore nunquam erumpere, nisi mesenterium strumosum fuerit, quod etiam testatur Guido & Ingrassias. Eiusmodi mesenterium innumerabilibus glandulis repletum inueni in Nobil. Dominæ Vltresheimera cadauere, quod quoniam totus corporis habitus scrofulis erat quasi refertus, aperui, & in hydropis causam inquisui.

Mirificam unguenti, quod Fabricius ab Aquap. l. 1. pentasemchi c. 21. ad scrofulas apertas commendat, virtutem expertus sum in quadam monacha & puella, quarum illa scrofulas habuit exulceratas in mammis, & hac in collo.

OBSERVATIO XXXII.

Angina cum respiratione difficillima, & prohibita deglutitione.

Nobilis quædam scemina Vulmenfis. Anno 1627. Die 7. Iulij, menstruis fluentibus, circa vesperam periculosa angina fuit correpta, quæ respirationem valdè difficilem reddebat, deglutitionemque cibi & potus denegabat. Huic vocatus subito clysterem laxatiuum inieci, & eo reiecto sanguinis 3iv. ex vena brachij mediana educi curavi, Die 8. Iulij hora sexta matutina Enema fortius fuit infusum, quo reddito, patienti in lecto erectæ barbitonsor venas sub lingua incidit, & cucurbitulas siccas femorum parti domesticæ, veluti etiam heri, cum multa flamma affixit, non solum, ne purgatio menstrualis impediretur, verum etiam ne maior ad partē affectam fieret attractio, Sanguine sufficienter extracto, cucurbitulas remouit, & patienti gargarismū præscripsi, qui in omnibus periculosis anginarum speciebus, cum in principio augmenti fuerint, maximè commendatur, si eo fauces inflammatae sæpius in die coluantur.

℞. Pulu. sinap. ʒis.

Acer. vin. accerim. ʒj.

Aq. plantag. ʒiij.

Sacch. albiss. ʒij. M. F. Gargarismus.

qui spatio horarū quatuordecim, partim humores repellendo, partimque eos resolucendo, patientem morti proximam ab angina liberauit.

OBSERVATIO XXXIII.

Facies pulvere tormentario ambusta.

ANno 1634. Mense Nouembri, Aromatarij cuiusdam filius in taberna sua deposuit ollam viuis carbonibus repletā propē scrinium, in quo reconditæ fuerant decem libræ ciuiles pulueristormentarij, Hunc Africanus violentior adspirans scintillam ex olla in scrinium nullo operculo contextum detulit, ex qua puluis accensus pueri manus calefacturi faciem ita combussit, vt neque oculorum palpebras attollere, neque cibum & potum vel manibus apprehendere, vel ore accipere potuisset. Parentes de pueri restitutione valdē solliciti, meum consiliū prima læsionis hora petierunt, quibus, vt pro virili satisfacerem, præscripsi singulare linimentum, quo solo Chirurgus partes læsas quater in die inunxit, & septimanæ spatio ingentem illam ambustionem, nulla remanente cicatrice, curauit.

℞. Butyri rec. nouies, vel sæpius liquefacti & in aqua spermaranar. destill. lori ʒvj.

Ol. de vitell. ouor. ʒij. M. F. Linim.

Quod in quibusuis ambustionibus empyreuma extinguit, inflammationem mitigat, pustulas prohibet, simulque dolorem lenit.

OBSERVATIO XXXIV.

Gutta serena setaceo nucha inuisto curata.

ANno 1632. Maria Rôthin, in Territorio Vlmensi nata, circa vigesimum sextum suæ ætatis annum ob suppressos menses conquesta est de vtriusque oculi vitio, quod vulgò gutta serena nominatur. Huic in Nosocomium susceptæ circa nouilunium saphenam dextri pedis incidi, & sanguinis uncias sex educi curauim. Deinde pilulas vterino cephalicas:

℞. Mass. pil. de castoreo ʒij.

Extract. cochiar. ʒj.

Mag. Gialapp. gr. vj

℞. Aq. artemis. q. l.

Form. pil. num. xxj.

& vinum medicatū præscripsi ad expurgandū totum & caput. Post catharticoꝝ vsum fonticulū femori dextro quatuor digitis supra genu inuissi. Elapsis quatuor septimanis, menses cœperunt fluere, sed admodum diminutæ: quapropter patienti exhibui dosin pilularū de ammo-

Ammoniaco correctarum, à quibus purgatio satis euidenter fuit promota.

Circa tertium nouilunium menses apparuerunt, & fluxerunt, sed adhuc diminutè: quamobrem patiens repetitè vsum pilularum menses promouentium, à quibus ad nutum fluxere. Quarto mense purgatio iusto tempore & quantitate respondit: nihilominus tamen patiens tristissima, inde vsum non recepit. Hinc, quia antehac in Iohan. Davidis Commerelli charissima coniuge, & Iohanne Chundrado Ehingerio setaceum nuchæ inustum ad huiusmodi nervorum obstructions præstantissimum inueni, ceruici setonem applicui, vltimaque per viginti dies aperta detinui, donec ægra pristinum visum lætissima receperit. Mensibus ritè fluentibus, foniculum in femore consolidauit, & ab eo tempore vsque ad annum 1645. incolu- mi sanitate fruita est.

OBSERVATIO XXXV.

Excrecentia in naribus gallica.

Rusticus quidam Iungingenſis ozæna Gallica laborauit, cuius excrecentia nares ita fuerant obstructæ, vt patiens per eos ære- rem inspirare minimè potuerit. Quapropter præscripsi curam ex li- gno sudoriferam, eaque finita, excrecentiam narium consumpsi se- quenti vnguento.

℞. Linim. fol. 56. ad carunculas in meatu vrina-
rio auferendas, è Preuotij medicina paupe-
rum propol. 3j.

Mercurij præcip. 3 j ℞.

M. in formam vnguenti.

quo illinantur curundæ naribus immittendæ. Carunculis exes- sis, na- ribus imposui canales plumbeos, cerato diuino obductos, donec con- solidarentur vlcera. In eiusmodi vlceribus alij commendant mixtu- ram ex decocto ligni sassafras, melle rosato, puluere præcipitati & aloës succotrinæ, qua sæpius in die nares lauant, & felicissimè curât.

Hoc vnguento præstantissimo nuper quoque Vimanum sextorem, post præmissam curam sudoriferam, ab eodem malo citra omnem do- loris sensum intra septimana spatium liberari.

OBSERVATIO XXXVI.

Gutta serena utrimque oculi incurabilis.

ANno 1642. Iohannes Degelen, Apparitor Vlmenfis, conqueſtus eſt de amauroſi, quæ modernis gutta ſerena vocatur: Hinc in Xenodochium delatus, accepit repetitis vicibus pilulas ophthalmicas.

R. Maſſ. pilul. Lucis.

ſine quibus ana ꝑjs.

Magiſt. Gialapp. gr. vi.

Ol. ſcenicul. deſt. gutt. ij.

Aq. Euphraſiæ q. ſ.

Form. pil. n. xxvij.

quibus nihil quicquam conferentibus, ceruici primum velicatoria imponi & ſetaceum in nucha applicari iuſſi, quod utrumque præſidium, cum cæcus ſine emolumenti perceptione, amiſiſſet, reuocaui in memoriam, quæ Anno 1620. obſeruatoricinæ meæ inferui. Cadauer pauperculæ cuiuſdam Patauinæ (quæ per viginti annos amauroſi pedetentim inuadente laborauit, & tandem cancro mamillæ ſupraſtræ occulto, & medicamentis repellentibus in pectoris cavitatem detrufo, miſerriamè obiit) delatum fuit in Theatrum Anatomicum, vbi præſentibus multis ſtudioſis, in cauſam huius cæcitatæ legitimam inquiſui. Aperto igitur cranio, inueni duos anteriores cerebri ventriculos ſubſidentiam paſſos, & conglutinatos, per quos ſpiritus animalis ad oculos deferri non potuit. Vnde neruis opticis ſenſim emarceſcentibus (apparebant enim duplo minores, quam in alijs) amauroſis, illæſo vndeque oculo, inducta fuit, benè enim adhuc nutriebatur venis & arterijs rectè conſtitutis, niſi quod arteria ad oculi radicem ingreſſa turgebat, adeoque inflammationem quandam, menſtruis nempe regurgitantibus inſinuabat. Addebat Excell. Spigelius in lectione Anatomica, quam ſuper pauperculæ caput habuit, vitio huic minimè occurrì potuiſſe, licet Pausanias aliquando ex vulnere frontis talem guttam ſerenam, ſublataſſe fuiſſe affirmet; inde quoque ſatis eluſcere, guttam ſerenam non ſemper, imò rariffimè, ex obſtructione neruorum opticorum oriri, ſed plerumque eiufmodi diſpoſitionem præſupponere. *Hinc etiam mirum non eſt, quando huiusmodi affectus omnem & multis expertam medendæ operam eludunt.*

OBSERVATIO XXXVII.

Introcessio cranij mollioris in adulta minimè fissi.

In generali capitis contusionum curatione supra sol. 111. annotavi, cranium in adultis rarissimè deprimi circa rimam, siue interne, siue externæ laminæ, nisi in ijs, quibus una:ura mollius est cranium. Hoc confirmavit Ancilla Mich. Rietmans, quæ trigésimo ætatis anno, vas aquà plenum supra caput ferens, de scala decidit in sinciput dextrum, cui tumefacto accersitus Nicolaus Reutte, pellem agniam calidè applicuit. Altera die, remota pelle, & fouea digitis percepta, adstantibus depressionem cranij, & necessariam cutis diuisionem, indicaui: quà concessa, integram cutim scalpello in crucem incidi, statimque oculis, & specillo rotundo, deprehendi paruam atque in exterioris laminæ minimè fissam depressionem. Obligato vulnere, de interioris laminæ integritate maximè dubius, quoniam casus ab alto fuit vehemens, modiolorum operam proposui, quam patiens admittere noluit. Facto itaque prognostico, quod vulnus hoc, vel potius depressio, laminà interiore fissâ, citra cranij perforationem turò curari nequeat, ea verò integra existente patiens minori cum periculo sanari, plagam per 12. diès apertam tenui, quam, cum nec vnicum appareret accidens, quod interioris laminæ rimulam, vel aliqualem cerebri noxam arguisset, per secundam intentionem curavi.

OBSERVATIO XXXVIII.

Fissura cranij capillaris & penetrans in puero & adulto curata.

Anno 1644. biga quædam deonerata transijt Davidem Deilbrouner, & sinciput sinistrum cum detectione ossis & rima cranij læsit, qua observata & parentibus monstrata, vulnus stuppæ stegnotico imbuta dilatauit Chirurgus Ezechiel Bogel, quo necessaria cranij derasio tutissimè institui posset. Altero mane accersitus reperi cranium à pericranio latè nudatum, & fissura dubia fractum. Hinc rimam scalpbris instructus statim derasi, & vltra mediotullium perueniens observavi interiorem cranij tabulam rima tantummodo capillari fissam. Quare remotis scalpbris, vulnus cum osse derasa medicamentis solitis tractavi, puerumque viginquatuor dierum spatio felicissimè restitui, qui neglecto scalpriorum vsu, quod crebra testatur experientia, perire potuisset. Rationes, propter quas cranium haud perforatum, videantur supra folio 103, *de rima calvaria capillari & penetrante.*

Eodem modo restitui Iohan. Georgium Dornung, qui Anno 1635. die 28. Decemb. in musculo temporali vulnus accepit cum rima cranij penetrante, sed capillari.

OBSERVATIO XXXIX.

Contusio occipitis scalpris derafa.

ANno 1637. Mense Septembri, Maria Luken à militibus Bauari. cis miserrimè tractata, conquesta est de vehementissimo occipitis dolore, cuius causa erat empiricus, qui medicamentis tumorem statim suppurantibus maturauit, deinde resolutentia, per quatuordecim dies, adhibuit, donec materia purulenta exitum, ob integumentorum crassitiem, non inueniens, pericranium, (vnde vehemens dolor) & cranium corroderet, musculorumque (qui caput extendunt & splenij rectique vocantur) insertiones ab osse diduceret. Pateriens in Xenodochium Vlmense recepta, petijt auxilium manuale. Quare, præmissis vniuersalibus, ratione victus tenuioris instituta, occipitis exteriora, vt materiæ præclusæ pararetur exitus, scalpello in triangulum, ne musculorum dictorum fibræ per transversum læderentur, incidi vsque ad os, quod asperum, & à materia corrosum, reperi. Euacuata igitur materia, vulneris labia medicamento stegnotico, satis noto, repleui, & altera die os asperum scalpris vndique derafi: Operatione peractà, cranio puluerem Cephalicum inspersi, vulnèrique digestium adhibui, donec bidui spatio cranium scalpris derafum, carne solida obduceretur. Osse carnibus contexto, vulnus beneficio vnguenti de bethonica incarnatum, cerato diuino cicatrizaui. Post vigesimum à derafione diem, cranium aliquot squamulas protrudens, dolorem capitis renouauit, qui tamen, exemptis voscèllà officulis, statim cessauit. *Hic obiter monendum, ne chirurgia tyrones (si contusiones in capite suppurata appositis medicamentis tam diu minime cedunt) resolutentium usum protrahant, sed potius, citra moram & periculi metum, velamenta debite incidant, ne pus sub crassissima cute longius dimorans, prauam qualitatem acquirat, & cum pericranio subiectam calvariam erodat.* vid. Tabul. XXXII. fol. 109. contusio capitis sine læsione cutis & cranij.

OBSERVATIO XL.

Fistula thoracis, cum erosione clauicula.

ANno 1627. die 10. Nouemb. ad me venit Iohannis Maieri, ciuijs & cupidinatijs Vlmensis, Vxor, Sabina, monstrans tumorem

5477

cum fistula, supra claviculam sinistram, cuius fistulæ orificium fuit tam angustum, ut vix alicuius aciculæ cuspidem admitteret.

Huius causam querenti respondit ægra, quod ante semestre, febre acutissima laborasset, quæ per abscessum in hanc partem iudicata. Hunc abscessum Medicus alias exercitissimus & Matthæus Memmingerus Barbitonsor adhibitis suppurantibus caustico medicamento, non iucundè (eo quod per 36. horas applicitum atrocissimos dolores, crebrumque animi deliquium excitauit) aperuerūt & escharam, quæ magnitudinem thaleri adæquauit, phlebotomo violenter detraxerunt, qua ablata effluxit materia quædam sœrda & fœua, at in pauca quantitate. Vlcus hoc per quatuor hebdomadas apertum tenentes, tandem consolidarunt, remanente notabili tumore & durtie, quam naturæ negocio resoluendam reliquerunt. Post mensem & dimidium, relictus tumor in magnitudinem priore multò maiorem excreuit, quem denuò maturantibus vsurpatis emollientum cultro rasorio inciderunt, ut materia excluderetur, quæ iterum pauca & biliosa fuit: qua exclusa vulnus iterum per primam intentionem consolidarunt. Sic tertia & quarta vice ferramento abscessum inciderunt & conglutinarunt, ne minimum de læsione ossis suspicantes, quam tot recidiuæ facillimè indicare potuissent, ita ut vel tandem abscessus in fistulam degeneraret, ob quam patiens, quotiescunque brachium sinistrum, vel etiam quemcunque pedem parum mœuebat, atrocissimos cruciatus, & syncopen passa est. Cui ita narranti, & meum auxilium roganti, præscripsi medicamenta, quæ euacuant biliosos humores, in toto corpore abundante; horum enim copiam demonstrabant constitutio corporis calida & sicca, febris acutissima antecedens, flauus totius corporis color & ipsa materia flaua, quæ per fistulæ orificium quasi transudauit. Corpore præparato, & repetitis vicibus cholagogo optimè expurgato, fistulam angustissimam dilataui, non ferramenti incisionis (quibus non solum musculus pectoralis, ex præcedentibus incisionibus satis læsus, magis ostenderetur, verum etiam timor esset, ne ijs sinistrè adhibitis vasa iugularia dissecta, vel parum læsa, vitam cum sanguine effunderent,) sed turunda ex radice Gentianæ præparata (hoc est in turundæ formam accommodata, supra fornacem exsiccata, & in altera extremitate filo alligata,) quam foramini imposui, eam detinendo Emplastro diapalmæ, ac deligatura cataphractæ Tab. Vltim. S. & relinquendo in fistula per diem naturalem: Sequenti die radicem ab ischore bilioso tumefactam, & imò apice denigratam, volsella exami, & specillo rotundo sinus qualitatem, & coloris huius causam inuestigans, os asperum reperi, & mobile. Quare pro maiore foraminis dilatatione, radicem alterà crassiore adhibui, cum Empl. diacalcithecis

theos & dicta fascia, inuactis quoque partibus vicinis, ad detinendam radicem, & prohibendam inflammationem, quam dolor ex dilatazione subortus, licet vehemens non fuerit, facile attrahere potuisset. Tertia die gentianam adhuc maiorem intrusi, & sic consequenter, quotidie auxi magnitudinem turundæ, vsque dum foramen pro remotione ossis, iam separati ferè, sufficiens visum fuerit.

Sexto die fistulam, globulis ex spongia paratis filoque alligatis, impleui, vt extrahi possint, propendentibus filis de foramine, & superimposito Emplastro cum fascia cataphractæ, & inunctione partium vicinarum.

Præparatio globulorum est hæc: sumatur spongia noua & aqua dulci nunquam madefacta, intingatur in ceræ & resinæ partibus æqualibus, commixtis & liquefactis, postea sub prælo fortiter exprimatur, & in umbra siccetur: exsiccata conscindatur in globulos rotundos, cum filo annexo. *Septima die*, remotis spongiolis, fistula fuit amplissima, per quam ossiculum, volsella arreptum absque singulari dolore extraxi. *Octauo die* subsistente sanguine, ossi sano & detecto pul. seq. inspersi:

℞. Radic. Irid. Flor.

Aristol.

Peuced. ana ʒjs.

Euphorb. ʒss.

Myrrh. ʒj. M. F. pulu.

quem filamentis carptis & siccis aspersum apposui, donec firmissima carne fuerit obductum: Vlcus verò sacchari albillimi puluere (*quod etiam bilis acrimoniam mitigat*) quotidie insperso deterfi, & tandem Emplastro diapalmæ cicatricem comparauì. Duritiei remanenti applicui Emplastrum Oxelæum, cum linteo tripliei vino decoctionis expresso, & ligaturâ conueniente, vt reliquæ discuterentur, & nouus & partem adhuc debilem fluxus humorum prohiberetur. Hac ratione, intra quatuordecim dies, felicissimè mulierem, ab affectu periculosi limo pariter, ac molestissimo, liberaui, vt restabitur patiens adhuc superstes, quæ cum Georgio Hebichio Tinctore, in altero coniugio, per decennium, integerrimè vixit.

OBSERVATIO XLI.

Vulnus thoracis cum fractura costæ.

Iohannes Bandereisen, Augustanus, sculptor, ærarius, & publicus factionis pennatæ Pancratiaſtes, Anno 1628. Vlmæ in diuersorio ad Rosam, horâ noctis vndecima, vulnus accepit à pistore quodam, affectioni Martiatæ addicto, in sinistro hypochondrio, cir-

Et quartam costam spuriam (quæ in parte cartilaginosa per tranversum erat dissecta) cum exitu omentici, & magna sanguinis profusione, quam varia sequebantur symptomata, animi videlicet deliquium, vomitus, dolor & tumor insignis circa septrum transversum. Vocatus statim omentum adhuc integrum reposui, & vulnere turundam, ex stippe cannabina, albumine & vitello oui concussis imbutam, pulvere stegnotico inspersam, filoque alligatam indidi, superimposito cerato diapalmæ, cum decenti per Solstrati vinculum deligatura: reposito omento, & exhibito medicamento corroborante.

Die 4. Januarij, circa horam sextam matutinam, ægrum accessi, ut vulnus religarem & inspicerem; ac quoniam, propter virium debilitatem, & hæmorrhagiæ metum, non licuit, illi exhibui iusculum gallinæ adstringentibus alteratum, & ob cruciatus colicos cataplasma abdomini applicui, quod constabat ex dirigentibus, resolventibus, anodynis, pro virium restauratione & sistendo sanguinis fluxu, seq. Elect. præscripti.

℞. Conf. ros. antiq.

lymph. ana ʒiv.

Trochisc. de charab.

Terra sigill.

Corall. rub. præp. ana ʒj.

Marg. præp. ʒ℞.

Syr. Myrrh. q. s. pro Elect.

de quo sæpius per diem sumpsit ʒj.

Ob pectoris angustiam, & respirationis difficultatem, ordinavi Eclegma seq. cuius crebro usu crassam & viscidam materiam expuit.

℞. Syrup. capill. q.

Liquirit. ana ʒvj.

fatfar.

veron. ana ʒ℞.

Tab. diatr. trig. ʒ. iij.

ap. violar. q. s.

M. F. Eclegma.

Ob dolorem & tumorem circa vulnus, inflammatorium, applicui cataplasma vtiturum. Quinto mensis die, dolor & tumor aliquantulum remisit, unde subsistente sanguine, vulnus religavi, cui turundam, digestivo inunctam & filo alligaram, intrusi superpositis cerato, cataplasmate, & fuscis eadem. Eodem die exhibui iuscula Herb. Pimpin. Tormen. Consol. maior. Sarac. Equisset. Veronicæ, Fragariæ, & sem. melon. alterata, ut materia in abdomine contenta, per vias urinarias excerneretur; addita sũt adstringentia, ne diuresis sine his exhibita, novam hæmorrhogiam excigaret. Sub noctem con-

questus est de pruritu in meatu urinario, qui prælagiebat, materiam in cauum abdominis fluxam, beneficio diureticorum, per urinam expelli.

Sexto mensis 3 e dolor omninò remisit, tumorque circa vulnus evanuit: at patiens dixit, se maiorem sensisse pruritum dum urinam redderet, quam inspexi, & copioso pure permixtam inueni.

Septimo die, conquestus est æger de dolore circa humerum dextrum, sub vesperam de dolore hepatis cum febre & tussi sicca.

Cum igitur octauo prædicti dolores cum calore febrili incresserent, ex vena basilica dextri brachij misi sanguinem ad 3iij quo euacuato, dolores post vnam & alteram horam cessarunt, & febris denuò remisit.

Nono, materia vulneris erat cocta, & patiens in reliquum benè habuit: vnde vulnus consolidare cœpi, quotidie turundam minuendo, donec cicatrix inducenda veniret. Per noctem verò sentienti, circa os sacrum & vesicæ regionem, dolores colicis similes, præscripti die decimo potionem sequentem:

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec.

expr. 3iij.

Mann. elect. ʒijs.

Aq chamomill. q.s.

M. F. Porio.

Quà assumptà magnam bilis copiam euomuit, vigesiesque per aluum excreuit materiam biliosissimam, quæ huiusmodi dolorum vnica exitit causa. Hac euacuatione facta patiens melius habuit, remittentibus in totum doloribus vsque in diem vigesimum tertium, quo ob errorem in v. stus regimine commissum, diarrhæa biliosa fuit correptus, nam suasu muliercularum assumpsit. & auidè comedie pruna sylvestria, à quibus etiam insignis dolor colicus, cum tenesmo, oriebatur: quapropter die 24 exhibui Rhabarb. pulv. ad ʒj. in aqua cichorei, & duabus post Rhabarbarum assumptum elapsis horis, potionem sequentem:

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr.

Decoct. chamomill. ana ʒiij.

M. F. Haustus.

Bile sufficiente excreta, circa horam vndecimam ante meridiem cruciatus coliei, cum tenesmo, penitus cessarunt. *Die vigesimo octava* vulnus cerato diuino ad cicatricem fuit perductum, ita vt æger de nullo circa plagam dolore, de nullaque respirandi difficultate conquerens, vigesimo nono in publicum prodiret, & cum socijs ad mediam nocte perpotaret. *Die quarto Februarij* restitutus est coniugi in patriam iter parauit, & illam ante discessum sustibus egregiè ex cepit

cepit, ob leuissimam causam excandescens. Cuius facti certior factus maritum admonui, vt sibi in posterum, quanto possibile, ab animi pathematis cauere.

OBSERVATIO XLII.

Vulnus thoracis periculosum.

ANno 1633. Die 9. Mensis Februarij, Generosus Dominus Nicolans Dietericus, dictus Opherreiter, in monomachia sauciatus fuit à Generoso Domino Rittmein, Præfecto vigilum Suecico, & duo vulnera accepit, quorum prius infligebatur sinistro carpo cum læsione venarum, ac tendinum, ad manum extremam decurrentium: alterum dextræ mamillæ digito transuerso infra papillam, quod in capacitatem thoracis penetrabat cum vasorum intercostalium læsione, & sputo sanguineo. Hic propter sæua symptomata, & animi præsertim deliquium, quadriga delatus est in suum hospitium, vbi vulneri omnia necessaria fuerunt adhibita. Inter alia hoc notatu dignum esse iudico. Ante primam vulneris deligationem, nonnulli ex magna illa turba adstantium dixerunt, se posse exsugere sanguinem, qui in thoracem fluxit. Admissi suxerunt quidem, at non sanguinem, sed potius aurum: vnus enim inter sugendum vulnerato annulum adamantinum, mille florenis comparatum, clam detraxit, sed proditus iterum restituit. Accersitus vulnus thoracis inspexi, & specillo obtuso per foramen in capacitatem thoracis misso, eam sanguine repletam inueni. Ex sputo sanguineo suspicatus sum læsionem pulmonum, vnde per vulnus albumen oui, puluere adstringente Galseni, Lap. d. Chrysoliti præparati & pauca aq. plantaginis conuassatum per siphonem (Tab. XXXVII. Fig. IV. 6.) inieci, immisi dein vulneri turundam ex stipula cannabina confectam, eodem liquore imbutam, & filo alligatam, inunxi partes vicinas ex oleo rosato, desuper apposui ceratum diapalmæ, partemque linteo triplici ex vino rubro expresso, & Soltrato vinculo (Tab. XXXII. Fig. VI.) obligavi. Vulneri in carpo eadem remedia, ad fluxum sanguinis compescendum, fuerunt applicita. Pro roboratione virium & sistendo sanguinis fluxu in thoracem, sæpius recepit de sequenti aqua.

℞. Aquæ ceras. nigr.

Rosarum,

Plantag.

Pimpinell.

Veronic. ana ʒjss.

Cinamom. ʒjss.

Spir.

Spir. lilior. conuall.

Rulu. lapid. chrysol. præp. 3j.

Hæmatit.

Corall. rubr. ana ʒis.

Bezoard. gr. viij.

Marg. præp. ʒj.

Man. Chryst. plat. ʒss. M.

Ob sitim bibit aquam hordei, syrupo coralliorum & Tinctura rosarum permixtam, strictè obseruans tenuis rationem victus.

Propter sputum sanguinis & febrim, reuulsionis scilicet & ventilationis gratia, curauit venam iecorariam affecti lateris aperiri, & quatuor uncias sanguinis educi. Hisce peractis, præter decoctum hordei tinctura de rosis alteratum, & prisauam hordei, pro cæna nihil assumpsit. *Secundo* mane conquestus est, se præterita nocte nihil vel parum dormisse, vnde hora octaua matutina sequentem admisit clysterem.

℞. Rad. Acetof.

Altheæ ana ʒss.

Herbar. Pimpinell.

Agrimon.

Acetof.

Malu.

Violar.

Veronic. ana M.ß.

Semin. Lini ʒiv.

Fænicul.

Citr. ana ʒj.

Coq. in f. q. aq. ad ʒx. colat. add.

Mell. viol. sol. ʒiiij.

Ol. violar. ʒij.

Chamomill. ʒj. M.

F. Clyster.

à quoter deiecit. Post reiectum clysterem religauit vulnus, ex quo parum sanguinis effluxit. Eodem tempore conquestus est Generosus patiens, de insigni dolore & calore lateris vulnerati, ob sanguinis feruorem in thorace collecti. Cum autem sanguis iste ob vulneris angustiam exitum nullum haberet (*cis æger collocaretur in eadem figura; qua laesus fuerat*) & febris nimium cresceret, necessarium planè fuit sanguini exitum parare, vel vulneris dilatatione per scalpellum (Tab. XII. Fig. I. & Tabul. XXXVII. Fig. V. E.) vel noua sectione inter tertiam (Tabul. XXXVII. Fig. II. *II.*) & quartam ab vltima enumerata costam, secundum Hippocr. instituta. Hic enim obit

noran.

notandum, quod Hippocrates costas incipiat numerare ab infima seu duodecima numerata, eo quod digitis in macilento præsertim corpore optimè tangi queat, atque idem sit, ac si dixisset, inter 9. & 10. costam instituendam esse sectionem à superioribus numerando. Dilatio vulneris frustra fuisset tentata, quoniam maior sanguinis in thorace contenti pars in regione diaphragmatis fuerat collecta. Parum etiam Paracentesi profecissem, siue in dextro, siue in sinistro latere facta fuisset. In sinistro non contulisset, quoniam in dextro colligebatur materia. Dextrum incidi prohibuit dorsi iecorisque insignis dolor & intumescencia: supererat expurgatio per urinam & sputum, quam tamen expectare nimis periculosum erat, ob materiam copiam, quæ natiui caloris suffocationem minabatur.

Quare obligavi vulnus, velut die præterito, & ad aliud auxilium deveniendum esse mecum concludens, mihi curavi fieri cannulam & obstruatorem aureum (Tabul. XXXVII. Fig. IV. A.) vt facili negotio vel in triangulum, vel semicirculum insecti possint. Hoc instrumento in triangulum curuato, & in capacitatem thoracis lentè imposito, styloque extracto, magna copia sanguinis (siue suctione quæ fit ore) per cannulam effluxit. Post sanguinis hanc euacuationem vulnere imposui cannulam alatam & auream (Tabul. XII. Fig. XII.) pulvere adstringente Galeni, chrysoliti præp. & albumine oui illitam: desuper applicui Emplastrum diapalmæ, spongiam novam in vino rubro expressam, & linteum duplex, cum Solstrati vinculo. Ab hac euacuatione tota nocte meliùs quàm præterita quiescere potuit vulneratus. Tertio post læsionem die instrumentum prædictum thoraci adhibui, & libram iterum vnam & dimidiam, cum admiratione non solum assistentium, verùm etiam cum bona virium tolerantia extraxi.

Sumpto prandio, quod erat ptisana & decoctum hordei, accepit vesperi emulsionem:

R. Semin. melon. 3iv.

Papau. alb. 3j.

Aq. fragariæ.

Pimpinell.

Veronicæ.

Nymph. ana 3ij. F. Emuls.

cui addatur.

Lapid. chrysf. præparat.

Margaritar. præp.

Coral. rubr. præp. an. gr. v. iij.

Syrup. viol. 3j. M.

post

post cuius vsum tota nocte quietè dormiuit. *Die quarto* lætionis ; mingens acerbissimum do:orem in meatu vrinario sensit : inspexi igitur urinam , quæ omninò turbata & fetida mihi certissimum signum fuit , materiam in thorace contentam ad vias vrinarias tendere.

Vesp̃eri ob constipationem alui vsus est Enemate sequenti,

℞. Sequent. Decocti ʒ x.

Mell. viol. sol. ʒ ij.

Cass. rec. extr. ʒ ss.

Ol. viol. ʒ iij. M.

à quo bis deiecit.

℞. Herb. Veron.

Pimpinell.

Prunell.

Plantag.

Agrimona ana M. ss.

Hord. integr. p. ss.

Coq. in s. q. aq. & vini oligophori ad ʒ j. colatura adde Mell. ros. col. ʒ ij. Misco pro iniectione detergente & consolidante.

Hoc decocto per siphonem Tab. XXXIII. Fig. IV. depictum iniectione , & denuò euacuato , cannulam ex auro perforatam Tab. XII. Fig. XII. & digestiuo oblitam vulnere imposui, ac desuper ceratum diapalmæ , vt & splenium quadruplicatum ex vinoq; rubro expressum, adhibui. Interim non fuit neglectum vulnus carpi, sed alternis diebus suis remedijs curatum & obligatum. *Die sexto* ob amaritudinem oris exhibui potionem medicam sequentem,

℞. Syr. ros. sol. ʒ js.

Extract. Rhab. ʒ j.

Diacarth. ʒj.

Cremor. Tart. ʒ ss.

Aq. Dich. q. s. M. F. Potio.

Die septimo potum ordinarium miscui sequenti decocto.

℞. Herb. Veronicæ.

Agrimona.

Vincæ per vinc.

Prunell.

Fragar. ana M. j.

Cin. Aftacor Fluiat. ʒj.

Coq. in s. q. vini oligophori ad ʒ j. s. col. adde mell. ros. col. ʒ ij. M.

Die octavo vulnus carpi & patiens benè habuerunt; ille tamen nihilominus puluere vsus est cordiali.

℞. Pulu.

℞. Pulu. lap. chryf. præp.

Mag. marg.

coral. rub. ana gr. iv.

M. cum l. q. fyr. viol. & cor.

Die nono patiens optimè habuit, & de vulnere thoracis parum puris cocti exiuit: vnde omisso iniectionis decocto solam cannulam digestiuo oblitam vulnere imposui. Plagæ carpi, loco diapalmæ, applicui ceratum diuinum, ad inducendam cicatricem.

Die decimo omnino nihil de vulnere thoracis effluxit, sed patiens conquestus est de tussicula, quæ ab usu trochiscorum pectoralium cum ambra, & moscho cessauit.

℞. spec. diatr. s. ʒij.

diamb. c.

Pulu. ireos florent. ana ʒj.

Trochif. Gall. mosc. ver. gr. xxij.

amyl. ʒj.

Sacch. albiss. ʒjs.

candi alb.

penid. ana ʒvj.

Ambr. gryf. ver. gr. vj.

mucilag. tragac. in aq. rosar.

diff. q. s. F. Trochisci.

Vrina adhuc dum turbida & mictio dolorifica erat.

Die undecimo cum patiens optime valeret, nihilque de cauitate thoracis amplius exiret, ne vulnus degeneret in thoracis fistulam, omissa cannula, turundam filo alligatam, & vnguento de berthonica illitam, indidi, desuper admoto cerato citrino.

Dies 12. 13. & 14. æger sine querelis transiegit, & dixit, se ratione virium, citra scipionis beneficium, ambulare posse.

Cum *die 15. 16. & 17.* vulnus mundum & detersum appareret, ipsi turundam quotidie breuiorem imposui, vt caro ab intra excrefcere inciperet. *Die 17.* vulnus carpi, cerato diuino adiutum, cicatricem acquisiuit.

A die 18. usque ad 22. per optimè patiens Sirenaus valuit, vnde extraxi turundam, & eius loco plagulam ex filamentis carptis confectam & vnguento de berthonica oblitam vulnere apposui, & partem affectam spongia noua & ex vino rubro expressa, ne fascia compressura, quam cataphractam Tab. Vltim. S. vocant, obligauit,

Die

Die 28. vulnus cerato diuino cicatrice fuit od ductum, & patiens pristinae sanitati restitutus.

Die 34. conqueitus est de vehementissimo sinistri pedis dolore, qui originem traxit ex animi commotionibus, sed repurgato corpore à biliosis humoribus, cessauit.

OBSERVATIO XLIII.

Vulnus thoracis paratensem requirens.

ANNO 1622. Mense April. Antonius Auriga Patavij sauciatus est in dorso, ense ad sinistram mammam penetrante, atq; adeo duo vulnere efficiente, quæ insequabantur præceps in terram lapsus, animi graue deliquium, aponia, sudores in toto corpore frigidi, pulsus intermittentes, & vomitus sanguinis cum suspitione cordis aut æsophagi vulnerati. Vulnus in vtraque parte obligauit, sed prius in foramen in mamma scalpello falcato Tab. XXXVII. Fig. V. E. dilataui, & vtrique turundam, ex stoppa cannabina, albumine oui oblitam, filoque alligatam imposui, nihilque omisi, quod in eiusmodi vulneribus fieri necesse est. Obligato vulnere ob summam virium debilitatem, patienti vinum fuit concessum, nullum tamen arteriarum in carpo pulsam per integrum diem digitis percipere potui.

Die sequente quamuis magna sanguinis copia ex vulnere fluxerit, nullus tamen pulsus deprehendi potuit, nisi vulneratus, de loco in locum, aut de latere in latus, moueretur. Eodem die assumpsit paratellam, quam subito reuocauit, vnde æsophagum læsum esse mecum conclusi.

Tertia die patiens difficulter respirauit, in latere affecto propè diaphragma insignem sensu dolorem, de vulnere vix guttula effluxit, & quod maximum fuit, pulsus omnino defecit. Hanc ob causam inter tertiam (Tab. XXXVII. Fig. II. U.) & quartam thoracis costam, secundum Hippocratem, pectus fuit apertum, hac intentione, ut euacuaretur materia in thorace contenta, ne calidum innatum suffocaretur & substantia pulmonum putresceret. Facta perforatione, vix tres aut quatuor guttulæ sanguinis de vulnere effuxerunt, quod ideo notandum esse censeo, quia nonnulli aiunt maximum fieri sanguinis fluxum, ob vna fori intercostalium incisionem: sed non eo inficiens, aliquando, & præcipue in biliosis corporibus, succedere eiusmodi in cauitate sanguinis profusum quando inciditur vena aut arteria, quæ tamē scalpello Tab. II. Fig. I. facillimè enitari possunt. Sit læsa vena aut arteria intercostalis, quid refert? parum, aut nihil: sanguis enim ob vulnus inter ter-

hiam & quartam eostam recens factum, in cavitate thoracis retineri nequit; & si retineretur, sequenti die, dum obligabitur vulnus, iterum effluit. Aperto igitur thorace, de vulnere effluxit materia loturæ carnis similima, ad integram ferè libram: qua evacuata manifestè percepi pulsum, & vulnere turundam medicamentum ex albumine oui & pulvere adstringente Galeni oblitam, immisi. Vespero denuò religavi vulnus arte incisum, rursusque integram libram sanguinis cum tertia parte paris commixtam exemi: postea vulnere imposita fuit turunda ex linteo conuoluto parata, & digestiuo sequenti oblita:

℞. Olei Hyperici. ℥s.

Resina Terebinth. ʒij.

Mell. ros. colat ʒss.

M. F. digestiuum.

deſuper ceratum diapalmæ, linteum quadruplicatum ex vino rubro expressum, fasciæque conveniens.

Quarto die obligavi superiora vulnera, & ex laterali à me facto vitrum puris, quarta parte sanguinis, mixti extraxi. Circa labia vulneris novi apparuit inflammatio, propter quam ægro interdixi vinum, & præscripsi aquam hordeaceam pro potu ordinario. Pulsus manifestissimus fuit, & ex superioribus vulneribus purulenta materia, in paucissima quantitate, effluxit: Vnde patienti præscripsi sequentem syrupum, de quo singulis diebus, summo mane & vespere duabus horis ante cenam, Vncias quatuor aut quinque per os assumeret.

℞. Hordei decorticati. M. j.

folior. Fragar.

Vincæ per vinc.

Fol. Bugulæ.

Pimpinellæ.

Cichorei.

Farfara.

Pilosellæ.

Equiseti.

Verbenæ. ana M. ss.

Rad. Rub. Tinctur. ʒij.

liquiritiæ ʒj.

Aq. fontis. ℥vi.

vini albi ℥. ij. Bulliant ad consumptionem medietatis, & in fine decoctionis addantur mellis colati ʒij. M. pro syrnp. vulnerario.

Quinto die, per hoc effluxit denuò vitrum puris non nihil fetidi, magisque ad flauedinem, quàm ad albedinem tendentis. Ex utroque aneiqui vulneris foramine exiuit materia instar casei mucosa (vt in peripneumonicis sæpissimè vidi) at in pauca quantitate. Labia noui vulneris fuerunt luida, plagulæ ob magnam corporis impuritatem denigratæ, & febris solito maior facta.

Sexto die, mane & vesperi, effluxit vitrum dimidium puris, ob cuius maximum fetorem nemo in cubiculo manere potuit, sub plagulis quoque & splenijs humor verè melancholicus visus fuit, hinc sequens decoctum præscripsi.

℞. Scordi. M. j.

Mell. ros. colat. ℥. j.

Aq. comm. ℥. vj. coq. ad tertiæ partis consumptionem, & de colatura injiciatur integra libra per siphonem Tabul. XIII. Figur. II. delineatam. Post iniectionem immisi turundam præscripto digestiuo oblitam. Specillum argenteum puri immissum, & illico extractum, si nigrum fiat, ægrotum vix euasurum Hippocrates tradidit, Ego ad imitationem Hippocr. puri specillum immisi, quod cum nullam nigredinem contraxisset, sed albissimum permanisset, de restitutione bene speraui.

Septimo die, maiorem febrem, quàm diebus præteritis, habuit æger, pus etiam in magna quantitate effluxit, sed non adeò malum spirans odorem, vt die quinto & sexto.

Octauo die labia vulneris inter tertiam, & quartam costam facti inflammationem conceperunt, cuius causa patiens maiorem dolorem & febrem vehementiorem sensit.

Nono die, Fætor purulentæ materiæ euidenter remisit: Vesperi verò circa vulnus nouum adfuit Erysipelas, cum dilatatione foraminis & costæ tertiæ denudatione.

Decimo die vulnus artificiosè incisum adhuc latius comparuit, quam die præterito, cuius dilatationis causa meo iudicio fuit humor biliosus, qui acrimonia sua substantiam carnosam corrodit. Noctua circa costas spurias, insignem sensit dolorem propter erysipelas, arque neruum intercostalem, qui musculo abdominis descendenti inseritur.

Vndecimo die melius habuit, & tota nocte dormiuit; siphonem noluit admittere, ob dolorem membranæ, quæ succingit costas.

Duodecimo die tam magnum dolorem mane sustinuit, quàm pridie, vnde omissa turunda, vulnere tantummodo spongiæ parti-

particulam, decocto vulnerario expressam, imposui; nocte toto corpore bis sudavit.

Decimo tertio melius habuit, pus quoque album effluxit. *In his casibus nullam præstantius remedium, quam non purgare corpus, quia si exhiberetur purgans, omnes humores concurrevent ad intestina, & externuaretur corpus, cuius extenuationem mala sequerentur symptomata.*

Die decimo quarto tota nocte benè dorminit, pus etiam in pauca quantitate, per vulnus exiuit; vesperi verò illud in maiori quantitate exijt, & pulsus vehementior solito fuit deprehensus.

Die decimo quinto maiorem febrem habuit, quam die præterito: Quia æger in sinistro & sano porius, quam dextro & læso decubuit latere, vnde pus in thorace contentum febrem auxit. Vesperi vulncri laterali fuit imposita turunda, quia caro nimium crevit.

Decimo sexto patiens sumpsit ob amaritudinem oris, quam per quatuor circiter dies sensit, Rhabarb à quo medicamento quater biliosa egressit excrementa, deinde melius habuit.

Decimo septima præbui decoctum ordinarium. Vesperi pus album, in paucissima quantitate, exiuit, ob id decoctum per siphonem non fuit iniectum, vulneratus etiam non amplius rursus. Nocte bene dormiuit, febris verò nonnihil maior fuit die præterito.

Decimo octavo neque inieci decoctum, neque vulncri turundam imposui, sed solummodo plagulas vnguento de bethonica oblitus adhibui, de superque Ceratum Barbatum: pus ad viriditatem magis quam ad albedinem tetendit. Nocte dormiuit, sed habuit rixas per somnium, quæ significatunt prauorum humorum in corpore abundantiam.

Decimo nono tota nocte sudavit. Pus adhuc nonnihil viride fuit: quatuor horis ante prandium sumpsit Cassiam rec. extr. ʒjss. dissolutam in iusculo decoctionis cithorei, borraginis, pimpinellæ, & veronicæ, quæ ter ipsum purgavit; excrementa erant omnino biliosa.

Vigesimo die ʒss. puris exiuit, ob id vulncri arte factò, in turunda iterum dilatato imposui cannulam stanneam, cum spongiâ ex vino rubro expressâ. Vigesimo die, tota nocte non potuit dormire, quia cannula premebat costas, & membranam pleuræ.

Q

Vige-

Vigefimo primo nihi ex vulnere effluxit, nihilominus tamen can-
nula fuit vulneri impofita, vt heri. Deinde fumpfit flores caffie in
prædicto iufculo alterato diffo utas, vna cum puluere Rhab. Me-
choacæ nigæ, & Cremotis Tartari. In pofterum non fumpfit deco-
ctum vulnerarium, fed iufculum ex nonnullis herbis, *Cichorij fcili-*
cet, Borraginis, Sonchi, Fragaria & Vinca per-vino alteratum.

Die vigefimo tertio femel iniectum fuit decoctum vulnerarium, &
parum puris effluxit, quod quia adhuc nonnihil viride fuit, patiens
denudò vfus eft puluere fuo purgante.

Die vigefimo fexto, feptimo, & oétavo non amplius inieci deco-
ctum vulnerarium, femelque in die obligauimus vulnus, & febris
poft duos dies remifit.

Die vigefimo nono patiens fumpfit iufculum fuum alteratum: pus
fuit album, & patiens quafi extra periculum.

Die vigefimo fexto cum reuiferem vulnus, ex eo magna puris co-
pia effluxit, cum tumore labiorum, quod fignum fuit alicuius erro-
ris, quem in viçtus ratione commiferat: interrogatus refpondit, quod
comederit de prohibitis lacticinij, à quibus in pofterum abftinuit,
& breui feliciter reftitutus fuit.

OBSERVATIO XLIV.

Fiftula thoracis acutè pertufa.

Officialis quidam Cæfarianus Anno 1630. læthaliter fanciatus
fuit tribus digitis tranfuerfis infra clauiculam dextram, & Vl-
mæ in caupona aratro inſignita ferè curatus, ob errores in viçtus ra-
tione commiffos corripitur inflammatione, quæ fuppurata degene-
rauit in finum ſub cute latiffimum, cuius fundus ad oétauam vfque
coftam descendit, ita vt neque Chirurgus, neque Medicus materiam
in ſinu collectam expurgare potuerint, niſi ægrum quotidie in caput
pedibus furſum ſpectantibus collocarent. Cum autem ſinus conſo-
lidatio protraheretur, patiens quotidiana corporis conuerſione mul-
tum perturbatus, me ſibi ab hospite comendatū vocari iuſſit. Acce-
dens, te percepta, propoſui ſinus incifionem, quæ ſcolopomachæ-
rio peracta feliciffimè ſolet ſuccedere. Hac chirurgia non conceſſa,
modum excogitavi, quo citra ſinus incifionem materia facilem ac-
quirat exitum. Quapropter immiſſo per ſinus oriſicium, gentiana di-
latatum, inſtrumento Tabul. XIV. Figur. V. cuius apici globulus
ceteus erat affixus, inſcio patiente (credebat enim me ſinus quali-
tatem explorare) fundum citiffime perforavi, acumque detraxi:

Eua-

Evacuata per datam viam materia, vulneri inferiori indidit turundam integro ovo imbutam, super ori tinguento de bethonica infectam, apppositoque emplastro diapalmæ & luteo quadruplici, totum pectus Sostrati vinculo deligavi: Postea vulnus recens penicillo, ex tela incerata cauo, per aliquot dies apertum detinui, donec superius applicito cerato diuino consolidaretur, sinusque parietes mellierato optimè deterfi, spongia noua in vino rubro expressa, & fasciâ quam Galenus cataphractam Tabul. Vltim. S. appellat, arctè adhibita conglutinarentur. Sinu agglutinato, cannulam quotidie minui, tandem vlcus cicatrice obdixi. *Hic modus curandi optimè succedit, quando sanus nullum contraxerit callum; secus voto non respondet curatio.*

OBSERVATIO XLV.

Empyema thoracis apertione curatum.

ANno 1625. Nicolao Rohler, Ciui & nauæ Vlmensî apertius fuit thorax in dorso inter quartam à suprema costam cultro panario, qui pulmones læsit adeo, vt patiens statim, præter sanguinis sputum, de magna respirandi difficultate conquereretur. Prima læsionis hora accersitus, in cauitatem thoracis siphone inieci mixturam stegnoticam, & rurundâ apertum conseruaui vulnus. Ad virium instaurationem, & sanguinis compressionem præscripsi electuarium (cuius ingredientia videantur obseruat. 41.) & victum tenuem. Discedens adstantibus indicavi, patientem certò periturum; nisi inferius scalpello nouum vulnus quam primum pareretur. Adstantes recusarunt. Mane ipsi ægroto proposui paracentesin Hippocraticam, quæ statim in ipsam consensit, eaque mediante, alijsque remedijs non neglectis, felicissimè restitutus per annos aliquot integerrimè vixit.

OBSERVATIO XLVI.

Materia Empyematis diureticis euacuata.

ANno 1631. Valentinus Dettelbacher, Pistor Vlmensî, in diuersorio ad Solem sibi ipsi cultrum sub papilla sinistra in thoracis cauitatem adiecit, citrà tamen læsionem partium contentarum. Quapropter vulneri rurundam stegnotico committuni imbutam imposui, spleniumque in vino nigro austero expressum Sostrati

Q 2 . fasciâ

fascia alligavi. Quo facto clysterem laxativum injeci, & sanguinem è dextro brachio educi curavi. Deinde materia partim per vulnus, partim per vias vrinarias expurgata, plagam internis & externis inedicamentis multoties propositis, iniectionibus scilicet, vnguentis, emulsionibus & decoctionibus vulnerarijs consolidavi,

OBSERVATIO XLVII.

*Vulnus thoracis penetrans per septum transversum in
ventriculi fundum.*

ANno 1645. die 12. Aug. Melchior Frid, Fullo Vlmensis, ab hortulano quodam vulneratus fuit, non solum in capite & naso, de quorum curatione supra Tab. XXXII & Obseru. 22. dictum, verum etiam in thorace, quinque digitis transversis infra sinistram papillam. Vulnus capiti & naso insitum Chirurgus Elias Malther statim stegnoticis debite obligavit, & tertium in pectore inueniens me vocari iussit. Accedens, vulneris in thorace accepti qualitatem specillo exploraturus, in cauitatem peruenire non potui: *concidit enim vulnus, ob musculorum situm mutatum in quo patiens fuit latus.* Inter explorandi actum vulneratus euomit magnam sanguinis copiam, ita vt graui Syncope correptus, diuinis potius, quam humanis auxilijs indigere omnibus visus fuerit. *Hic vomitus mihi lationem ventriculi, & per consequens diaphragmatis in parte carnosae, atque perforationem pectoris indicauit.* Quare praedicto adstantibus vitae periculo, vulneri turundam stegnotico visitato imbuta imposui, & applicito linimento simplici thoracem Solstrati vinculo Tabul. XXXV III. Figur. VI. deligavi. Secunda die, hora quinta matutina, patiens denuò vomuit duas mensuras sanguinis mero diluti, & posthac omne id, quod ore assumptum deglutit. Quaesitum igitur fuit, cum plaga nasi, non in narium, cauitatem penetraret, ita vt sanguinis per palatum ad fauces, & ab ijs in ventriculum defluere potuisset, vnde sanguinis iste & ciborum vomitus proueniret? Quarentibus respondi, quamuis vulnus collapsum, specillo adhibito, introitum in thoracem non concedat, nec aliqua in abdomine plaga appareat, nihilominus tamen accidentia, lationi thoracis superuenientia, satis probare, gladiū per musculos intercostales, & diaphragmatis partem carnosam, (*nervosa enim substantia si laesa grauiora symptomata agrum infestarent,*) in ventriculum penetrasse. Perforatam pleuram significauit sanguinis in thoracis cauum fluxus, & multo magis indusi puritas: si namque thorax non fuisset apertus, san-

sanguis effluens, procul dubio, indusium rubicundissimo colore tinxisset. Nec obstat, quod patiens de nulla vnquam pectoris angustia aut tussi conquestus fuerit, sanguis enim dicta symptomata efficiens, per vulnus septi transversum defluxit in abdominis cavitatem, in qua suppuratus per anum tandem exijt. Ventriculi vulnus indicauit sanguinis & assumptorum vomitus, deiectus appetitus & dolor circa præcordia. His rationibus ego permotus, ventriculi solius rationem habui, reliquis vulneribus non neglectis. Quare potum & medicamenta consolidantia, in paucissima quantitate crebro exhibui, (*ne eorum copia vel distenderetur, vel ad vomitum irritaretur ventriculus*) & vires iniectis Clysteribus quotidie duobus ex iusculo nempe carniū pingui & viello oui paratis conseruaui: Potus fuit vinum granatorum, medicamentum verò conserua rosarum antiqua puluere mastichis permixta.

℞. Conf. ros. antiq. ℥iij.

Mastich. elect. subtr. pulu. ℥ss.

Syr. consol. maior. q.s.

M. in form. elect.

de quo, mane & vespere, sumpsit quantitatem nucis iuglandis. Externam ventriculi regionem inunxi oleis adstringentibus.

℞. Ol. rosati.

Mastich.

cydonior. ana ℥ss.

absynth. ℥iij.

M. ad ollam.

& vulnus sub papilla veluti simplex per secundam intentionem curauit. Septima decubitus die æger sedem habuit purulentam. Octaua in pectore vulnus fuit consolidatum.

Decimo quarto, & reliquis, æger ore assumpsit liquores consolidantes, eosque citra dolorem retinuit.

OBSERVATIO XLVIII.

Fistula thoracis exedentibus curata.

ANno 1643. Ioannes Iacobus VVolfius, Adolescens Heilbronnen-
sis, passus est in dextro thoracis latere tumorem durum, qui
ad suppurationem ductus, & malè curatus in fistulam degenerauit,
quam Chirurgi Heilbronneses veluti desperatam naturæ relique-
runt. Patiens Vlmam veniens, expetiit consilium & operam quam
etiam promisi. Præmissisq; vniuersalibus ad discendam fistulæ

Q 3

qua-

qualitatem, orificium angustissimum medulla sambuci vehementer contort. dilatavi, donec specillum rotundum Tab. VIII Fig. VI. admitteret, quo os asperum tetigi. Ad consumendum callum fistulæ immisi penicillum sequenti unguento imbutum,

℞ Pulv. semun. hyoscyam. ℥j.

Alum. vst.

Vitriol vst. ana ℥j.

But. in aq plant. lot. q.s.

M. F. Ung.

Extirpato callo, fistulæ turundam (cuius apicem decocto Diuino m& defunctū, euphorbio puluerizato aspersi reliquū verò unguento obliniui.

℞ Ung. de Bethon. ℥j.

Ægyptiac. simpl. ℥ss.

M. F. Ung. quod calli generationem prohibet

imposui, donec, post duos menses, costa squamulas aliquot protruserit: quibus exemptis, turundam quotidie minui, soloque bethonicae unguento infectam applicui, donec vlcus carne repletum, beneficio cerati diuini, induendam cicatricem requireret. His topicis æger, & vino medicato, pristinam sanitatem consecutus, Vlna discessit.

OBSERVATIO XLIX.

Vulnus thoracis scalpello dilatatum.

ANno 1631. Die 22. Nouembrijs I. hann. Georgius Rostnicker, Hippoporopæus Vlmensis in sinistro latere inter sextam & septimam thoracis costam accepit vulnus, quod sine partium internarum læsione penetrabat, angustissimum, ita, vt nullam turundam admitteret. Quapropter accersitus, illud statim dilatavi scalpello Tab. XII. Fig. I. seu Tab. XXXVII. Figur. V. E, quo sanguis in cavitatem prolapsus & pectoris angustiam efficiens conuenienter possit euacuari. Euacuato tantum, per vulnus, sanguinis, quantum vires oppressæ concedebant, vulnus imposui turundam ex lino crudo confectam, remedio sanguinem sistente infectam, filoque longo alligatam, & præmisso clystere laxatiuo, sanguinem è vena mediana sinistrij brachij Chirurgus eduxit. Sequentibus diebus, mane & vesperti, vulnus religavi, illique, immissa prius conuenienti sanguinis quantitate, turundam d' gestiuo sæpè iam proposito, imbutam immisi, donec, euacuata omni materia vulnus bonum coqueret pus. Vltimò plagæ adhibui cannulam ex lineo incerato cauam, & medicamento sarconico inunctam, quâ quotidie tenuiorem & breuiorem paravi, vsque dum Vulnus carne repletum cicatricem requireret, postmodum cerato diuino inductam.

OB-

OBSERVATIO L.

Aliud vulnus thoracis scalpello dilatatum.

ANno 1627. Die 5. Decemb. Barbitonfor Vdam N. ad me venit, & mihi nunciauit, Reuerendum Dominum Gallum Ochniker Parochum in pago Eingen, heri post cœnæ tempus, à milite quodam Cętariano, gladio læsum esse, duo vulnera accepisse, quorum vnum in dextra inferior. s. maxillæ parte, alterum in dorso propè vertebra, inter tertiam & quartam thoracis costam (*eo scilicet loco, quo Hipp. Paracentesin instituere solet*), lateris dextri in cauitatem penetrans, vsque ad lapreïnâ eiusdem lateris costam; paulò inferiùs, quam vbi clauicula summæ ossis sterni extremitati annectitur, cum læsione pulmonum & vasorum intercostalium, quam subsecuta hæc symptomata: Animi scilicet graue deliquium, magnâ respirationis difficultas, sudores frigidi, & dolores circa pectus maximi. Vulnus in dorso Barbitonfor obligauit, riuunda albumine oui oblita, falcemq; inter membranâ carnosâ & musculum, aniscalptorem dictum, imposita, adhibitoque desuper Emplastro stictico Crollij, vulgò Otichpslaster. Vulnus erat simplex in maxilla inferiore, cui adhibuit ceratum diapalmæ. Sequenti die inueni vulneratum cum magna respirationis difficultate, sæuissimis doloribus, tam in parte anteriore, quam posteriore thoracis, ob vasorum intercostalium læsionem. Vulnus, quod erat angustum, tentauit specillo obtuso, quo perueni in thoracis cauitatem, quod significauit, magnam sanguinis copiam in thorace fuisse collectam.

Quapropter statim ad sistendum sanguinis fluxum, siphone in capacitatem thoracis infudi sequentem mixturam:

℞. Pulu. adstring. Galen. ʒj.

chrysol. præp. ʒj.

Album. ouo. n. iij.

Aq. plantag. q. s.

M. Pro iniectione.

& vlneri imposui turundam filo alligatam, & spissiore stegnotico oblinitam, vt apertum conseruaretur: desuper applicui lintecum in vino rubro expressum, & fasciam, quam Softrati vinculum Tabul. XXXVIII. Figur. VI. appellant, ad detinendam turundam, & impediendam inflammationem.

Ad hæmorrhiam compescendam, & vires resciciendas vsus est Condito.

℞. Conseru. Symphit. ʒvj.

rosar. antiq. ʒj.

Troch. de terra ligill.

Q 4

Cha

Charab. ana ʒj.

Bol. armen. præp. ʒij.

Marg. præp. ʒß.

Sacch. ros. rab. &

Syrup. granat. ana q.s.

M. F. Conditum, de quo æger sæpius per diem sumat aliquam portionem.

Ad sitim leuandam præscripti iulepum refrigerantem & adstringentem.

℞. Syrup. Granat.

Myrtin. ana ʒjss.

Aq. Veronic.

Plantag.

Prunell.

Cichor. ana ʒiij.

Species diamarg. frig. ʒj.

Hora 5. post meridiem sumpsit grana aliquot laudani opiati cum Magisterijs, à quibus per quatuor horas placidè dormiuit: Die 3. ob infirmi ventris dolorem patiens admisit enema anodynum, & laxatiuum:

℞. Rad. Alth.

Tormentill. ana ʒß.

Herb. Malu.

Agrimon.

Veronic.

violar.

Flor. chamom. ana. M. j.

Semin. lini.

fænugr. ana ʒiv.

Anis.

fænicul. ana ʒjss.

Vuar. passar. ʒß.

Coq. in f. q. aq. font. ad ʒxx.

colaturæ adde

Mell. ros. sol. ʒiij.

Ol. violat. ʒjss.

M. pro Enemate,

à quo bis deiceir materiam biliosam & serosam. Post Enematis reiectiōnem, incisa fuit vena iecoraria lateris læsi, & eductus sanguis ad ʒiv. Hora 3. post meridiem, extraxi turundam, sed nihil effluxit, ob vulneris angustiam, quod scalpello dilatari Tab. XXXVII. Fig. V. E, ut materia in thorace collecta liberum haberet exitum. Post vulneris dila-

dilatationem ℥ j. sanguinis adeo calidi effluxit, ut profluens patientem magis videret, quam candela accensa. Sanguinis libra euacuata, thoraci inieci iterum mixturam venas, sanguinem fundentes, constringentem, & vulneri immisi turundam filo annexam, atque idoneo medicamento inquinatam. Ad dolorem pectoris mitigandum ordinaui vnguentum.

℞ Vnguent. pectoral. ℥ j.

Ol. amygdal. dulc.

Chamomill.

lumbricor. terr.

ana ℥ j s.

M. ad ollam.

Die 4. ob sanguinem in thorace contentum, maior fuit febris, quam diebus præteritis. Soluta Solstrati vinculo, & turunda extracta libra integra sanguinis, vesperi hora 7. iterum libra j. & semis effluxit. Circa 10 noctis horam sequentem assumpsit Emulsionem, à qua iterum tres horas dormiuit.

℞ Sem. mel. excort. ℥ j.

lactuc.

papau. alb. ana ℥ j.

Aq. Frag.

Pimpinell.

Veronic. ana ℥ iv.

F. Emuls. cui adde

Spec. diamarg. frig. ℥ j s.

Syrup. violat. ℥ ij.

M. pro duabus.

Ad difficultatem respirationis & dolorem pectoris (cuius causa erat magnus sanguinis effluxus) sæpissimè cochleare sumpsit de sequenti mixtura.

℞ Aq. Veronic. ℥ iij.

Pimpinell.

Cichor.

Plantag.

Ceras. nigr. ana ℥ ss.

Lapid. Bezoard. gr. viij.

Hæmatit. ℥ ss.

Terr. figill. ℥ j.

Gorrall. rubr.

Mag. Marg. ana ℥ ss.

Manus Christ. perl. ℥ ss.

M. ad vitrum

Quinto

Quinto die, religato vulnere, iterum ℥ j s. sanguinis effluxit; Respirationis facilior fuit quàm diebus præteritis, ob id præscripti decoctum vulnerarium.

℞. Hord. integr. p.ß.

Fol. Fragar.

Vincæ peruinæ.

Bugulæ.

Pimpinell.

Veronic.

Cichorei.

Farfar.

Pilosellæ.

Verbenæ.

Equiset. ana M.ß.

℞. ad. rub. rinct.

Torment. ana ʒ ß.

Liquirit. ʒ j.

Aq. fontis ℥ vj.

Vini alb. ℥ ij.

coquantur ad consumptionem medietatis & in fine ebull. adde mel. ros. colat ʒ ij s. Misc. & col. pro syrupo, de quo quotidie manè hora 7. ʒ iv. & vesperi hora 4. ʒ iij. sumpsit. Potus erat aqua hordei cum herbis vulnerarijs decocta. Die 7. aliquantulum melius habuit, & ℥ j. sanguis effluxit. Vesperi, ob dolorem circa regionem umbilici, injectus fuit clyster supra descriptus. Turundam vulnere immittendam obliniui digestiuo.

℞. Tereb. lot. in aq. plant. ʒ j. a.

Olei lumbr. terrest. ʒ j.

Vitell. oui num. j.

M. in form. linim.

Septimo die, pulsus fuit omnino equalis, & tam manè quam vesperi ʒ ix. puris sanguine mixti effluerunt.

Die 8. iterum ℥ j. puris sinceri effluxit, pateriens conquestus est de tussi, propter quam præscripti Eccelegma;

℞. Lohoch. de pulm. vulp.

Sani & exp. ana ʒ vj.

Syrup. de farf.

de ros. sicc.

Veronic. ana ʒ j.

Hyssop. ʒ j.

Pulu. Hyssop. ʒ j s.

Flor. Sulphur. ben. purg.

Tre.

Trochisc. de spodio ʒ j s.

M. & dentur, cum baculo liq.

Interim ob fætores puris, non fuerunt neglectæ iniectiones ex decocto scordi j. hord. & mel. ros. colat. Die 10. ʒ j. puris cocti ex thoracis cauitate fluxit, & æger melius habuit, quam die præterito. Die 11 per vulnus effluxit ʒ ss. puris optimè cocti, cum pulmonū aliquot particulis, in quibus asperæ arteriæ ramos euidentissimè inspicere licuit Die 12. & 13. pus effluens fuit coctum. Patiens propter tussim & amaritudinem oris, duabus horis ante prandium sumpsit seq. bolum.

℞ Flor. Cass. rec. extr. ʒ j.

Spec. diarmarg frig. ʒ ss.

Agaric. trochisc. ʒ ij.

Rhab. elect. ʒ j.

cum sacch f. bolus,

à quo ter quaterue deiecit. Die 14 melius habuit, quam diebus præteritis. Die 15. ʒ iv. puris fætidè effluerunt: quapropter cauitatem thoracis elui iniectione prædicta. Die 16. in minore pus quantitate exiit, neque fætor tam magnus fuit, vt die præterito. Die 17. vrina non fuit amplius biliosa, vt alias, ægro de tussi valdè conuergenti ordinari lambatum:

℞ Rad. Symp. decoct. contus. & cribro traj. ʒ ij.

Spec. diarrag. frig.

Succ. liquirit.

Sacch. penid. ana ʒ iv.

Syrup liquirit.

viol ana q. s. M.

Die 18. tussis, & fætor remisit, ita vt tota iniectio à calore non fuerit mutata. Die 19. æger bonè habuit, vrina quoque planè naturalis fuit. Die 20. æger conquestus est de dolore vulneris quod insperj. & inueni cannulam à carne optima extrusam: od id, & quia nihil materiæ effluxit, remouit cannulam, & imposui turundam vnguento de berthonica obliniram: & quotidie bis de hoc decocto in cauitatem thoracis siphone inieci, ad consolidandas, & corroborandas partes internas.

℞ Hord. integr. M ss.

Rad. conf. mior:

Torment. ana ʒ iv.

Herb. Veronic.

Pimpinell.

Pilosell.

Achimill.

Consolid. Sarac.

Bugu,

Bugulæ.

Verben.

Equiset.

Vincæ per vinc.

Fragar.

Scord.ana M. ß.

Semin.cichor. ʒ ß.

Aq.font. ℥ vj.

Vini alb. ℥ i.

coq.ad tert. part. consumptionem,in fin.add.

Mell.ros.col. ʒ js.

M. Pro iuicctione.

Die 36. vulnus omnino consolidatum fuit, & patiens pristinæ sanitati restitutus,in publicum prodijt.

OBSERVATIO LI.

Empyematis per diuretica felix curatio.

ANNO 1638. die 24. Iunij, Diui Iohannis Baptiste, hora 7. vespertina, Dominus *Iohannes Maschke*, Capitaneus benè potus, in monomachia vulneratus est à Domino de Orien, legato seu vicario militum, in dextro musculo pectorali, duorum transuersorum digitorum infra claviculam, vulnere penetrante(per venam cephalicam & thoracicam,) in capacitatē thoracis, cum insigni hæmorrhagia, animi deliquio, cōuulsione, stertore, sudore frigido & *æqvælia*, & risu Sardonico. Et sic ultra dimidiam horam sine sensu & motu iacuit. In quo periculoso casu, ob prædicta symptomata, patienti & coniugi & filiæ charissimis dixi, hæc esse præludia mortis. In mentem mihi venit Aphorif. Hipp. 9. sect. 7. A sanguinis profluuiio desipientia, aut etiam conuulsio, malum. Nihilominus tamen hæc medicamenta sunt adhibita.

℞. Aq. Ceras. nig. ʒ iv.

Spir. Cephal. Auh. ʒ j.

Lapid. Bez. ʒ j.

Coral. rub. præp. ʒ js.

Lapid. Chrysol. præp. ʒ j.

Sacch. perlat. ʒ ß.

reūulsionis gratia ano iudutum fuit acre suppositoriū, naribus verò & pulsibus admota aqua odorifera Fuschij & acetum rutaceum. Vulnus rurunda ex lino crudo confecta, oui albumine imbuta, puluereq; Regnotico aspersa, linteo in vino rubro expresso, & fascia ad clavicu-

lata

Iam Galeni obligavi. Et sic deligatus totam noctem quietè tranſegit, & crapulam edormiuit. Secundò, ob anguſtiam dextri lateris, & dolore circa diaphragmatis regionem, aperta fuit vena mediana eiufdem lateris, & emiſſus ſanguis ad vncias quatuor. Veſperi, ob ardorem vrinæ, ſumpſit dimidiam partem emulſionis;

℞. Sem. Melon. ʒ j.

Aq. Pimpinell.

Fragariæ.

Veronicæ ana ʒ iij s.

Careſ. nig. ʒ ij.

Corall. rub. præp. ʒ j s.

Marg. præp. ʒ j.

Lapid. Chryſ. præp. ʒ s.

Sacch. cand. & Syr. viol. ſimp. ana ʒ j.

M. pro emulſione.

Plagæ impoſui turundam digeſtiuò oblitam (quod conſtabat ex vitello oui, Terebinthina lota in aqua roſarum,) & puluere Lapid. Chryſ. præp. aſperſam: deinde appoſito ſplenio in vino rubro calidè expreſſo ſcſciam dictam Galeni abhibui. Tertio die aluus mota eſt ſequenti clyſtere:

℞. Herb. Malu.

Violariæ.

Parietariz.

Veronicæ.

Flor. Chamom.

Maluæ ana M. s.

Sem. Lini ʒ iv.

Melon.

Citrini ana ʒ iij.

Coel. in ſuffic. q. aquæ ad ʒ ix. colat. adde.

Mell. viol. ſol. ʒ ij.

Elect. Lenit. ʒ j.

Olei violat.

Chamom. ana ʒ js. M. F. Clyſter.

à quo quater deiecit. Vulnus tractaui propter fluxum ſanguinis medicamento ſtegnotico (quod ex albumine oui, Lapid. Chryſ. præp. & pulu. adſtr. Gal. paratum erat) & æger ob animi deliquium, ſæpius per diem grana aliquot de conſectiõne Alkermes ſumpſit, à qua melius habuit.

Veſperi, poſt emulſionis uſum, conqueſtus de ardore vrinæ, inde vitro exceptæ, in cuius fundo purulenta materia apparuit. Dolor & grauitas circa diaphragmatis & hepatis regionem deſiſit, & totam noctem

noctem placidè dormiuit . Die 4 propter absentiam febris , & quia materia in capacitate thoracis ad vrinarias vias tenderet, operæ præstium duxi præscribere decoctum vulnerarium :

℞. Cineris Astacor. fluu. M. j s.

Herb. Pimpinell.

Vincæ peruinçæ.

Veronicæ anæ M. ij.

Aq. Fragariæ ℥ j.

Vini Oligoph. ℥ vij.

bulliant ad tertiam consumptionem , addend. in fine Mell. ros. col. ℥ ij.

Hoc decoctum mane & vesperi mixtum fuit emulsioni, quod misceificè sanguinem in thorace contentum ad vias vrinarias deduxit . Ex vulnere sanguis fluxit grumulosus , quapropter cauitati thoracis decoctum adstringens & consolidans per siphonem inieci, quod describitur obseruatione 30.

Deinde vulnere cannulam, ex linteo & cera flaua confectam, imposui . Desuper ceratum diapalmæ, & spongiam in vino rubro expressam cum fascia adhibui. Die 5. & 6. æger iterum melius habuit. Die 7. verò nihil dormiuit , & conquestus est de dolore vulneris & totius lateris . Inspecto vulnere cannula siue turunda , ex linteo incerato caua , extra vulnus posita erat, vnde materia in pectore contenta, & dolorem excitans, non habebat exitum . Euacuata materia remisit dolor , sed patiens conquestus est de oris amaritudine , propter quam præscripsi syrup.

℞. Mannel. ℥ j s.

Extr. Rhab. 3 j.

Cremoris Tart. 3 ij.

Aq. Veronicæ q. s.

M.F. Syrup. liquid.

à quo ter dieiecit materiam biliosam. Vesperi cum dolor in partibus pectoris superioribus & inferioribus, hoc est, circa vulnus, hepatis & diaphragmatis regionem remisisset , inspexi nus & tetigimus infimum ventrem , qui stribus erat distensus . Quare vsus est præscripto Enemate , quod ipsi optime conduxit ; & inde tota nocte ad nutum dormiuit . Die 8. vrina erat turbida & catarrhosa, vnde hesternus dolor à defluxione capitis potius, quam ab ipso vulnere originè traxisse videtur. Die 9. vsus est Emulsione cum decocto vulnerario: Vulnus obligatum fuit vti præteritis diebus, nisi quod sola turunda perforata oblita erat digestino antea præscripto , & aspersa puluere ex Aloe, Thure, lap. Chrysolito, prius decocto vulnerario per siphonem iniecto: Die 10. 11. 12. & 13. optimè valebat. Die 15. Vrina fuit clara.

clara, & tota nocte optimè quieuit. Ex vulnere fluxit pus bonum & album: idcò cannulam, seu turundam ex linteo incerato cannulatam, extraxi, eamque vnguento de bethonica oblinitam imposui. Die 16. surrexit & paulisper ambulauit, & nonnihil puris albi & cocti ex vulnere fluxit. Vesperis vsus est decocto vulnerario, & emulsione similium Melonum. Die 17. & 18. iterum benè habuit, & ex vulnere, nihil, aut parum materiæ exiuit. Quapropter extraxi turundam, & filamenta carpta & ceratum diapalma imposui, & spongiam nouam ex vino rubro expressam superligauì. Die 20. & 22. vulnus cicatrice obduxi.

OBSERVATIO LII.

Cancer mamilla exulceratus scalpello abscissus.

Religiosissima Domina Anna Sibylla, Abbatissa Vrspringensis, 47. circiter annorum, temperamenti calidi & parum siccì, ante quinque annos, ex mensium suppressione laborare cœpit, ex qua in mamma sinistra tuberculum ipsi ortum est durum, nigrum & dolorosum, ita vt barbitonsoris opem implorare cogeretur, qui tuberculi istius durtiem, non intellectà causà, emollientibus, & humectantibus resolvere conatus est, sed hac ratione, non modò non opem tulit, verùm potius miseram mulierem in maiorem calamitatem præcipitauit: Scimus enim ex nostro Sennerto, cancerum emollientibus tractatum exasperari. Dum his emollientibus tuberculum non cessit, Balneator illius excisionem proponit, & dum secat, ac mammam cruore manantem videt, lepore timidior aufugit, & cruentam ferèque mortuam Abbatissam dereliquit, ita, vt, propter balneatoris aufugium, sorores monasterij præ anxietate fuerint coactæ, sanguinem fluentem sistere, & ægram aq. corroborantibus reficere. Ab hac incisione integra mamma exulcerari cæpit, & in horrendam magnitudinem excreuit, cum fœtore, ac si acetum cum carne mixtum esset, febre propter viciniam cordis ingenti, & acutissimo dolore, quem in longius perferre non potuisset. Scfflingam venit & meum & Clariss. viri D.D. Iohan. Reguli Villingeri, Amnis mei plurimùm honorandi, consilium & auxilium implorauit. Nos primo intuitu & visitatione malum, ex odore, tumore, & ortu, iudicauimus esse cancerum, cui cum aliter, nisi totius mammæ abscissione, mederi non possit, de hac Abbatissam admonuimus, vt illam cum forti animo & spe certissimæ salutis, (cum radices profundas nondam habuerit, & tempus menstruorum iam præter lapsum fuerit) sustineret,

Qua

Qua igitur consensiente, mammam exulceratam, ob summum fetorem, putredinem & dolorem, laui decocto Iuino, ipsi puluerem ex alumine vsto, tutia præpar. lapide chrysoliro, & scordio paratum inspersi, & de super ceratum oxelæum linimento simplici mixtum;

℞. Cerati oxelæi.

Linimenti simpl. ana ℥ ʒ.

Ol. martin. ʒ ij. M. in mortario plumbeo.

Linimenti simplicis descriptio.

℞ Succ. Solatr. rec. ex pr.

Ol. ros. ana ℥ xx.

coq. secund. art. ad consumptionem succi, colaturæ adde

Litharg. aurei.

Cerul. ana ℥ j.

Misc. sec. art. in formam Ung.

Ceratum verò oxelæum paratur à sequentibus.

℞. Ol. comm. verust. ℥ j.

Acet. vin acerr.

Litharg. aur. ana ℥ ss.

Misceantur ad ignem lentum, donec cerati consistentiam acquirant.)

applicui. Præscripsimus vinum laxatiuum ex hydragogis & melanagogis, quo corpus per Epicrasin à vitiosis humoribus expurgaretur. Dein Domine Abbatissæ secta fuit vena mediana brachij sinistri, ac emissus sanguis in paucissima quantitate, cum modo in finem, ut eius substantiam & qualitates inspicere queamus: fuit autem sanguis adhuc serosus & semiputridus, absque omni ferè fibrarum concretione. Qua propter vsa est condito ex Trochisc. viperinis.

℞. Conseruæ Boraginis ℥ jss.

Trochisc. de viperis ʒ iv.

Syrup. corall. q. s. F. condit.

ut materia serosa & maligna à centro ad circumferentiam duceretur. A dictorum remediorum diligentissimo vsu patiens melius habuit, fetorque cum putredine omnino cessauit.

Sic præparato & purgato corpore, Domina Abbatisa, mammæ abscissionem instanter rogauit: vnde, ne longiore procrastinatione vlcus profundiora peteret, Anno 1641. die 25. Iunij omnia ad operationem necessaria præparauit, & sequenti die sectionem ita instituit. Exhibira patienti potiuncula ex confect. AlKerm. aquis cordialibus & cinamomi, ad Chirurgiam perueni; Ersi in totius mammæ abscissione accipienda sit acus oblonga, anceps, acutissima, duo fila trahens & traijcienda in infima mammillæ basi; deinde fila

utrin-

utrinque alliganda & contringenda firmiter ; ac fi non fufficiat ,
trafmittenda alia acus fit , & fimiliter fila liganda , vt ex Tabul.
XXXIIX. Fig. I. patet; ad euitandum tamen maximum dolorem ,
qui ex duplici acus traiectione vboritur , ego (fretus cognitione ana-
tomica) fine transmissione acuum mammam nouo vinculo, varijs ca-
pitibus donato, quod excogitauī, ligatam, in circumferentia tumoris
crofi atramento fcriptorio notauī, hinc vnico traftu , mamillam ,
acutiffimo fealpello, à mufculo pectorali radicitus, (*ne mihi accide-
ret, quod poft hac cuidam lithotomo eueniffi fequens §4. obferuatio
docet,*) abftuli, & hæmorrhogiam non ftatim ftiti, fed poftquam
omnis fanguis atrabilarius & aduftus, ex venis promixis effluxerit :
quare venas & arterias, faltem corroborandi gratia, cauterio ignito
leuiter inuifi, deinde loco affecto puluerem adstringentem Galeni ,
& lapidis Chryfoliti præparati albumine oui conquaffato exceptum,
& filamentis carptis illinitum impofui, & deligatura, quam Galenus
& alij Græci Autores cataphractam appellant, commode firmaui.
Die 27. Iunij, fanguinis fluxu fubfiftente, mammæ decurtatæ dige-
ftuum non adhibui, fed ceratum diuinum, ob partis humiditatem .
Die 28. nullus aderat dolor, nullumque inflammationis fignum, ni-
hilominus tamen 29. fumpfit haufum vini laxatiui, & 30. portionem
de condito viperino, ad vitioforum humorum reliquias educendas,
& diffipandas . Trigelimo Iunij, Vlram vefta, vfque ad 4. Augufti
optimè patiens habuit, & nunquam conquæfta eft de villo fympto-
mate . Die fexto obferuauī aliquot carunculas albas in mamma, &
interrogauī Dominam Abbatiffam , an errorem in viçtus ratione
commiferit ? refpondit, fe iuffu œconomæ haufum vini, quod ta-
men interdictum fuit, bibiffe . Die 8. fuit vox afpera, & ftatim mihi
in mentem venit Hippocratis dictum, libr. de glandulis. Quibus per
morbum aut aliam quandam calamitatem manima aufertur, vox fe-
rox efficitur . Die 9. iterum vfa eft vino laxatiuo cum manna per-
mixto, ob conftipationem alui. Die 13. cum animi gratia, goffipinas
chirothecas acn texeret, inferiorem mammæ partem, ob continuum
brachij motum, herpes miliaris corripuit : Quapropter huiusmodi
exercitium interdiximus, & patienti præfcripimus vinum medica-
tum, vt materia biliofa & acris à circumferentia ad centrum, & ab
hoc extra corpus moueretur. Die 14. Augufti, ne huiusmodi humo-
res acres in principales corporis partes incurrerent, ipfi fonticulum
paraui, reuulfionis gratia, in finiftro pede fupra genu, & brachio de-
xtero. Die 16. ob fummum æris calorem, maximumque herpetis pru-
ritum, facta eft excrefcencia carnis, vnde per os fumpfit Syrupum .

R

Syrup.

R. Syrup. ros. fol. ʒij.

Extract. Rhab. ʒiij ʒ.

Diacarth. ʒij.

Mag. Tartar. ʒj.

Aq. Cichor. q. s. pro Syrup.

liquido.

à quo per nouem vices copiosissimam bilem egressit : Excrecentiæ carnis pulvisculum ex Tutia & lapid. chrysol. præp. ana ʒj. & alum. Roch. ʒiij. paratum, & filamentis carptis aspersum, applicui, & Herpeti miliari ob insignem pruritus, post somentum ex decocto malux & aq. fluuiali ceratum citrinum apposui: à quorum remediorum vsu excrecentia fuit consumpta & herpes miliaris, cum suo pruritu, omnino euauit Die 7. Septembris, uterque foniculus suum officium fecit: à nono vsque ad 15. pilulas Aloeticas Hieron. Fabric. ab Aquap. vsurpauit, propter dolorem Capitis & pigritiem alui, & postea optime valuit cicatrice parti affectæ obducta. Die 28. Septembris, ipsi secta fuit vena pro exploratione sanguinis, qui bonus & rubicundus, absque omni putredine erat. Die 6. Octobris, lætissima & sanissima Vlma discessit.

OBSERVATIO LIII.

Vulnus Sclopeti in inguine & pene curatum.

ANno 1633. Mense Iulio N. N. vexillifer equitum in duello vulneratus fuit, sclopeti globulo, in femore dextro prope inguen, meatu vrinario & cruce sinistro. Globulus namque membri virilis radicem perforans, & per meatus vrinarij longitudinem excurrrens, sinistrum etiam læsit crus. Tertia lèsionis die vocatus, ægri (qui de insigni meatus vrinarij laceratione, penisque inflammatione, & priapismo conuulsus est) aluum subdixi, propter gangrenæ metum, clystere leniente: & ordinato tenui victu (qui in præcauendis & curandis quibuscunque inflammationibus plurimum valet) vulneribus inguinis dexteri, penis, atque cruris sinistri oleum violatum aquis cardui benedicti & malux septies locum, & parua quantitate mellis rosati colati permixtum, per siphonem inieci, & turundas eodem medicamento oblinitas imposui, desuper vnguentum linimenti simplicis & cataplasma ex farina hordei & fabarum, mica panis, oxymellite simplici, oleoque rosato & violato compositum adhibui, atque partes læsas conuenienti fascia deligavi.

Die 4. ob insignem inflammationem penis & febrem, barbiton,

sof

for incidit venam iecorariam dextri cubiti, & ꝑvj. sanguinis emittit. Post prandium eiusdem diei aperuit venam Saphenam dextri pedis, & ꝑv. sanguinis eduxit. Vesperti ob insignem penis dolorem, & semi suppressionem urinz, vsus est hac emulsione.

℞. Semin. Melon. 3 vj.
Lactuc.
Papau alb. ana 3j.
Agni casti ʒij.
Aqu. Nymph.
Fragar.
Acetosæ ana ʒiij.
F Emulsio, cui adde
Syrup. viol. ʒss. M.

Die 5. conquestus est de maximo inter mingendum dolore, & eschara tam in meatu urinario, quam in reliquis vulneribus separari cepit. Ob id per siphonem inieci sequentem mixturam.

℞. Aq. Rosar.
Malu.
Carduib. ana ʒij.
Boli arm præp.
C.c. vlt. præp. ana ʒj.
Lapid. chrys. præp (ob sanguinis fluxum) ʒjs.
Olei violati ʒj. M.

Vulneri meatus urinarij, loco turundæ, immisi, per glandis orificium, catheterem aureum Tabul. XII. Fig. XIV. linteo obductum, & linimento simplici oblitum: inguinibus oleo rosato inunctis adhibui lanam succidam, lumbosque hoc vnguento obliniri iussi.

℞. Vng. infrigid. Gal. ʒij.
Comitiss. ʒß.
Ol. ros. ʒij. M.

Die 6. propter meatus urinarij obstructionem ab escharæ particula patiens urinam per glandis orificium reddere nequit: quæ propter ipsam vossellæ dentibus apprehendi, & foras extrahi. Die 7. dolor remisit, ægerque paulo melius habuit, quam diebus præteritis. Die 8. patiens bibit vinum, & lusit cum ancillis. Vesperti conquestus est de priapismo, & inflammatorio penis dolore. Propterea, & ob sanguinis profusionem, æger vsus est sua Euemate & emulsione: Lumbos inunxi vnguento adstringente, denique inieci mixturam, & meatui urinario imposui fistulam

R 2 modò

modò citatam, linteò obductam & linimento simplici oblinitam. Vulneri cruris & inguinis, post iniectionem, oleum violarum & rosatum adhibui. Die 9. propter inflammationem adhuc durantem, iterum secta est vena saphena sinistri pedis, omniaque medicamenta fuerunt apposita, quæ die præterito. Die 10. æger melius habuit, escharaque ablata, meatui urinario per siphonem inieci liquorem sequentem:

℞. Aq. Plantag.
Prunell.
Rosar.
Carduib. ana ʒj.
Tutiz præp. ʒij.
Lapid. hæmatitid. ʒj.
Bol. armen. præp. ʒjs.

Vulnus inguinis & crucis digerentibus, detergentibus, sarcoticis & epuloticis tractavi. Die 11. totam diem & noctem sine omni dolore & molestia transegit. Die 12. ob ventris constipationem assumpsit boles.

℞. Flor. cals. rec. extract. ʒj.
Mann. elect. ʒij.
Pulu. liquirit. ʒj.
Sacch. albiss. q.s. F. Bol.

à quibus quater deiecit. Die 13. ob Gonorrhæam non virulentam, præscripsi conditum:

℞. Conseru. Malu.
Violar.
Fl. cichor.
Semin. Agni cast. ʒjs.
Lactuc. ʒj.
Papau. alb. ʒiiij.
Syrup. papau. q.s. Misce.
F. Cond.

De quo mane, & vespere ante introitum lecti, & emulsionis vsum, magnitudinem nucis castaneæ assumpsit. Die 14. viscidam quædam materia penis meatum propè glandem ita obstruxit, ut urina per vulnus inguinis efflueret. Quapropter particulam viscidam volsellâ extraxi, & fistulam linimento simplici obductam, post liquoris postremo præscripti iniectionem, meatui immisi, & ne excidat, filo alligavi. Die 15. 16. 17. 18. & 19. ab usu medicamentorum optime habuit; & pus album, leue, arque æquale, in paucissima quantitate, è vulnere effluxit, quibus incepit caro rubi-

rubicundissima incrementum. Die 22. & 23. loco canaliculi Tabul. XII. Fig. XVI. candelam ceream cerato diuino obliniui, eaque imposita meatum vrinarium consolidavi. Interea tamen semper vsus est victu non admodum crasso, & refrigerante emulsione. Die 27. meatus vrinarius consolidatus, vlneraque externa, crucis & inguinis, ad cicatricem ducta fuerunt.

OBSERVATIO LIV.

Cancer mamilla malè incisus.

ANno 1643. Die 9. Decembris, Inclyti Senatus decreto, cum chirurgis Georgio Riedlin & Ioann. Georgio Bauler visitavi Marthæ N. charissimam conjugem, quæ sinistro brachio maxime dolens nobis retulit, quod Lithotomus N. N. ipsi tertia post partum septimana, canctum mamillæ sinistræ occultum, in præsentia cuiusdam Medici Vlmæ, citra antecedentis causæ præparationem, & euacuationem, nouacula absciderit, duosque tumores sub axilla insignes quidem, musculis tamen non adherentes, ropicis resoluendos reliquerit. Elapsis duodecim diebus tumor anterior chirurgus apposuit causticum ex arsenico paratum, quod eum radicitus non exedit, sed tantos dolores excitauit, ut humores è toto adcurrentes brachium enormiter distenderent. Rebus ita habentibus, adstantibus & marito significauimus, miseram mulierem neque ferro neque medicamentis restitui posse, sed ob relictos tumores certò perituram; quod etiam breui euenit, vires enim doloribus exhausti nulla purgantia concesserunt, neque dolores vilo medicamento anodyno mitigari potuerunt. Malè itaque fecit tam Medicus, quàm Lithotomus. I. quod canceri curam tempore puerperij, quo corpus ab atrabilijs humoribus expurgare non licuit, aggressi fuerint. II. quod malum non radicitus ferro extirparint, (ignorantes Hippoc. Aphorism. 13. sect. 12. quæ in morbis relinquuntur, reciduas facere consueverunt) sed potius arsenico periculoso retractisque vteri purgamentis exasperarint. III. quod peritam curationem Anatomix peritis (quæ præmissis vniuersalibus, tumores haud profundè radicales citra vasorum læsionem aut recidivæ periculum excidere potuissent) non commiserint, excusantes se Hippoc. Aphorism. 38. sect. 6. quibus occulti canceri fiunt, non curari melius: curati enim citius intereunt, non curati verò longius vitam trahunt.

OBSERVATIO LV.

Cancer mamma patiens & oculis medicamentis resolvens.

ANno 1634 Mense Septembri Barbara Döhleren, villica Berma-
ngensis, mihi monstravit in sinistra mamma tumorem, qui à
suppressis mensibus subortus, nullis remedijs, sed sola secti-
one extir-
pari posse videbatur. Hiebat enim omnia cancri signa, duritiem
scilicet, dolorem acutum, rotunditatem, inæqualitatem, humiditatem,
calorem, vasorumque nigricantium protuberantiam. Proposi-
tam chirurgiam pariens recusavit; cancrumque medicamentis ex-
ternis attingere prohibuit Amatus Lusitanus. Nihilominus tamen,
quoniam quosdam novi, qui selectorum remediorum usu, à
canceris occultis fuerunt liberati, patienti exhibui potionem me-
langogam:

℞. Confect. Hamech. ʒvj.

Extract. hell. nig. ʒj.

Crem. Tart. ʒ℥.

Decoct. fl. & fr. q. s. M.

& doloribus dorso ingruentibus ʒvj. sanguinis, è vena saphena si-
nistri pedis, eduxi. Hoc facto, corpus ab humoribus atrabilarijs quasi
tinctum, decocto Magistrali Tabul. Vltima sub litt. Æ. proposito ex-
purgavi, deinde post exquisitam corporis expurgationem, mamillæ
applicui ceratum Ioannis Preuotij:

℞. Farin. mil ʒij.

Ol. ros. compl. in mort. plumb. duct. ʒj.

Plumb. crud. pulu. ʒ℥.

Pulu. virg. aureæ.

Sonch.

Solan. ana ʒij.

Ceræ nou. ʒxxxij.

Resin. Pin. ʒx.

M. F. Ceratum.

quod, trimestri spatio, tumorem insensibiliter resoluit. Interim,
cum menses per biennium suppressi, medicamentis exhibitis pro-
moueri non potuissent, patienti in vtraque femoris parte inter-
na, inussi fonticulum, ea intentione, vt inter curandum mate-
ria peccans ad inferiora reuelleretur, quos, tumore resoluti, per
annum apertos detinuit, ne humores, in corpore denuo collecti,
aliam partem vel externam vel internam offenderent. Anno e-
lapso, mulier infelix, quæ sibi ipsi sanissima videbatur, fonticulos

con-

consolidauit, & exin de nouo tumore in mamma dextra conqueri cœpit, quo, per ferrum, radicitus extirpato, repetijt decocti vsum, & fonticulos renouauit, quos ad vitæ terminum conseruare iussi: quod vtrum fecerit, nescio.

OBSERVATIO LVI.

Dolores cancri mitigantur.

Charissima Petri Deilbrouners coniux, in dextra mamma habuit canerum paruum & occultum, in sinistra magnum & exulceratum. Occultum, finito decocti magistralis vstu, ceratum oxelæum in mortario plumbeo circumductum minuit, exulcerari verò dolores atrocissimos præstantissimum cancri anodynum mixtura scilicet ex linimento simplici, cerato oxelæo, & oleo myrtino ad orbitum vsque mitigauit. Eadem patiens singulis annis conquesta est de molestissima intertigrine ilium, quam caustauit obesitas nimia. Huic enim inter deambulandum, præsertim in ætate, sudante corpore, partes modo dictæ fuerunt collisæ, attritæ, excoriatæ, & inflammatæ. Hanc excoriationem ipsa patiens crebra per diem lotionibus aque dulcis, in qua decocta fuerat herba maluæ, & euphorisi inspectione pulueris, bidui spatio curauit.

℞. Flor. Balaust.

Rosar. rubr.

Santal. rubr. ada ʒiij.

camphor. ʒjss. M. F. Puluis

qui etiam infantum phlogosin & excoriationem, ab acriusculo lacte prouenientem, quàm citissimè sanat.

OBSERVATIO LVII.

Exulceratio pectoris, eiusque dolor fonticulo in femores mitigatus.

Nauta quidam octogenarius, conqueustus est de insigni angustia, vehementissimo dolore, ac pustulis in dextro pectoris latere subortis, quibus exulceratis dolor & angustia recessit. Patiens accersuit chirurgum, ipsumque etiam atque etiam rogauit, vt vlcuscula illa sibi satis molesta consolidaret. Vlceribus cicatrice denuo obductis, redijt dolor & angustia circa pectus, ita vt æger multas septimanas insomnes habuerit. Rebus ita stantibus, in consilium vocatus interrogavi senem, an vlcera in pedibus diuturna habnerit? Ad hæc respondit se, per integrum decennium, vlcus maximum in tibia

de extra, sine motus impedimento, circumgetitallè, & ab eo tempore, quo illud sanatur, primò angustiam, secundò dolorem, terriò pustulas, & tandem pectoris vlcuscula percepisse. Ad humores igitur reuellendos, in femore tibiæ prius exulceratæ fonticulum paravi instrumento Iulij Casserij Placentini, cui altera die successit aliqualis inflammatio, cuius ratione patientem de recuperanda salute sperare iussî Escharâ ablata, fonticuloque suum officium faciente, dolor pectoris & respirandi difficultas paulatim remisit, ita ut æger triginta diebus spatio à dictis symptomatibus liberrimus euaserit, & per multos abhinc dies senili gauisus sauitate, citra vllum obstaculum negotia sua obierit. Ex his chirurgiæ tyrones vt discant volo, quanto cum periculo vlcera diuturna, in senibus præsertim, consolidentur, & quanta cum utilitate fonticuli femoris patti domesticæ inurantur, si vel ex errore patieris, aut chirurgi cuiusmodi vlcera, quæ totum corpus ab impuritatibus euacuant, cicatrice obducantur.

OBSERVATIO LVIII.

Vulnus sclopeti in dorso.

ANno 1644. die 27. Ianuarij, hora 3. post meridiem, *Balthaserus Oseiger*, rusticus Gegglingensis, cum vxorem suam Vlmâ domum vehere voluisset, miles quidam, bene potus & temulentus, scloperum eiaculauit, & vnica vice non solum villanum, sed etiam eius vxorem ita grauer læsit, vt Vlmam reduci fuerint coacti, vbi vulnere vsque in sequentem diem obligauit chirurgus. Die 28. Ianuarij, propter insignem vulnrum dolorem, à molitore patientis, in subsidium vocatus, villanum tribus globulis læsum inueni, quorum primus circa futuram occipitis lambdoidem obliquè inhæsit. Secundus circa octauam thoracis costam fuit extractus: tertius vcrò, paulum supra os sacrum, ita fuit immersus, vt nullo modo extrahi potuisset. Ob id vulnus occipitis filamentis carptis nonnihil dilatauimus. vulnus autem thoracis, cum ferè nullius esset momenti, tractauimus vt simplex. Vulnus propè os sacrum, vchementissimèque dolens, inflammationem adeò insignem causauit, vt etiam partes obscœnas corripere. Huic, propter sanguinis effluxum, per siphonem iniecimus albumen oui, spatula agitatam, pulueremque adstringentem Galeni, ac Lapid. Chrysolit. præp. cum aqua Plantaginis. Reuulsionis gratia adhibitum fuit Enema refrigerans, & emissus sanguis è vena brachij dextræ mediana. Vesperis æger sumpsit non solum ali. quot cochlearia de aqua cordiali:

R. Aq. cera. nigr.

Pimpinell.

Ros.

Ros. ana ʒ j.

Cinam. ʒ ii j.

Spirit. Cæphal. Anh. ʒ ijs.

Corall. rub. præp. ʒ is.

Lapid. chryl. præp. ʒ ss.

Manus Christ. perl. ʒ iv.

M. ad vitrum.

Verum etiam syrupum refrigerantem:

℞. Syrup. acetos. simp. ʒ j.

Acetos. citr. ʒ ss.

Aq. Endiu. ʒ ij.

Nymph. ʒ j.

Pulu. Marg. præp. ʒ ss.

M. pro dosib. j.

Villani coniu x quinque globulis fuit læsa, quorum vnus infra sinistram aurem intrauit, & sub cute repens citca os inferioris maxillæ exijt, secundus, tertius, & quartus in dorso inter scapulas hæsit, quintus verò intrauit citca internam humeri partem, & exijt circa flexuram cubiti. Vulneta circa os maxillæ, & inter scapulas, tractauimus vt simplicia, illud verò, quod erat in cubito, vt compositum. Itaque ob insignem totius brachij inflammationem, vulneri turundas sequenti digestiuo.

℞. Resin. Tereb. lot. in aq. plant. ʒ i.

Olei lumbr. terrest. ʒ j.

Vitell. oui patum. M.

Pro digestiuo.

oblinitas imposuimus, iniecto prius per siphonem oleo violarum, & lumbricorum terrestrium, desuper diapalma strictiori linteo inductum, & linimento simplici obductum adhibuimus, & totum, appposito cataplasmate (quod constabat ex farina hordei & fabarum, mica panis, oleo rosat. Chamomil. atque lumb. terrest. & vino rubro) brachium fascia obligauimus. His medicamentis vsi sumus vsque in septimum diem, quo decidit eschara: interim obseruata fuit optima victus ratio, vna cum præparantibus, & alterantibus medicamentis.

Die 8. ægra bene habuit, & dolor & inflammatio totius brachij cessauit. Hanc ob causam vulneribus turundas linimento:

℞. Resin. Tereb. lot. in aq. plant. ʒ j.

Pulu. Myrrh.

Aloës ana ʒ j.

Lapid. Chryl. præp. ʒ ss.

Mell.

Mel. ros. col. 3 i s.

Bals. Percuian. 3 i s.

Syrup. de ros. sicc. q. s.

M. pro linimento.

oblitas immisimus, & cerarum diapalmæ apposuius, spongiamquæ in vino rubro depressam, fasciæque duobus capitibus prædita nonnihil expressuè superligauimus. Vulnura simplicia iam ad cicatricem retenderunt. Die 14. tam vulnus brachij appositum, quam reliqua simplicia cicatricem habuerunt, & patiens feliciter restituta Geggliam properauit.

Die 3. licet sinus ægri in occipitio maior fuerit, quàm die præteriro, illum ramen spongiola contorta magis dilatauimus, vulnus ob scetorem eluentes decocto diuino. Circa os sacrum inflammatio & dolor, beneficio cataplasmatiss supra descripti, & repetito Enematis vsu, remisit. Die 5. pus vulneris circa os sacrum inflicti fuit album & coctum. Vulnus in occipite satis fuit profundum, & patiens conquestus est de insigni dolore capitis circa frontem. Die 7. tumor & dolor circa os sacrum omnino euauit, & propter hæmorrhagiam narium dolor circa frontem cessauit. Die octauo vulnuri circa os sacrum turundam vnguento, quod paratum fuit ex puluere sequente:

℞. Lapid. Chrysol. præp.

Hæmatit.

Aloes.

Bol. arm. præp. 3 i s.

M. F. Pulu.

& albumine oui subacto imbutam imposuimus, & Emplastrum albi cocti superligauimus. Die 9. dolor omnis intermisit, & patiens tota nocte quiete dormiuit: turundam breuiorem vulnuri circa os sacrum imposuimus, & ad latera spongiam vino rubro tepido expressam fasciæ expressuè superligauimus: Vulnus occipitis adhuc sinuosum existens absque dolore serosam materiam emisit.

Die 10. vulneratus dixit, se noctem placide transegisse: vulnusque circa os sacrum bene habuit, pus enim album & coctum in paucissima quantitate generauit. Circa oculos æger sensit dolorem grauium, quem post aliquot horas secuta est hæmorrhagia narium, à qua grauitas illa iterum remisit: patiensque hunc sanguinis fluxum sibi proprium esse dixit.

Die 11. vulnus circa os sacrum cicatrice fuit obductum. Die 12. vulnus occipitis specillo obtuso exploraui, & oblique, inter cucularem & patientiæ musculum deorsum perueniens, prædixi Chirurgo & vulnerato vulnus hoc, ob insignem concussionem, adhuc esse
peri.

periculosum. Cum iterum tota nocte placidè dormiisset, Die 13. propter milites in suis ædibus hyemantes domum equitavit, sinu in capite nondum consolidato. Interim Chirurgus singulis diebus ipsum visitavit, & sinum curavit. Post 10. dies Chirurgus à me, ut vulnerato præscriberem, potionem medicam petijt: præscripsi, à qua aliquot sedes habuit. Sequenti die Chirurgus iterum me accessit, dicens, cogi se sinum aperire, cuius operationis modum optimè norit. His ita peractis, Die 18. Febr. sinum aperuit, sed quo scalpello nescio. Die 19. ægrum inuasit febris, Die 1. Martij patiens sumpsit Syrupum purgantem.

Rec. Syrup. ros. sol. ʒ i s.

de mann. ʒ vj.

Extract. Rhab.

diacarth. ana ʒ i s.

Mag. Tart ʒ i.

Ap. ceras.

q. s. M.

F. Syrup. liquid.

à quo cum illum vomitu statim reiecerit, ne semel quidem fuit purgatus. Die 4. cum æger petus haberet, Gegglingam vocatus inveni ipsam valde debilem, vulnus totum Erysipelate inflammatorio oblitum, sinumque in superficie vix ad tertiam partem à barbitonfore incisum, paulò enim inferius magnus sinus adhuc ipsum latuit, quem scalpello intactū reliquit: pericranium adeo putrefactum erat, ut facile specillo obtuso à cranio potuisset obligari. Obligato idoneis vulnere & resectis viribus, incisa fuit eius lateris vena cephalica, ex qua sanguis fluxit serosus & semiputridus. Cū ita res sese haberet, suasi ut patiens iterum in Civitatem lectica veheretur. Die 4. lectica in Civitatem lati vulnus religavi, & inveni Erysipelas, quod non solum vulnus, verum etiam posteriorem & anteriorem capitis partem ita occupavit, ut patiens, de dolore capitis vehementius conquerens, oculos nullo modo aperire potuerit, &c.

Die 5. ob insignem dolorem & calorem internum vsus Enemate refrigerante;

Rec. Radic. Acetos.

Alth. ana ʒ ʒ.

Herb. Nymph.

Violat.

Malu.

Berthou.

Flor. Cham. ana M. ʒ.

Semin. lini ʒ iij.

Cirti.

Citr.

Fœnicul. ana ʒj.

Vuar. pass. ʒß.

Coq. in l. q. aq. font.

Colatur. adde

Mel. ros. sol. ʒ iv.

Ol. violar.

Chamomill. ana ʒ is.

M. pro Enemate.

Vesperis sumpsit syrupum refrigerantem. Die 6. noctem quietam habuit, & conquestus est de cardialgia, & magna virium debilitate, idcirco præscripsi:

℞. Conf. ros. vitriol.

violar. ana ʒ j.

Conf. Alkerm. compl. ʒ j.

Cortic. citr. cond. ʒ ij.

Syrup. acetos. citr. q. s.

M. F. Condit.

de quo sæpius per diem pauxillum sumpsit. Vulnus sudic pus semicruentum, & pericranium apparuit semiputridum: quamvis autem vulnus hoc maiorem dilatationem requisiverit, ratione sinus, propter vitium tamen debilitatem illud dilatare non licuit. Interea ob angustiam pectoris vigilans vsus est emulsione:

℞. Sem. melon. ʒ ß.

papau. alb. ʒ j.

Amygdal. dulc. ʒ ij.

Aq. ceras. nigr.

Nymph.

Frag. ana ʒ iij.

F. Emuls. cui add.

Magist. Corall. rub. ʒ js.

Sacch. perlat. ʒ ß.

Misc. ad vitrum.

Die 7. æger melius habuit, totumque caput & facies detumuit; vulnus pus coctum sudic, & labia fuerunt sordida, propter ipsius adhibitum sive unguentum Ægyptiacum compos. Cum pericranium adhuc esset semiputridum, imposuimus ipsi syrupum de rosis siccis, cum spiritu vini mixtum. Ob sitim & capitis dolorem, patiens admisit Enema hesternum.

Die 8. calor febrilis nonnihil remisit, at quia æger conquestus est de dolore & incendio vulneris, circa os sacrum, cicatrice iam iam obducti, vsus est Enemate & Emulsione melonum ordinatijs: vulnere ad-

ri adhuc fordido adhibuitur vnguentum Ægyptiacum compositura, & pericranio semiputrido Syrupum de rosīs siccis, cum spiritu vini permixtum, atque decocto nostro diuino. Die 9. dixit, se sex horas dormiuisse: Ex vulnere pus ad viriditatem tendens, in pauca quantitate, effluxit. Vesperī benè habuit, & calor totus omninò remisit.

Die 10. vesperī conquestus est de summo calore dorsi, & vehementi dolore capitis, dicens: se non posse dormire propter somnia, quæ ipsum teritant. Quapropter vsus est enemate suo ordinario, à quo deiecit ter materiam biliosam. Die 11. benè habuit, & totam noctem placidè consumpsit. Die 12. 13. 14. & 15. rectè habuit, & sinus internus parum puris cocti generauit. Die 16. bene habuit, sed ob bilis in corpore abundantiam, vsus est syrupo sequenti:

℞. Syrup. ros. sol. ʒ ij.

Extr. Rhab. c. ʒ j.

Diacarth. ʒ j.

Magist. Tartar. ʒ ss.

Aq. cera. nig. q. s. M.

Die 23. cum sinus inferior propter foramen superius nullo modo consolidari potuisset, suasi apertionem sinus, vt materia haberet exitum. Ab hac sectione, propter antecedentem frustra adhibitam, valdè abhorruit. Quapropter vesperī candelam ceream vsque ad fundum sinus impolui, & per noctem reliqui: Manè extraxi candelam, & eius loco acum (Tab. XII. Fig. VIII.) quæ ex vna parte trahat funiculum (seu setonem Fig. VII. Tab. VII. exarmatum) & ex altera acuta affixum habeat globulum cereum, sinus fundo apposui, & eum ægro inscio citissimè perforaui, & funiculum in sinu, velut in setaceo reliqui. Die 30. purgato iterum corpore, & secta vena mediana dextri brachij, patiens rectè habuit, foramenque superius vsque ad funiculum consolidatum fuit. Die 6. Aprilis optimè habens, Vlma discessit. Die 8. extractus est funiculus, & 10. vulnus cicatrice obductum.

OBSERVATIO LIX.

Vulnus pectoris ex neglecta paracemese lethale.

ANno 1645. Die 10. Martij, hora octaua post meridiem, *Iunioris* quidam vulnus accepit in dorso angustissimum, duobus digitis transversis infra scapulam dextram, & quatuor à spina, in cavitatem penetrans, quod Barbitonsor, aliàs non imperitus, (quam primo læsionis quasi momento, accessit vulneratus) tractauit ac si vulnus simplex esset, & minimè penetraret. Hinc sanguis, è va-

his intercostalibus incisis, defluxit in thoracis cavum, qui tantam causavit pectoris angustiam, ut parentes ægri etiam me vocari iussent. Circa duodecimam noctis horam vulnus reliquit, quod propter gladij qualitatem, situm thoracis mutatum, & appolita medicamenta constringentia, adeo angustum erat, ut neque specillo in eam tatem pervenire; neque sanguinem sistentia, aut per siphonem inijcere, aut sub turunda applicare, possetim. Quapropter adstantibus patientis de vita periculum indicium, & paracentesim in loco Hippocratico Tab. XXXVII. Fig. II. *U* sine mora administrandam proposui, qua materię, certam suffocationem minanti, pararetur exitus. Cum autem hanc absque dubio saltemferam, in hoc subiecto, Chirurgiam parentes concedere nolissent, & materia, adhibitis diureticis, per vias urinarias tam subito expurgari minimè valuisset, æger die sexta suffocatus obiit, qui forsitan dilatazione in principio non neglecta conservati potuisset, circa læsionem partium internarum decumbens. Illæsi namque fuerunt pulmo: es, quoniam æger nunquam expuit sanguinem. Non læsus œsophagus, quia sine ulla difficultate cibum & potum deglutiit. Non offensus cor: non vena cava aut arteria magna: quoniam æger tam diu post acceptum vulnus non superuixisset, sed citius obisset. Integra cordis capsula, quoniam cor humido suo prætatum citissimè defecit. Non offensus diaphragma, ob absentiam eorum symptomatum, quæ omnes chirurgię Scriptores eiusmodi vulnus comitari tradunt: sed æger conquestus est de sola pectoris angustia, quam induxit copiosi collectio sanguinis. Hic admonitos volo chirurgię tyrones, ut ad vulnus pectoris curandum vocati, diligentissimè specillo inquirent (ægro prius, si fieri potest, ea figura in qua læsus fuit colloca-to) an illud in thoracis cavum penetret, nec ne? *S* penetrat, periculosum pronuncient, & si angustum, consensu patientis & adstantium obrento, dilarent scalpello Tab. XXXVII. Fig. V. E. ut materia in thorace collecta vel sponte effluere, vel imposito canali Tab. XXXVII. Figur. VI. A. educi possit. *S* vero latum, turunda, ob rationes modò dictas, immissa apertum conferuent. Cum autem materia neque per vulnus propter altio-rem affectus situm, spontè expurgari, neque ob sui crassitiam per applicitum canalim extrahi, neque, ratione copię, per vias urinarias expelli possit, statim (dum scilicet vires ægri adhuc constant,) perforationem thoracis adhuc reliquam *cavum* proponant, siue concedatur, siue recusetur, *ne ipsi vel patientum, si ob affectus vehementiam moriantur, consanguinei, vel ij ipsi qui vulnus insisterant, negligentia, aut occisionis crimen inferendi causam habeant.*

OB.

OBSERVATIO LX.

Extirpatio Penis.

ANNO 1635. Mense Iulio, cuiusdam Vlmano, penem spacio corruptum, in confusio vini, scalpello Tabul. XII. Figur. VI. abscidi, venas & arterias, ad mox sistendum sanguinem, feramentis ignitis tetigi, iisque putredinis reliquum absumpsi, donec patiens vim ignis perciperet. Operatione finita, & Syringi Tab. XII. Figur. XVI. meatui urinario imposita, loco adusto adhibui unguentum Ægyptiacum Mæsuræ, cum filamentis carptis, ad remouendam escharam, qua ablata vlcus ceratum diuini breui consolidauit, & æger saluus euasit. Noui seniculum, cui ordinarius Nosocomij Patuini Chirurgus, penem, lue Venerea corruptum, pariter amputauit, vlcusque conuenientibus medicamentis applicatis, cicatrice obduxit.

OBSERVATIO LXI.

Cancer ex obstructione Vesicula fellea, & ductus biliarij incurabiles.

ANNO 1622. aperui cadauer Nobilis cuiusdam Galli, qui atrocissimis intestini coli doloribus consumptus obiit, & inueni intestinum colon cancro occulto affectum, cuius causa meo iudicio fuit obstructio pori biliarij. Hinc enim ea parte, qua duodeno inferitur, lapillo, pisum magnum adæquante, adeo obstructus fuit, ut ne tantillum bilis per eum expurgari potuerit: hanc tamen bilis copiam natura non ad vniuersum corporis habitum, ut plerumque solet, sed ad colon deposuit. Anno 1624. Die 24. Ian. in cadauere Dn. Catharinæ N. Venetæ, quam cancer vteri exulceratus è medio sustulit, reperi vesiculam felleam calculo instar crystalli pellucido, repletam & distentam, ut nihil quicquam bilis recipere apta fuerit. Nihilominus tamen natura bilem quotidie genitam, non ad corporis circumferentiam expulit, sed ad vterum. Ex duabus hisce historijs etiam duo notanda videntur, 1. quod ad obstructum porum biliarium, & cysticum, non semper sequatur ictericia, sed bilis aliquando expellatur vel ad intestina, vel vterum, vel aliam partem nobilem. 2. Lectio, quam habuit Excellentiss. Spigelius super hæc. *Si Veneta & Gallo exortus fuisset cancer in mammis, aut artubus, vlcus, post radicalem sectionem, vix cicatrice potuisset obducere: vel eo curato, materia illa mali-*

maligna inuasisset partes principales, agrisque, post tres vel quatuor annos, mortem intulisset. Ratio est in promptu, quin non potuit tolli causa, qua fuit obstructio vesicula fellea pertinax. Lienis obseruauit obstructionem in quadam muliere incurabilem, quæ dum viueret, per aliquot annos passa est vlcus in pede dolorificum, quod quotiescunque sanabatur, toties febrem quartanam induxit, donec humor, cuius collectio prohiberi non potuit, per inustum femori fonticulum quotidie euacuaretur, atque hac ratione, febris quartanæ, vt & vlceris in pede valdè dolentis exortus prohiberetur.

OBSERVATIO LXII.

Ossis scapula sinistra corruptio.

ANNO 1632. Mense Martio curauì scapulam sinistram valdè corruptam, filij Prætoris Burlensingensis, iniiciendo quotidie, per duo sinus foramina, turundis vnguento de Bethonica illitis conseruata, decoctum:

℞. Radie. Irid. Florent.

Aristoloch. rotund.

Consol. maior. ana ʒ j.

Herb. Veronic.

Pilosell.

Pimpinell.

Verben.

Vinc. peru.

Fragar. ana M. j.

Semin. plantag.

Cichor. ana ʒ ss.

Aq. Font. ℥. vj.

Vin. alb. ℥. ij.

coq. ad conf. tert. partis colat.

adde Mell. ros. col. ʒ iv.

M. pro iniectione.

donec scapula tam magnam ossis squamam separaret, quam mihi ob foraminum angustiam extrahere non licuit: Quapropter foraminum interstitium scalpello Tabul. XIV. Figur. II. vel III. intercidij squamaque separata per volsellam exempta, sinus parietes apposita spongia noua, in vino rubro expressa, atque cataphracta Tabul. vii. Lit. S. arctè adhibita, ossi scapulæ agglutinaui,

OBSERVATIO LXIII.

*Lapis citra meatum urinarum incisionem, vel specilli
admotionem exemptus.*

ANno 1639. Mense Februario, *Iuuenis quidam Leipheimensis* receptus fuit Nosocomium Vlmenſe, laborans vrinæ incontinentia ex laceratione ceruicis veficæ, à calculo vncias ſex pendente, quem inſignis Auguſtanorum Lithotomus Angelus Marian, forcipe extraxit: Quoniam verò affectus erat incurabilis, medicamentis, quæ vrinæ acrimoniam mulcerent, & interriginem partium prohiberent, inſtructus Vlma diſceſſit. Mēſe, eiſdem Anni, Maio, is ipſe laboravit Iſchuria ex calculo meatum urinarum obſtruente, meumque conſilium & quidem literis mandatum percipiens, manè & veſperi, ſumpſit doſim ſequentis Iulapi:

R. Syrup. de Alth. Fernel. ꝑ. iij.

Aqua Malu. ꝑ. iij. M. pro duabus doſibus.

& ſepius inſedit balneo ductum relaxante, donec calculus rotundus, iſtar ſilicis durus, & tres ſerè drachmas ponderans, ad colis oriſcium, ab vrina, protruſus, voſcellæ dentibus arripi, atque ſic citra vretæ incisionem (quam Sennert. inſtit. lib. 5. par. 1. ſect. 2. cap. 13. ex Fabr. Hild. Traſt. de lithocomia veficæ cap. 27. proponit) aut ſpecilli Tab. XIV. Fig. VIII. operam, eximi potuerit.

OBSERVATIO LXIV.

Nervi punctum vulnerati.

IN nervis punctum & cæſum vulneratis, poſt vniuerſi corporis procurationem, Medicorum quidam prius incidunt cutim ad angulos rectos, vt ſanies liberè exeat, & medicamenta topica ad puncturam vſq; nervi penetrent: Alij, facta cutis in angulos incisionem, etiam nervum tranſverſim diſſecant bono ſucceſſu, antequam remedia externè adhibeant, vt humorum affluxus inhibeatur, qui dolorem auget, inflammationem efficit, ac conuulſionis cauſa ſit. Quia tamen hanc curis incisionem, vel etiam punctum læſi diſſectionem, ægro-
(qui non raro, dum venas phlebotomo incidunt, pernos vicinos, vel
venis ſubiectos imprudenter lædunt) topicum ſæpius expertum ap-
ponam,

§

R. Equi

*R. Euphorb. optim. ʒj.**Resin Tereb ʒß.**Cer. par. M. F. Vng.*

extendatur super lincum, & calidè applicetur. Hoc solo, statim adhibito, plures eiusmodi puncturas tutissimè curavi, vt testabitur Clariss. & Chaciss. meus affinis & Collega Du. D. Iohann. Sebastianus Blösius, & Chirurgus Nicolaus Reutte.

OBSERVATIO LXV.

Gumma Gallicum chirurgica curatum.

Martinus Fischer conquestus est de Gallico sinistri pedis gummate, quod neque curæ sudoriferæ, neque cerato, *Tab. XLIII. sub Lit. R. commendato*, cedere voluit. Quapropter tibie cariem caustico detexi, ipsamque scalpris, ad vitium vsque derasi. Operatione finita, ossi adposui puluerem exsiccantem, & filamenta arida, donec carne obduceretur. Vlcus tandem incarnantibus, & epulotici tractauit notissimis. Hac chirurgia, hisque remedijs æger felicissimè restitutus, per plures annos optimè valuit, & postmodum violenta morte vitam finijt. Nonnunquam tanta luis est virulentia, vt ossa tibie ad medullam vsque corrodat, hincque scalprorum vsus sufficiens non sit, sed præter hæc etiam requirantur vel modiolii, vel setramenta ignita, ad eradicaudum vel consumendum cariei reliquæ, quod Euphorbij prius puluere insperso separari nequit. Huiusmodi virulentiam obseruaui Patavij in vetula quadam octogenaria, è cuius sinistra tibia sæpè ossa ad indicis digiti magnitudinem accedentia Fabricius extraxit.

OBSERVATIO LXVI.

Meliceris in humero & genu.

Anno 1629. *Andreas Monchmaner*, Bigarius Vlmensis, conquestus est de molesta meliceride in dextro humero, quam, præparato & purgato prius corpore, resolui appposito cerato de asinapios *Tab. Vltima sub Lit. C. descripto*. Huius quoque cerati peculiarem contra melicerides efficaciam, nuper experta est *Vnaldburga Degelein*, quæ meo consilio, meliceridi in dextro genu enatæ, & ouum anserinum sua magnitudine adæquanti applicuit idem ceratum, quod mensis spatio tumorem, & quicquid primis diebus, ob neglecta Vniuersalia, fuit attractum, integrè discussit.

O B.

OBSERVATIO LXVII.

Sterilitas ex male reposita hernia.

A Nabaptistæ in Moravia herniam intestinalem curantès, post reductionem intestini prolapsi foramen peritonæi testiculo obturant. Hunc autem curandi modum peritiores Chirurgi minimè laudant, tum quia testiculus si eo maius fuerit foramen facilè excluditur, ut æger antiquum obtineat; vel quia testiculus, si maior fuerit foramine, coarctatus dolore afficitur, à quo vel inflammatio, vel sterilitas, vel ipsa mors. Probè igitur obseruent Chirurgiæ tyrones, ut in repositione intestini testiculum in Scroto relinquunt, ne in foramen adactus doleat, & coitum prohibeat. *Non enim quosdam, qui ex hac unica causa sterile & rixosum habuerunt coniugium, ut & pistoris filium, qui quale habiturus sit coniugium, tempus edocebit.*

OBSERVATIO LXVIII.

Erysipelata.

Vsu linimenti simplicis, nondum rancidi, & frequenter immutati (*cuius descriptio videatur supra Observatione 52.*) innumera extremorum erysipelata felicissimè curavi, non neglectis tamen vniuersalibus, & refrigerantibus internis. In huius linimenti defectu nihil præstantius sum expertus, quam oleum amygd. dulcium recens, & ex aqua solatri in phiala vitrea nouies lutum, quo frigide iungitur pars affecta, donec illius calor vehemens minuat. Alij commendant Balsamum Saturni oleo lini paratum, & sæpius pluma illitum.

OBSERVATIO LXIX.

Vulnus sclopeti cum gangrena.

ANno 1634. Iohann. Philippus Ochmid, Præfectus Vigilum Vlmensis, in conflictu prope Nordlingam sauciatus fuit glan-
de sclopetaria humerum perforante, Vlmamque veniens incidit in manus Chirurgi parum exercitati, qui vulneris orificia, non turundis, sed traiecto setone, citra totius procurationem, aperta deriuauit, eoque tantos dolores excitauit, ut inflammationi succederet gangrena, cui fortuna superueniens, statim remoto prius setone,

S 2

appli-

applicui *cataplasma ex farina maluarum*, & *aqua rosacea confectum*, & aluo per clysterem lenitiuum reclusa, è sinistro brachio, reuulsionis gratia eduxi ℥vij. sanguinis, qui biliosus valdè, & serosus fuit. Quapropter, altera die, gangræna remittente, æger sumpsit potionem hydrochologogam, à qua decies deiecit:

℞. Syrup. ros. sol. ℥ij.

Extract. Rhab. ʒj.

Cnicop. ʒij,

Mag. Tart. ʒß.

Aq. Borrag. q.s. F. Potio.

Die tertio gangræna omnino euauit: Reliquis diebus carnes circa vulnus putrefactas vnguento Ægyptiaco Hildani separavi, vulnusque tandem per secundam intentionem, mensis spatio, feliciter curavi. Miras huius cataplasminatis vires, restitutus adhuc superstes, satis laudare non potest, eique brachij conseruationem vnicè adscribit.

OBSERVATIO LXX.

Herpes miliaris & exedens.

VRida herpetis tam exedentis, quam miliaris vlcuscula, post totius corporis (per medicamenta cholagoga & refrigerantia repetitis vicibus assumpta) procurationem, & lotionem partis affectæ decocto, ex aqua dulci, maluarum in plurimis, breui temporis spatio sanauit præstantissimo Nicotianæ cerato, cuius descriptionem, ex Hier. Fabrit. ab Aquap. Pentateucho Chirurgico, Tabulæ ultimæ sub Littera C. inferui. Quod si vlcuscula nimis in altum serpsere, cerasum modo allegatum redigatur in formam Vnguenti:

℞. Cerati Citrin. ʒj.

Olei myrrh. q.s.

M. F. Vnguentum.

quod filamentis aridis inductum admoueatur, & appposito cerato de cerussa conseruetur, ne decidat.

OBSERVATIO LXXI.

Erysipelas exulceratum.

ANno 1645. Die 24. August. Generosus Dn. Nicol. Dieterich¹ vulgò Operreiter dictus, conquectus est de erysipelate vtriusque cruris exulcerato, summo pruritu, & acris materiæ per pores cutis

cutis effluxu. Cum autem affectus iste ab efferuescentia sanguinis, & abundantia bilis in toto dependeret, præmissis clystere laxativo & refrigeraute:

℞. Specier. decoct. carm. ℥j.

Herb. Violar. M. j.

coq. in f. aq. simpl.

Colatur. ℥ix. adde

Mell. ros. sol. ℥ijs.

Flor. cass. rec. extr. ℥j.

Ol. viol. ℥ij. Misc.

per venam iccorariam ℥vj. sanguinis educi curavi, & ad temperandum calorem vesperi exhibui iulepum.

℞. Brod. de rad. cich. condit. ℥ix.

Aq. cichor. q. s. M. pro duab. dosib.

Porus fuit aqua hordei Tinctura ros. permixta, & cibus refrigerans. Cruribus affectis Chirurgus militaris sæpius per noctem applicuit linteum triplex in decocto sequenti calidè expressum, ad mitigandum pruritum, & impediendum acris materiæ affluxum:

℞. Herb. Malu. M. j.

Veronic. M. ℞.

Alum. crud. pulu. ℥j.

coq. in f. q. aq. flumial.

colatur. serui. in olla.

Die 15. pruritus & acris per poros effluxus cessauit. Quapropter tibis exulceratis apposui Emplastrum de Saturno Mynsichij Linimento simplici permixtum, & linteo lato inductum. Ager verò ad expurgandos humores serosos & biliosos hausit potionem sequentem.

Rec. Syrup. ros. sol. ℥iij.

Extract. Rhab.

Diacarth. ana ℥ij.

Aq. Endiu. q. s.

M. F. Haustus.

À qua decies deiecit. Die 16. ob nimias animi commotiones crura inflammatio vehemens, quæ certissimam gangrænam minata est. Ad eam igitur præcauendam, expertissimum meum cataplasma (de quo obseru. 69.) calidè adhibui, & quoties exsiccabatur, aliud applicari iussi. Die 17. inflammatio remisit, & Die 18. cessauit: Quapropter vlceribus iterum adhibui mixturam:

Rec. Empl. de Saturno Myns.

Linim. simpl. ana part. æq. M.

S 3

donec

donec 9. Septembr. consolidarentur , & xger de nullo amplius vel dolore, vel calore conquereretur.

Die 12. ad præcauendam reciduiam , præscripti vinum medicatum, à cuius vſu felici brachio dextro fonticulum inuſſi; & dentifricium Electuarium ordinaui , ad dentium radices obſtirmandas , eorumque ſordes detergendas:

R. Pulv. Porzellan. ʒiv.
 Ligd. aloes.
 Santal. citr. ana ʒj.
 Moſch. ʒß.
 Rad. Ireos ʒijs.
 Alum. crud. ʒij.
 Mell. roſ. opt. deſp. ꝥij.
 M. ad ignem in for. Elect.

OBSERVATIO LXXII.

Tumores œdematoſi.

Nobiliffima calcis aqua , per aliquot dies uſurpata , multos tumores œdematoſos iam conſiſtentes diſcuſſi. Sumitur autem fruſtulum calcis viuæ , ad quantitatem nucis iuglandis , & in aquam feruentem immittitur , donec diſſoluatur , quo factò calx cum aqua agitur , & poſtea ſponte reſidere ſinitur . Hinc clarior aqua , per inclinationem , in aliud vas transfunditur , in qua ſpongia noua , & quæ nicroſæ qualitatſ adhuc particeps exprimitur , calidèque parti affectæ ſuperligatur. Notandum verò, quod pars oleo amygdal. dulcium , vel axungia porcina veteri , debeat inungi : facilè enim fieri poteſt , vt portio quædam calcis , quæ eſt accerrima & corroſiua , in aquam transfuſam abierit , quæ cum ſpongia applicita, erodere, partemque mordicare poſſet. Idem encomium meretur ſpongia in oxycrato madefacta , ſi œdema morbus vel in principio vel in augmento fuerit .

OBSERVATIO LXXIII.

Vomitus ſanguinis lethalis .

VIR 40. annorum temperamenti calidi & ſicci conqueſtus eſt quod ante quatuor meſes febricitans magnum habuerit ſanguinis vomitum , qui adhibitis in extremis friccionibus , & aſſum-

assumptis medicamentis, quæ respiciebant hepatis calorem, cessavit. Nunc iterum, circa duodecimam noctis horam, euomuit prius sanguinem, deinde cœnam. Huic exhibui puluerem in aqua plantaginis sequentem:

℞. Pulu. Radic. Pimpinell.

Consol. maior. ana ʒ ij.

Misc. pro dosi.

Sequente die patienti, cum iterum euomisset ℥. x. sanguinis, applicari iussi artubus & dorso cucurbitulas sine scarificatione siccas, & clysterem domesticum infundi.

℞. Decoct. Mercurial. ʒ x.

Mell. crud. ʒ ij.

Elect. Lenitiui ʒ j. M. F. Enema.

Tertio die conquestus est de oris amarore, & postea euomuit bilem in magna copia, & interrogatus, an nunquam vlcera in pedibus habuerit, respondit se in vtraque tibia exulcerationes perpessum, quæ medicamentis potius externis curatæ fuerint. Post vlcera consolidationem vtrumque pedem infestavit Erysipelas, quod assumpto ligno decocto euauit. Causa vomitus sanguinei procul omni dubio fuit vlcera consolidatione, quare ad reuellendos humores vtroque femori quatuor digitis supra genu inuasi fonticulum cauterio Placentiui. In his enim meo iudicio consistebat conseruatio vitæ patientis, alioquin breui perituri. His tamen fonticulis nulla superuenit febris, vt solet, nullaque inflammatio aut leue erysipelas, quæ significare potuissent materiam à centro ad circumferentiam, & extrema reuelli. Si horum morborum fonticulum nullus comitatur, signum est certissimum, materiam in corpore esse fixam, & ægrum interiturum. Quinto die iterum euomuit sanguinem copiosum. Sexto conuulsus obiit.

OBSERVATIO LXXIV.

Hernia carnosæ.

ANno 1634. Mense Augusto, *Generosus quidam Nobilis* conquestus est de magna sinistri testiculi sarcocoele, quam (premissis vniuersalibus & bona victus ratione) sequenti emplastro, & puluere radicum ononidis, quem Petrus Mathiolus comm. in Dioscorid. l. 2. c. 18. nobis commendat, insensibiliter resolui.

S 4

℞. Gum.

Rec. Gummi Ammoniac.

Galban.

Bdell. ana ʒʒ.

dissolutis in aceto adde

Adip. Anat. liquat. & col. ʒis.

Ceræ citrin. ʒij.

Ol. lilior. albor.

Medul. Crur. bouis ana ʒx.

M. in form. Empl.

quod linteo inductum scroto applicetur, & quarto quoque die renouetur.

Ononidis puluerizatae sumpsit singulo mane ʒj. in haustu vini absynthites. Parti domesticæ dextri femoris, quatuor digitis supra genu sibi iuri passus est fonticulum ad deriuandos humores, dictorumque præsidiorum vsum continuauit, ita vt quatuor mensium spatio pristinam sanitatem consecutus fuerit: Anno 1641. in Xenodochium Vlmenſe receptus fuit Georgius Rlarer, Reichenbachensis, qui iisdem remedijs in simili casu felicissimè curatus fuit. Præter hos & plures alij beneficio solius huius pulueris, sensim & sensim conuauerunt, quorum tamen nomina, cum reliquis, qui in obscuris partibus laborarunt, quod eorum plurimi adhuc in viuis sunt, lubens meritoque silentio inuoluo.

OBSERVATIO LXXV.

Fistula mamma dextra.

Villana quædam puerpera, ex concretionem lactis in mamma dextra, passa est inflammationem, quæ nimis resoluentibus indurata, adhibitis inconuenientibus remedijs degenerauit primo in abscessum, & tandem in fistulam, cum callo, angusti orificij, profundam. Quapropter chirurgo patientis ordinario consului, vt purgato per panchimogon aliquod corpore, fistulæ orificium turundis, ex gentiana paratis, sufficienter dilataret, postea callum semel imposita rorunda linea, & medicamento sequenti imbuta, consumeret:

Rec. Mercur. præcip.

Alumin. vst.

Virid. æris.

Sal. Nitr. ana p. æqu.

Album. ouor. q. s.

M. F. Vnguentum.

quod

(quod fistularum callos cito quidem, sed in partibus precipue nervosis, & exquisito sensu praeclatis non adeo iucunde & tuto extirpat.) coque consumpto vlcus Unguento Egypt. Mes. mundificaret, mundificatum Unguento de Bethonica incarnaret, incarnatum cerato diuino consolidaret, tumorisque duri reliquias cerato oxelxo resolueret. Chirurgus dato consilio obtemperauit, & patiens exinde sanitatem exoptatissimam breui recuperauit.

OBSERVATIO LXXVI.

Recidua haemorrhoidum ex scammoniatis.

L Anius Vlmensis, adhuc superstes, à diuturnis haemorrhoidibus cannula & stylo Tab. XVI. Fig. III. & IV. tandem liberatus, toties reciduiam passus est, quoties medicamentum purgans, quod ingrederentur vel folia sennae, vel scammonium, ore assumpsit. Quapropter ego, vt & Clariss. alij Medici, aegrotanti interdiximus vsum sennatorum & scammoniatorum, qui inde, acerbo ab haemorrhoidum dolore per multos annos immnis, saluberrimè vixit.

OBSERVATIO LXXVII.

Anus non satis perforatus.

A Nno 1640. Iacobo Neubronner, Ciui & pannitorumfori Vlmensis natus est filius cum ano non satis perforato, sed adeo angusto, vt vix aciculæ communis cuspidem admitteret. Vocatus proposui chirurgiam Tabul. XLI. Figur. VI. depictam, quam parentes noluerunt concedere. Quapropter necessariam anæstrictissimi dilatationem tentavi penicillis ex radicibus gentianæ paratis, quos oleo prius imbutos ani orificio imposui, ibique reliqui, donec tumefacti anum sufficienter dilatarent. Modus cum radicibus procedendi videatur supra observatione 40. & ratio deligandi ne turundæ decidant, Tabul. XLI. Fig. VII. Noni obetetricem Patavinam, qua anum totaliter occlusum acicula communi perforare, factumque foramen impositis ex gentiana turundis ampliare solita est.

OBSERVATIO LXXVIII.

Fœtus mortui eductio.

Cum fœtus mortuus, remedijs internè prius assumptis, quorum Tab.XLI.Fig.V. facta est mentio, expelli nequit, commendatur suffumigium ex vis putridis vulvæ aliquoties in die susceptum, cuius efficaciam admiratus sum Vlmæ in honestissima quadam matrona adhuc superstitè, quæ tum temporis libentius mori, quàm tutissimam aut manus Chirurgi, aut vnci, aliorumve instrumentorum operam, mihi sæpius visam (quam tamen ipse in visis, vç fatear id quod res est, nunquam adhibui) concedere voluisset. Fœtum tamen mortuum, ex cuius retentione parturientes occubuerunt, è tribus cadaueribus vncis Tab.XVII. Fig.IV. depictis, citra tantillam vteri & vaginæ lacerationem, integre detraxi, in ijsque observaui, quod vera sit illorum sententia, qui ossa pubis in difficili partu à se invicem diduci scribunt.

OBSERVATIO LXXIX.

Gonorrhœa virulenta.

Nobilis quidam Germanus, viginti annorum, temperamenti calidi & sicci, post tertium ab impuro concubitu diem, conqueri cœpit de gonorrhœa virulenta, pro cuius curatione corpus bolo, repetitis vicibus assumpto, expurgavi:

℞. Tereb. Venet. aq. malu. lot. ʒ iv.

Flor. cass. rec. extr. ʒ vj.

Mercur. dulcif. gr. xiv.

M. C. sacch. & f. bolus.

Deinde, pro potu ordinario, præscripsi decoctum aliquod appropriatum:

℞. Hord. integr. p. j.

Semin. melon. par. contus. ʒ j.

Fol. Equiset. M. ss.

Aq. fontan. ℥. ix.

Bull. ad consumpt. medietatis & in

fine add. liquir. minut. incis. ʒ j.

Pro

Pro lumborumque, ad utiperam, seruire mitigando, refrigerans seq.
ordinaui :

R. Cerat. Santal.

Vng. ros.

Committiss. ana 3vj.

Ol nymph.

violar. ana 3ß.

Camph. pulu 3ß. M. Pro Vng.

Et singulo mane tribus horis ante prandium , exhibui mixturam ,
quam Ioann. Petrus Faber commendat, ex succi limonum 3 j. & spi-
ritus camphoræ 3 j. Quibus remedijs æger sexto curationis die ci-
tra iniectiones (quos alij *miro successu ex plantaginis succo, melle ro-
fato, mercurio dulcificato, aloëque succotrina conficiunt*) felicissimè
restitutus fuit. Aqua ad Gonorrhæam Quercetani , præmissa per
Mercurialia expurgatione, per aliquot dies exhibita quam plurimos
curaui.

OBSERVATIO LXXX.

Erosio ventriculi curata.

ANno 1622. aperui cadaver Monachi Patauini , qui dolori-
bus colicis obiisse ferebatur , & in causam mortis inue-
stigans, reperi non modò ventriculi fundum phlegmone correptum,
verùm etiam ad mediam vsque tunicam corrosum . In tali curan-
da ventriculi inflammatione & erosione, dixit Excellent. Spigelius,
quod nihil præstantius fuisset terra sigillata ore sæpius assumpta, ut
quæ , ob visciditatem suam , ventriculi tunicis erosio renascitur ad-
hæreat (non aliter , quam cerarum diachaleiteos inflammato pedi
appliciturum) : erosiones exsiccet. Huius effari dignitatem postea, sum-
ma cum admiratione , bis expertus sum in enormibus ventriculi
doloribus, qui neque assumptis neque adhibitis vllis remedijs, miri-
gari potuerunt, nisi terra sigillata, syrupo consolidæ maioris attem-
perata .

OBSERVATIO LXXXI.

Tibia corrupta.

ANno 1634. die 8. Iunij , Dn. Augustinus Merk , mercator
Vlmensis , conqueritur de insigni exulceratione , doloreque
magno

magno dextræ tibiz , ac totius corporis atrophia. Inſpecto vl-
cere, non ſolum os tibiz à ſuperficie ad medullam vſque corrup-
tum , verum etiam inferius fibulæ caput læſum inuenimus , &
communicatis conſiliis clariffimor. & Excellentiffimor. virorum
Domini D. Georgij Horſtij , ac Domini D. Iohann. Reguli Vil-
lingerii ſtatuiſmus , totum os tibiz remouendum eſſe . Cum autem
corpus ratione atrophiz eſſet exangue , de indncenda vltimo cicat-
rice dubitauimus . Quamuis, ad petitionem Domini ægroti, abra-
ſione & vſtione , ad remouendam cariẽ , periculum fecerimus ,
ob defectum tamen alimenti , quod oſſa ex ſanguine & medulla
habent , omnia fruſtra tentauimus : *Os enim deaſum vel inu-
ſtum, ob alimenti defectum nec carne tegi, neque ſquammas ſeparare
potest.* Ob id vnanimi conſenſu pro rato habuimus , vt totum tibiz
os corruptum , fruſtra haſtenus abraſum & inuſtum excideretur .
Præparato igitur corpore die 6. Inlij, ſecui cutim (crure prius ſe-
cundum rectitudinem collocato , & ab adſtantibus vtrinque de-
tento.) ſcalpello Tabul. II. Fig. II. ferè vſque ad inferiorem appen-
dicem tibiz Tabul. XXVII. Figur. I. & oſtendi Dominis meis col-
legis & adſtantibus tibiam valdè corruptam , & dimidium ca-
put fibulæ putrefactum . Huic tibiz ſupercreuit cartilago quæ-
dam , vt os ſub illa tanquam gladius in vagina (Tab. XXVII. Fig.
I. Lit. A.) trahi poſſet ; ob id vulnus filamentis concerpris , pul-
uere adſtringente Galeni , & albumine oui agitato obligauì . Die 7.
Iulij, ſubſiſtente ſanguine vulnus religauì , & tibiam corruptam
in ſua vagina cartilaginea (quam modiolis Tabul. II. Figur. III. &
IV. bis vel ter ad corruptum vſque os tibiz Tab. XXVII. Figur. I.
Lit. B, perforauì, & poſtea foraminum interſtitia forcipe Tabul. IV.
Figur. II. & Tabul. XX. Fig. I. excidi) monſtraui . Hoc facto tibi-
am corruptam (Tabul. XXVII. Figur. II.) extraxi, & caput fibulæ
magis corroſum (Tabul. XXVII. Figur. III.) vidi, & modio quo-
que excidi , arque hac ratione tibiam, à genu ferè vſque ad inferius
caput , abſtuli . Hoc peraſto , vtrique tibiz capiti puluerem (ex
rad. Ariſtoloſch. long. Irid. Flor. & Lapid. chryſoliti præp.) inſper-
ſi , deinde filamenta decerpta , ceratum diapalmæ , ſpleniumque
ex vino rubro , oleoque roſarum expreſſum , adhibui, crus faſcijs
decuſſatis (Tabul. XXVII. Fig. I.) in crucem (Tab. XXVIII. Figur.
X.) obligauì, & in ſuum canalem (Tabul. XXVI. Fig. III.) depoſui .
Die tertio poſt ſectionem dolor aliquantulum remiſit, & patiens ob
conſtipationem alui yſus eſt ſeq. Enemate refrigerante & hume-
ſtante.

R. Decoct. Acetof.

Mercurial.

Parietar.

Borrag. & Sonch. ʒix.

Mell. rof. fol. ʒiijs.

Ol. viol. ʒij. M.F. Clyft.

Victus fuit tenuis & refrigerans, ex ptifana hordeacea, panatella, prunis, aqua hordei, & vino granatorum. Die 4. ob putredinem carnis ab offe relictam, vulnus decocto diuino laui, coque eloto filamenta carpta digestiuo:

R. Resin. Tereb. lot. in aq. Plant,

& ſcordij. ʒʒ.

Pulu. rad. irid. Flor.

Ariſt. long.

Scord. ana ʒj.

Thuris.

Aloes. ana ʒj.

Syrup. de rof. ſicc. q. s.

M. in form. digeſt.

oblinita appoſui, deſuper ceratum diapalmæ, & faſcias decuſſatim adducendas.

Die quinto præſcripſimus ſacculum purgantem.

R. Lign. Lentifcin.

Rad. Acetof. ana ʒiijs.

Sarſapar. ʒvj.

Fol. ſen. Alex. ſ. ſt. ʒjs.

Rad. mech. nigr. ʒʒ.

Turbith.

Hermod. ana ʒij.

Semin. cartham. contuſ. ʒvj.

Aniſ.

Fenicul. ana ʒj.

Crem. Tart. ʒʒ.

Gingib.

Galang. ana ʒʒ.

Incif. & ſons. ad ſacculum inſundantur in menſura j. aqua hordei, & fiat Claretum.

De hac inſuſione ſumpſit æger alternis diebus tribus horis ante prandium ʒiv. Die 6. ab hauſtu clareti melius habuit parens, & pede religato pus ad albedinem tetendit, ſætorque offis omnino remiſit;

misit: quare vulnus, seu potius vlcus, quotidie modo dictis medicamentis obligavi, vsque ad diem 12.

Expurgato ab humoribus vitiosis corpore, die 13. præscripti sequens decoctum.

℞. Rad. Sarsap. ʒ is.

Chin. ʒ i.

Ling. sanct. rubr. ʒ ʒ.

Cortic. Ling. sanct. ʒ j.

inf. l. a. in l. q. font. & coq.

ad consumpt. tertie par.

tis, in fine decoct. adde

Vvar. Passar. ʒ j. col.

De hoc decocto mane & vesperi, quatuor horis ante cibum, ʒiv. sumpsit. In prandio & cœna bibit secundum decoctum. Vulnus bene habuit, & in cauitatem tibiæ & capitis fibulæ candelam ceream magnitudine vnus digiti transmisi: caro cœpit in extremitatibus tibiæ tam inferius quam superius crescere rubra, & vulnus pus laudabile effundere. Die 14. 16. & 17. patiens pulchrè habuit, & circa extremitatem cauitatis superiorum frustulum ossis nigrum, & adhuc semiputridum vossella extraxi. Die 20. alius cita est Enemate, sudit pus coctum: extremitatibus tibiæ, ad maiorem exsiccationem, puluerem ex rad. Arist. long. Irid. Flor. Scordio, Thur. & sach. albiss. ana partib. æqualib. adhibui. Capiti fibulæ increuit caro rubra, & labijs vlceris, ad maiorem exsiccationem, impositum fuit ceratum diuinum. A decoctionis vsu supra scriptæ patiens quidem bene habuit, & illa atrophia totius corporis nonnihil remisit, nihilominus tamen alternis diebus, à die 24. vsque ad 30. vsus est clareto laxatiuo, & decocto chinæ præscripto.

Die 31. ab inferiore tibiæ capite, nonnulla frustula ossis dentibus vossellæ extraxi, foramini fibulæ ob excrescentiam carnis & vulneri vndique filamenta carpta imposui; labijs vulneris ceratum diuinum adhibui, totum crus ceratò diachalciteos, fascijs decussatis, deligavi, & pedem canali suo imposui. Vulnus his medicamentis tractatum fuit vsque ad diem quadragesimum primum. A die 42. vsque ad 50. æger optimè valuit, & tarsum, metatarsum, ac digitos pedis huc & illuc mouit; nam muscoli pedem flectentes, vt tibiæ anticus, peroneus secundus, eumque extendentes, vt Gastrocnemius internus, & externus in prima sectione illæsi manserunt: ne tamen aliquis miretur, & sine fuscimento impossibile fuisse puer, sciat, spatio huius temporis callum genitum & fibu-

fibulam tibiæ sustentaculum fuisse. Die 60. inquiete noctem transegit, & conquestus est de amaritudine oris, & pedis dolore, quapropter sumpsit pulverem sequentem in iusculo cichorei alterato.

℞. Pulu. Rhab. el. ʒ iij s.
Cinam. ʒ ss.
Crem. Tart. ʒ j.
Misc.

à quo quinquies deiecit materiam biliosam. Vulnere religato rectè patiens habuisset, nisi ossiculum, quod natura separavit, curim pugnasset: sed extracto ossiculo, plusquam bene valuit. Die 70. natura ex foramine fibulæ exiguum ossiculum expulit, totumque foramen optima carne replevit. Capiti tam inferiori quam superiori tibiæ caro rubicunda innascitur, & à lateribus inducitur cicatrix.

Die 80. totum vulnus ad indicis digiti longitudinem cicatrice fuit obductum, & totus pes vna cum digitis huc & illuc sine impedimento potuit moveri. Die 81. adhibitum fuit sequens unguentum:

℞. Olei lumbr. terrestr.
Chamomil. ana ʒ ss.
Vnguent. neruin. & Eux
ana ʒ j. M.

Die 84. curauimus fieri instrumentum ex lamina ferrea, quod superius spathæ, inferius stapedis formam repræsentauit. Hoc instrumento, quod gossipio & linteis fuit subductum, tibiæ applicito, patiens grallæ incumbens prima vice capit ambulare. Die 94. optimè valuit, & gralla deposita, sinistra manu nixus sine impedimento domum exijt, vulnere ad pollicis magnitudinem adhuc aperto, & cicatrice nondum obducto, nihilominus tamen ob erysipelas, cui erat obnoxius, singulis mensibus sumpsit pulverem Rhabarb. in iusculo radicum cichorei alterato:

℞. Pulu. Rhab. el. ʒ j.
Gelap. ʒ j.
Crem. Tart. ʒ ss.
Misc.

Die

Die 120. bene valuit, sed ob defatigationem pes Erysipelas contraxit: quod sumpto pulvere Rhab: præscripto, & pedi Linimento simplici adhibito, quarto post die euauit, & patiens iterum sine baculo ambulauit, & optimè habuit vsque in diem 200. quo cum forum pisces emptum peteret, nescio quo incessu callum tibiæ fregit: inspecta fractura, vulnus adhuc apertum scalpello citra dolorem dilataui, & inueni duas fissuras, inter quas particulam mediam, magnitudine vnus digiti transuersi (Tab. XXVII. Fig. V.) fractam specillo huc & illuc mouere potui. His rebus ita stantibus, cum nullus adesset dolor, & nulla inflammatio, modiolò fractam particulam perforaui, & interstitium instrumento (Tabul. XX. Fig. I.) secui, & frustulatim extraxi: deinde vtramque tibiæ partem, tam inferiorem quàm superiorem scalpro deraui, & pulu. Arist. Irid. Flor. partibus callosis imposui, vulnus cerato diachalciteos & fascijs decussatis obligauit, & pedem in suum canalem collocaui, ita vt, obseruata optima victus ratione, & vsu pulu. Rhab. iterum callus pedi inductus, & pristinæ sanitati restitutus fuerit, & in Annum vsque 1645. quò hæc scripsi, sine baculo ambulare potuerit.

OBSERVATIO LXXXII.

Excrescentia carniarum.

EXcrescentia carnis in viceribus digitorum manus & pedis, citò consumuntur, puluere cum filamentis carptis appositò:

R. Capit. Mort. Vitr.

Spongiz comb. ana 3j.

M. F. Puluis.

quibus consumptis, vlcus cerati diuini auxilio cicatricem acquirit. Adolescens octodecim annorum conquestus est de magna gingiæ superioris excrescentia, quam, post totius procurationem, filo tenui paulatim adstricto excidi. Ablata carne æger per octiduum singulo mane fricauit dentes puluere Magistrali (cuius 3j. addita fuit 3j. aluminis crudi.)

R. Terræ porzell. ʒiv.

Lign. aloes.

Santal. citrin. ana ʒj.

Mosch. ʒj.

(Rcos)

Ireos. ʒj M.F.P. dentifr.

& lauis. os. seq. decrpto:

℞. Alum. Roche ʒij.

Balaustior.

Rosar. rubr.

Myrtillana p.s.

Bugui. pj.

Bul. in ℥q vin. rub. S&q. ad ʒjs &.

colentur pro collutione oris.

OBSERVATIO LXXXIII.

Perniones exulcerati.

Innumeros à pernionibus exulceratis curatos vidi, ipsiusque per multos curavi linimento sequenti, quod Iohannes Preucotius, in sua Medicina pauperum, merito commendat:

℞. Fol. Tabac.

Cortic. med. samb. ana Mj.

Rad. alphod. alb. Min. incif. ʒj.

Ol. communis ʒj.

Coquantur lento igne, ad consumptionem totius humiditatis, & facta forti expressione, adde

℞. Thur. subtiliss. pulu. ʒß.

cere flau. ʒvj.

M.F. Linimentum.

perniones narium, aurium, manuum & pedum exulcerato cicissimè sanans.

OBSERVATIO LXXXIV.

SICILOMATA UTINUSQUE MANUS.

ANno 1628. Iohanni, Fratris mei Martini filio, in externo sinistræ manus metacarpo, propè indicem exortum est tuberculum, cui primo, cum ganglij figuram referret, ac sine omni fructu, arctè superligavi laminam plumbeam. Anno 1629. puer

T

tempore

tempore Bacchanalium iudavit in Balneo publico, & vesperi domum veniens correptus est ingenti manus totius inflammatione, quæ sub calida agni pelle efficaciter alias resoluente, ad suppurationem venit, & scalpelli Tab. XII. Figur. IV. operam requisivit. Abscessu debite aperto, materiaque purulenta & sebacea expurgata, vulnus per carnis generationem curavi. Autumno eiusdem anni, alius tumor comparuit in eadem quidem parte, sed propè carpum, qui paulatim crevit, & resolventibus tractatus, similiter degeneravit in abscessum ferro incidendum, quo inciso, prodie materia ex seuo & pure pariter commixta, & vulnus medicamentis de in sarcoticis & epuloticis appositis brevi curatum fuit. Anno 1630. circa æquinoctium vernale, in vtriusque manus metacarpo suborti sunt tumores sebacei, qui assumpto decocto sudorifero, cuius basis erat radix sarsaparilla, insensibiliter, & citra topicum, fuerunt resoluti. Anno 1631. tumores exorti sunt in carpi & metacarpi vtriusque lateris pluribus locis, qui in magnitudinem nûcis iuglandis excrecentes inflammationem causerunt, & abscessus, qui scalpello facta via, materiam superioribus similibus profuderunt. Anno 1632. tumores illi inuaserant cubitum utrumque: quapropter demum suam curam sudoriferam, à qua patiens ad iudandum valde difficilis, planè abhorruit. Suppuratos igitur ferro incidi, materiaque sensibilibus educta, vulnera per duos menses aperta detinui, impositis turundis, lauando interim manus quotidie per horam in aqua ex puteo villa propè Vlmam, Stribulina calefacta, easque spongijs in voluendo, donec reliquijs discussis membra affecta prius robur acquirerent. Hac aqua puer, in cuius manibus extremis viginti quatuor abscessus scalpello allegato incidi, plurimaque ossicula corrupta Acantabolo exemi, ab ulteriore recidua præseruatus omnes manuum functiones, cit a vllum impedimentum, obiit, singulo trimestri puluerem phlegmagogum assumens.

OBSERVATIO LXXXV.

Fractura femoris cum vulnere.

ANNO 1642. Die 22. Octobris, Vlmæ saccus tritico repletus et altissimis adibus viti Nobilissimi Do. Erhardi Schadei decidit, prætereuntis Catharinæ Beckhii, Giengenensis femur in medio fregit, ita ut inferior ossis pars per cutim prorumperet, & patiens ob insignem, cum femoris tum dorsi, dolorem animo delinqueret. Agra in Xenodochium delata, variis per medicamenta interna & externa:

Ag.

R. Aq. cerat. nigr. ʒiij.

Rosar

Borrag. ana ʒj.

Cinam. ʒij.

Spir. Cephal. Anhalt. ʒi.

Magist. corall. ʒss.

Man. Christ. perlat. ʒß.

M. ad virum, & sign.

Aqua corroborans.

R. Aqua Odoris. Fuchsi ʒi.

ros. ʒß.

Acet. rutac. ʒ ii. M.

Pro aqua naribus & pulsibus admouenda)

collectis, & facta femoris in diuersa extensione Tab. xxvii. Fig. viij. partes fractas citra scalpri beneficium composui.

Fracturâ compositâ, ossi fracto admoui puluerem ex radicibus Iridis Florentinæ & Aristolochiæ rotundæ, vulneri imposui turundam ex stappa cannabina cōfectam & unguento stegnotico (quod parauimus ex puluere adstringente Galeni, & albumine oui subactis) imbutâ, ad sistendum sanguinis fluxum. Exterius femur obligavi tribus fasciis & sufficiente spleniorum numero (vid. supra Tab. xxix.) munitum in canalem deposui. Tab. xxvii. Membro bene composito, propter dolorem totius pedis affecti ac dorsû, & imminens inflammacionis periculum, Chirurgus Xenodochij patienti venam medianam sinistri brachij incidit, & ʒiv. sanguinis emisit. Die secundo & tertio conquesta est de dolore dorsû & ardore vrinę. Die 4 & 5. patiens sine querelis ad interrogata respondit, sed quia corpus fuit constipatum, Medicus Xenodochij ordinarius præscripsit aliquot bolos ex elect. Lenitijs. ʒi. qui dum formabantur, menses fluere cœperunt. Die 6. 7. 8. 9. nihil quicquam circa fracturam sensit doloris, de leuissima saltem tussicula, & maximo ad partes obscenas plurimu, conquerens. Quapropter vsa est sæpius de die mixtura ex syrupo violarum, de liquiritia, & tinctura rosarum. Dorsu & partibus obscenis prurientibus, post somentationem ex aqua dulci, adhibui album coctum & linimentum simplex. Die 10. religatum femur, cerato diapalmæ perforato, tribus fasciis pettulis, & sufficienti spleniorum (fascia prius ex vino rubro exprimebatur) ac ferularû numero iterû inuolui; vt hæc ratione vulnus, citra fasciarum solutionem, vrgente necessitate quotidie inspicere potuissem. Venter infimus vt maxime fuit tumidus, & ab umbilico vsque ad pubem valde durus, cui per triduum applicui cataplasma ex puluere maluæ, micâ panis, lacte & butyro non salito paratum. Die 14. tumor & durities infra

veniens decreuit & remisit. Patiens, ob abscessum in clunibus suppuratum, conquesta est de stranguria & atrocissimo dolore circa os sacrum. Die 20. rupto abscessu, & deterso vlcere stranguria & dolor predictus euauuit: sed quia vlcus clunium quotidianam requirebat medelam, membrum fractum in sua quiete permanere minimè potuit, vsque in diem 30. quo patiens benè habuit, planè de nihilo conquerens. Die 40. nouus futoriebatur abscessus sub poplite, qui ad suppurationem vergens maximè doluit, rursusque foetidissimam materiam effudit. Quia de causa per siphonem inieci decoctum ex radicibus Iridis Florentinæ & Aristolochiæ rotundæ, Herba scordij, Veronicæ, cardui benedicti, & melle rosato despumato, à quo dolor vehemens, & fœtor grauissimus, omniò cessauit. Fracturam iterum tractaui medicamentis ossi & vulneri conuenientibus, Cerato diapalmæ, fenestræ fascijs, splenijs oblongis, ac ferulis. Die 60. de tali tantoque circa vulnus dolore punctorio conquesta est, vt præ lachrymarum effusione vix loqui potuerit, dixitque se spectrum, quod in Xenodochi versario falsò creditur, nò solum per plures noctes vidisse, atque hinc totum corpus cum lectica tremuisse; & dolorem originem traxisse. Sed ego existimo, ortum esse dolore partim ex ulcere clunium, quod quotidie debuit expurgari, & ob hanc rationem membrum fractum & compositum in quiete non permansit: partim, ob portionem ossis, quæ in huiusmodi casibus, circa hoc tempus, solet abscedere. Die 18. Ianu. Anno 1643. conquesta est de acerbissimis doloribus circa vulnus femoris. Rehgate femore, inspectoque vulnere, specillo obruso inueni frustulum ossis acutum, quod carnè perpetuò pupugit, & dolores acutissimos excitauit. Ideo statim vulnus scalpello sufficienter dilataui, & Die 19. separatâ ossis partè vossellæ dentibus arripui, & apprehensam extraxi, Tab. xxvii j. Fig. ix. Die 20. totum crus minus erat, quam diebus præteritis, & dolor pungitiuus omnino intermisit. Post ossis abscessum femur ascia in crucem adducta Tabul. XXVIII. Fig. X. deligauì vsque ad perfectam vulneris sanationem. Mense Februario, vlcere poplitis nondum consolidato, patiens mediante instrumēto ferreo claudicans ambulare cœpit. Die 18. Martij 1645 absceisit ossis portio ad magnitudinem digiti annularis. Die 30. vlcus cicatrice fuit obductum.

OBSERVATIO LXXXVI.

Spina ventosa.

Excellentissimus Spigelius Monacho cuidam Bononiensi, pollicem sinistræ manus, spina ventosa corruptum, forfice Tab.

XX.

XX. Fig. I. & Tab. XXXII. Fig. VIII. abscedit, manuique mutilatæ, ad
sistendum sanguinem, & prohibendam inflammationem plagulas
stegnotico imbutas, & vesicam oxycrato expressam applicuit, cubi-
tumque fasciis, ad flexuram vsque inuoluit. Consistente sanguine,
vltus medicamentis detergente mundificauit, & epulotico diuino
consolidauit.

OBSERVATIO LXXXVII.

Fractura cruris cum vulnere.

ANno 1643. Die 5. Decembris hora septima post meridiem,
Matthæus Ritter iunior, Vlmæ cecidit ex hyperthra pensili, &
fregit tibiam sinistram, spatio 4. digitorum transversorum supra
caput inferius, cum vulnere, ossisque denudatione & prominentia
in partem anteriorem. Reposita per solam extensionem fractura,
dolor antea vehementissimus statim remisit. Crus itaque affectum
& fractum tribus fasciis (Tabul. XXIX. E. E. G.) splenisque (eius-
dem Tabulæ. H.) deligauit, & in canalem (Tab. XXVI. Fig. II.) ritè
deposui. Inter dehgandum patiens, ob imminens animi deliquium
sepius cochlear aquæ corroborantis, quod constabat ex sequentibus
assumpsit:

℞. Aq. Ceraf. nigr. ʒij.

Pimpinell.

Rosar. ana ʒj.

Cinam. ʒj.

Spirit. Ceph. Anhalt. ʒss.

Pulu. Magist. Corall. rubr. ʒss.

Margar. præp. ʒj.

Lapid. Chryl. præp. ʒss.

Manus Christ. perlat. ʒiij. misc. ad vitrum.

Die 6. Decembris ob medicamentorum vsum, dolor ex fractura om-
nino euauit, & patiens vsque in quartum decubitus diem benè ha-
buit. Die 9. religato & inspecto vulnere nullum aderat inflammatio-
nis signum, nullusque dolor: quapropter ossi tibie filamenta arida
labijs plagæ digestium:

℞. Resin. Therebint. lot. in aq. plantag. ʒss.

Pulu. rad. aristol. long.

irid. Florent. ana ʒij.

Syrup. de ros. sec. ʒij.

Vinell. oui q. s. misc.

T 3

desup

desuper ceratum diapalma, fascias & splenia adhibui. Die 10. æger vsus est Enemate laxatiuo, & abhinc vsque in septimum decubitus diem pulchrè habuit.

Die 13. in religato vulnere pus bonum & coctum apparuit, nullusque dolor aut inflammatio, quæ alias huiusmodi fracturas comitari solent, ægrum affecit: vnde fracturam ipsidem medicamentis curavi atque crus cerato dicto, fascijs, plagulis & ferulis (quia timor inflammationis iam præterijt.) Tabul. xix. Fig. vi. deligatum, in canalem deposui. Die 16. iterum religato & inspecto vulnere, omnia rectè habuerunt, nullus enim dolor adfuit, tumor nullibi apparuit, & ex vulnere pus laudabile in parua quantitate emanauit: quapropter ossi à membrana sua detecto, inpersi puluerem ex radicibus Aristologiæ longæ & Iridis Florentinæ, vulneri sarconicum adhibui, & crus diapalma, fascijs, splenijs ferulisque iterum inuolui. Hoc die lusu chartis, canalem huc & illuc mouit, atque totam tibiam in sinistram partem distorsit. Die 17. manè conquestus est de compressione canalis sub genu in parte exteriori, infra caput fibulæ. Inspecto crure extuberantiam aliquam animaduerti, religato vulnere, tuberculum terigi, & obliquam fibulæ fracturam inueni, quam procul dubio natura consolidasset, si tibiam semper immotam seruasset æger.

Die 20. adhibui laminam ferream, vt extuberantiam fibulæ aliquantisper ad tibiam pelleret, quod etiam præstitit, sed frustulum ossis abcessurum esse prædixi. Fracturæ tibie, quæ bene habuit, puluerem Iridis Florentinæ cum filamentis carptis & aridis imposui, torumque pedem cerato diapalmæ, fascijs, splenijs ac ferulis obligatum in canalem deposui. Die 25. pariens conqueritur de fractura fibulæ, quæ inspecta inuenio ossiculum, quod cutim nonnihil pupugit, vnde ceratum, splenia & fascias, aliquantulum in dextram partem abduxi, vt dolor ex ossicula pungente remitteret. Die 6 Ianuar. Anno 1644. fracturæ tibie confirmari cepit, & fibulæ ossiculum in conspectum venit cui puluerem Iridis Florentinæ & Aristologiæ longæ, cum filamentis decerptis, adhibui, atque crus cerato diachalcite, splenijs, lamella ferrea, & fascijs obligavi, vt pes pristinam rectitudinem acquireret; Die 16. Ianuar. vulneri tibie applicui filamenta carpta, ceratum diapalmæ, fascias, splenia & ferulas. Fractura fibulæ, pus album & coctum fudit, asperum ossiculum forcipe abstuli, & crus velut diebus præteritis obligavi. Die 5. Febr. natura fibulæ separauit ossiculum, & substantiam carne iam obduxit, quapropter vlcus filamentis carptis, cerato diuino & fascijs laxè obligavi, partemque affectam in canalem debitè reposui. Die 25. ob excrecentiam carnis vlceri inpersi puluerem aluminis vsti, quæ consumpta, Die 4. Martij aliud fru-

Crustulum ossis extraxi, vlcus filamentis siccis & cerato diuino tractavi, partemque integram, vt diebus præteritis obligatam deposui. Die 24 ob inordinatam vlcus rationem pus fuit viride; & vlcus serpsit: vnde sequens vinum laxatiuum ordinavi:

℞ Radic. Gramin.
Irid. Flor. ana ʒis.
Herb. Beton.
Veron.
Cent. min.
Borrag.
Absynth. ana p. ʒ.
Fol. sen. Alexand. l. st. ʒj.
Rhab. Elect. ʒij.
Agarie. troch. ʒij.
Hermoadactilor.
Turbit. ana ʒis.
Semin. carth. cont. ʒij s.
Semin. anil.
fœnicul. ana ʒis.
Crem. Tart. ʒij.
Gingib.
Galang. ana ʒj.

Incisa & cons. indantur sacculo, qui in vini albi mens. j. infundatur:
de hac infusione patiens alternis diebus, duabus horis ante prædium, sumpsit ʒijss. Abusu huius vini medicati æger bene habuit, & vlcus pus coctum, album ac minimè fetidum generauit. Die 14. Aprilis patiens optimè habuit, atque ob vulnus cicatrice obductum grillæ opera subnixus ambulare cepit. Die 4. Maij æger letissimus grillam deposuit, & minimè claudicans incessit.

OBSERVATIO LXXXVIII.

Atheroma in femoris parte externa curatum.

Huestissima Virgo Margaretha, cuius cognomen honoris gratia silentio inuoluendum existimo, triginta annorum, temperamenti calidi & sicci, conquesta est vndecim annos de tumore citra dolorem duro, qui sua magnitudine ouum gallinaceum superauit, in femoris dextri parte syluestri inter masculum glutæum

T 4 appel-

appellatum & cutis exortus. Hic autem cum esset tunc tunicatus, neque internis neque externis medicamentis cedere vellet, facto prognostico, quod huiusmodi tumor non nisi chirurgia feliciter curari queat, præparatum antea corpus ab humoribus purgavi, & Anno 1641. die 26. Maij tumorem sequenti modo exemi. Primo cutim atramento in cruce signavi, deinde atramento exsiccatum super lineam cutim in quatuor angulos rectos scalpello Tab. II. Fig. I. secui, donec folliculus in conspectum veniret. Sectione solius cutis in cruce facta, & sanguine spongia nonnihil deterso, quatuor curis angulos, à subiecta tunica paulatim specillo separavi vsque ad basin, ubi erat vena quam absceidi, & tunicam tumoris integram volsella extraxi: remoto citra lationem folliculo, vulneris labia statim ad mutuum contactum adduxi, & albumen oui agitatum cum pulv. adstringente Galeni apposui. Obligato vulnere, folliculum dissecui, & in eo materiam puliculæ similem inveni. Die 28. Iulij vulnus cicatrice fuit obductum, & patiens pristinae sanitati restituta.

OBSERVATIO LXXXIX.

Vulnus carpi cum latione arteria.

ANno 1631. Mense Decemb. *Iohannes Moser*, Sartor (anno ætatis 24.) temperamenti calidi & humidi, circa carpum & radium finitrix manus, à discipulo suo adeo vulneratus est cultro, ut non solum vena, sed etiam arteria per transuersum incisa fuisset, quam magnus sanguinis fluxus, & alia sæva symptomata, subsequabantur. Hoc vulnus statim Chirurgus *Nicolaus Reutte* iuxta præcepta chirurgica obligavit. Secundo die sanguis tam copiose effluxit, ut totum ægroti corpus, ob spirituum vitalium defectum, motibus convulsivis agitaretur. Ad vesperam ipsi subducta fuit alius, iniecto clystere leniente, à quo ter deiecit. Tertio die incisa fuit vena iecoraria dextri brachij, & eductus sanguis ad 3iv Quarto dum obligaretur vulnus, nihil sanguinis ex ipso manavit. Quinto ob oris amaritudinem æger vsus est sequenti syrupo cathartico:

℞. Syrup. ros. sol. ʒiiss.

Extra. Rhab. ʒj.

Diacarth. ʒis.

Mag. Tartar. ʒs.

Aq. Cich. q. l. M. F. Syr. liq.

à quo duas sedes habuit. Sexto die conquerebatur de cardialgia & capitis

capitis vertigine, vnde assumpsit Syrup. Acetos. citri & Granar. dulcium vino granatorum, & Aq. Pimpinell. ac cerasorum permixtum, in lipothymia magnum habuit leuamen, ab usu vini granatorum. Septimo die noctem inquietam habuit, dixitque se tota nocte per somnum cum puero, qui ipsum sauciavit, pugnaſſe: &, quod maius est, conuulsus est de sumptibus, & propter illostam melancholicus fuit, vt huc & illuc in hypocausto curreret, à quo motu sanguis ebulliens ex arteria læsa, in omnem dimensionem exsiliit, vt nullo modo sisti queat. Itaque digitis compressa arteria, in media radij parte, extraxi magnam sanguinis concreti copiam ex vulnere. Tandem arteriæ sauciatae spongiolam combustam, & puluere lapid. chrysol. præparatæ adstring. Gal. aspersam, & albumine oui agitato oblinitam imposui, conueniente fascia vulnus obligauit, & instrumentum ex bractea confectum Tabul. XLIII. adhibui, quod obseruari, & cochlea arteriam comprimere citra incommodi metum possit.

Octauo & 9. die quia mane vsque ad mediam cubiti & radij partem inflammata erat, vesperi admisit Enema. Decimo die melius habuit, & pus flauum per fascias sudauit. Die 11. per totam noctem benè dormiuit. Duodecimo die religato vulnere effluxit pus album, & vulnus latius apparuit, ob sanguinis concreti extractionem (vt in aneurismate fieri solet) & impositam spongiam. Tendines quoque perforantes in conspectum venerunt inflammati, & summo cum dolore ad putredinem tendentes. Vulnere igitur, citra spongiolæ extractionem, deterſo, arteriæ medicamenta prædicta imposui, vulnusque fascijs obligatum iterum instrumenti clauo obturaui.

Interim non neglecti fuerunt Syrup. reſfrig. & humectantes. Emulsiones ex Aq. & seminibus appropriatis, Magist. Coral. rub. & Syrup. violar. paratae.

Die 13. & 14. æger melius habuit, inflammatio namque & dolor manus læsæ aliquantulum remisit. Die 15. pus album de vulnere exiuit, manus dolor remissior visus, & tumor eiusdem minor factus fuit, tendinesque calorem naturalem acquisuerunt. Die 16. Dimidiam spongiolæ, quæ arteriæ incisæ orificio adhæsit, partem vellellâ extraxi, alteram vero reliqui ad foramen arteriæ. Die 17. extraxi reliquam spongiæ partem, vulnere applicui modò dicta medicamenta, & ceratum citrinum linimento simplici obductum, carpo fascijs conuenientibus obligato adhibui etiam instrumentum. Die 18. orificium arteriæ conglutinatum, & tendines carne solida coopertos reperi. Die 24. & 25. plaga per ceratum diuinum consolidata, patiens pristinae sanitati restitutus fuit.

OB-

OBSERVATIO XC.

Concussio cerebri.

ANNO 1627. Mense Nouembri, Iohannes Oemlim, Oppin-
 gensis ex agro Vlmenſi, ſamulus cuiuſdam ruſtici, tempe-
 ramenti calidi & humidi, ante menſem in ædibus Marci
 Fehels fuit, in quibus more loci iuuenulæ, ſive ancillæ filium duxe-
 runt penſumque ſuum abſoluerunt. Hic verò noſter Iohannes, tunc
 temporis in illo hypocautto cum aliqua illarum iuuenularum luſit,
 quod ipſi à reliquis præſentibus interdictū fuit, vt nugas relinqueret,
 ſonſt iuerdeihm der Baum geſteht iuerden, cuius proceſſus huc eſt:
 Detinent aliquem corpore inuerſo, vt capite reſpiciat terram; pe-
 dibus verò ſuſpendunt, & ſubito iterum remittunt, vt terra capite
 quatiatur: quod & perpetrarunt in hoc ægrotō, vſque dum ſanguis
 è naribus & auribus deſluxerit, atque humi proſtratus mortui inſtar
 iacuit. Videntes prædictæ iuuenulæ dubium hunc actum, ipſum
 illico aqua frigida aſperſerunt, quo reuocentur illius ſpiritus. Hic
 aqua perſuſus, quaſi à morte reuocatus, ſurrexit, magnoque ſiniſtri
 brachij, ac totius capitis dolore diſceſſit. Secundo die, perſiſtente
 hoc capitis ac brachij dolore, æger nihilominus frumentum venti-
 lauit. Tertio & quarto peius habuit, ira vt propter febrem & morus
 conuulſiuos lecto decumbere coactus fuerit. Sexto morbi die, curra
 petijt Oppingam. Septimo mater accerſiuit Chirurgos. Decimo,
 11. 12. 13. & 14. antedictis conuulſiuis moribus vexabatur. Die 15.
 mater decumbentis vrinam tranſmiſit Clariff. D. D. Kleſſattelio:
 Medico Geſlingentium indefeſſo, qui præſcripſit puluerem contra
 caſum ad diſſoluendum ſanguinem grumofum, cum ſyrupo ace-
 toſæ, acetofitatis citri & aqua pimpinellæ. Hinc mutus & ſurdus,
 vſque ad vigeſimum quartum diem, laborauit comate, de qua a-
 phonia ita vaticinatus eſt Hipp. ſect. 7. aph. 58. quibus ocaſione ali-
 qua cerebrum fuerit vehementer concuſſum, muros prætorius fieri
 neceſſe eſt. Loquendi audiendique imotentia ſuperuenit Diar-
 rhæa, quæ per triduum durabat, vbi denud loquentes alios audiuit,
 & ipſe loquens conquieſtus eſt de dolore vehementiſſimo ſiniſtri bra-
 chij circa muſculum deltoideum. Die verò 29. Inclytæ Reip Vlmen-
 ſis decreto contuli me Oppingam, vbi Iohannem inueni valdè con-
 querentem de magno capitis dolore circa futuram ſagittalem & co-
 ronalem, ſiti & febre inſigni, ardore & nigredine linguæ, totius
 brachij prædicti paralyſi & tumore œdematoſo & ſcirrhoſo, qui cir-
 ca muſculum deltoideum ad ſupurationem tendens ægrum maximè
 torſit.

forſit. Qua de cauſa ſtatim reuulſionis gratia præſcripti Eucmæ ſequens.

℞. Decoct. comm. pro clyſterib. ℥ix.
Mell. roſ. ſolut. ℥iſs.
Elect. Diacathol. ℥j.
Ol. chamomil. ℥ij. M. pro Clyſt.

à quo æger quinquies deiecit excrementa bilioſa & pituitoſa.

Capitis bregmati tumefacto applicui cataplaſma digerens & reborans :

℞. Mic. panis domeſt. ℥iiij.
Furf. Tritic.
Farin. hord. ana ℥ij.
Pulu. Flor. roſ.
Beton. ana ℥ſs.
Ol. roſat. ℥iiij.
Vini rubr. q. s.
Salis commun. ℥j.

M. ad ignem in form. cataplaſm.

Scirrhus œdematoſo brachij impoſitum fuit cataplaſma, quod conſtabat ex

Panc domeſt.
Farin. ſem. lin.
Herb. Malu.
Alth.
Lacte & Ol. chamom.
Pro ſiſi vſus eſt.
Syrupo Acetoſur. citri.
Acetoſæ ſimpl.
Granar. ana ℥ij.

cum aq. hord.

mane & veſpeti ſcyphum ſeri caprini depurati ex hauſit. Cibus fuit clemor hordei & panatella, quæ conficitur ex mica panis, iuſculo carnis, & butyro. Potus ad cibum fuit Aqua hordei. Suppurata, poſt aliquot dies, materia in brachio, quæ facilè ex tactu deprehendi potuit, abſceſſum inter muſculum bicipitem & deltoidem ſcalpello aperui, ex quo magna purulentæ materiæ quantitas effluxit. Foramini incifo, ad mitigandum dolorem, rurundam oui vitello & albumine oblinitam impoſui, & deſuper Diachylon ſimplex adhibui, ad ſuppurandas reliquias. Sequenti die religato vulnere ſpecilli globola parte vlcus explorauī, & humeri os corruptum inueni

inueni. Ideò foramen spongia contorta nonnihil dilatari, & dilatato-
turundam digestuo :

℞. Tereb. lot. in aq. scord. ʒiis.

Oui vitell. par.

Pulu. Arist. rot.

Irid. Flor. ana ʒß.

Mell. ros. col. q. s. Misc.

oblinitam imposui. Interea corpus aliquoties purgatum fuit, saccu-
lo sequenti :

℞. Rad. polyp. querc. ʒii.

Irid. Flor.

Cichor. ana ʒiis.

Herb. agrimon.

Beton.

Veron.

Prunell.

Absynth. ana p. s.

Fol. sen. Alex. s. st. ʒis.

Rhab. elect. ʒß.

Agaric. rec. troch. ʒiii.

Scm. carth. excort. ʒß.

anis.

fenicul. ana ʒis.

Crem. Tart. ʒiuss.

Cinam.

Gingib. ana ʒis.

Vuar. pass. ʒiii.

Incul. & contusa ad sacculum, qui infund. in ʒ iv. aquæ mulsæ, de
qua alternis diebus sumpsit ʒ iv. duabus horis ante prandium. Pro
maiore ossis exsiccatione vulneri per siphonem inieci decoctum di-
uinum, puluerem aristolochiæ rotundæ & Iridis Florentinæ. Extre-
rius aliquoties brachio spongiam ex aqua salsa & vino rubro ex-
pressam superligavi :

Die vigesimo propter dolorem capitis vsus est sequentibus cata-
potijs :

℞. Mass. pilul. aur. ʒii.

Extract. coch. ʒi.

Mag. mech. nigr. gr. vii.

cum syrup. de beton.

F. Pilul. paru.

deurentur.

à qui-

à quibus decies deiecit. Die 6^o. frustulum ossis protrusum, & volvel-
la arreptum extraxi, vlcusque postea cicatrice obdixi,

OBSERVATIO XCI.

Manus ob spinam ventosam amputata.

DVm Patavij studijs Medicis operam dedi, & Chirurgiam exer-
cui, Nobilis quidam studiosus laboravit per aliquot Menses
œdemate manus sinistræ, quod, post vniuersalium vsum, sub præstan-
tissimis topicis nunquam diminui, sed tandem in vola exulcerari cœ-
pit. Quapropter adhibuimus in consilium Excell. Spigelium, qui,
postquam vlcus qualitatem specillo explorasset, & os corruptum
retigisset, statim tumorem vocavit spinam ventosam, quæ malum est
incurabile, & amputationem partis affectæ requirit. Provenit autem
spina ventosa ab humore, qui occulta & intensa sua qualitate ossa
primum citra omnem periostij læsionem atq; doloris sensum corro-
dit, deinde œdema efficit minimè dolens, & post aliquot Menses par-
tem exulcerat. Consensu ægri obtento, manum extremam supra ra-
dij & cubiti appendices scalpello falcato ac ferra resecai (Tab. xxvii.
Figur. xi. xiii. & xiv.) cubitoque splenijs, vesica & fascijs (Tabul.
xxviii. Fig. i. ii. iii. iv. v. & vi.) obligato, in parte amputata repe-
ri ossa metacarpi quidem corrupta, sed periostio undique (præter-
quam in illo loco, vbi vlcus) adhuc contexta.

OBSERVATIO XCII.

Vulnus cubiti periculosum.

ANno 1638. Die 24. Iun. in Festo Divi Iohannis Baptiste,
hora septima post meridiem, Nobilissimus Dominus Frederi-
cus à Degenam vulneratus est in duello à Nobilissimo Domino N.
de Bettendorff, duorum digitorum transversorum infra cubiti dex-
tri flexuram, totum brachium inter cubitum & radius perforante,
atque lædente venas & muscutorum tendines cum insigni dolore,
& sanguinis effluxu. Primò vulnus Chirurgus non imperitus,
Iohann. Georgius Bauler, obligavit. Die secundo ante & post re-
ligationem fasciæ nobilissimus patiens conquestus est de vehe-
mentissi-

ment. limo dolore circa foramen vulnēis tam insertum, quam externum, sicut in omnibus articulorum vulneribus fieri solet. Ob id reuulsionis gratia vltus est sequenti Enématē :

℞. Decoct. emoll. ℥ix.

Elect. lenitiu. ℥j.

de succ. ros. ℥ij.

Ol. chamomill.

viol. ana ℥is.

M.F. Clyster.

à quo duas sedes habuit. Tribus horis à rejecto clystere aperta fuit vena mediana brachij sinistri. Foraminibus vulnēis exiguum ex linco turundam medicamento oblitam, cuius descriptio hæc est, imposui :

℞. Aloes succotr.

Thur.

Bol. Armen.

Lapid. Hæmatit.

Chrysl. præp. ana ℥is.

Terr. Lemniæ.

Tutæ præp. ana ℥ij.

Sanguin. dracon. ℥j.

Puluerizata misceantur cum albumine oui subactō in formam vnguenti.

ac brachium oleo rosarum, & lumbricorum terrestrium calidè inunctum, splenio in vino subro expresso, fasciæque duobus capicibus obligavi. Denique vnguentum defensionum Fernelij (quod omnium optimum est) summo humero applicui, & duabus elapsis horis integrum brachium poscà irrigari cutaui. Potus fuit Aqua hordei, vino granatorum gratior redditus, cibis autem cremor hordei, & gelatina ex pedibus vitulinis. Tertio die melius habuit æger, vulnusque propter nouum hæmorrhagiæ metum, non fuit religatum, sed totum membrum postea irrigatum, oleisque prædictis inunctum. Die quarto religavi fascias, turundam verò è vulnere non extraxi, sed apposisis filamentis carptis & vnguento, quod constabat ex albumine & vitello oui, puluereque supra præscripto oblitis, brachium inunxi, ipsique splenium in vino austero expressum & fasciâ adhibui. Vesp̃eri bene habuit æger, & pro cœna sumpsit cremorem hordei, & Endiuia vino granatorum.

rum, oleoque communi conditam Die 5. de nihilo conquestus est p-
tiens, vulnus reliqui & turundam extraxi. Sanguine subsistente a-
liam turundam, eamque breviorē, vitello ouorum imbui, & pulve-
re prædicto aspersam, foraminibus imposui, alæque & summo hu-
mero defensusium applicui, brachiumque oleis inunctum, & splenio
madefacto inuolutum fascia duobus capitibus donata obligavi. Die
6. p- tiens, ob alui constipationem, & dolorem circa flexuram cubiti
assumpsit syrupum laxativum:

℞. Syrup. ros. sol. ʒij.

Flor. call. rec. extract. ʒj.

Sem. citr. pulv. ʒss.

Aq. ciñb. q. s. M.

℞. Syrup. liquid.

A quo quinquies deiecit materiam biliosam & serosam. Vulnus fuit
tractatum veluti die præterito. Die 7. parum puris cocti circa vulnus
apparuit: quapropter vnguento sanguinem sistenti addidi dimidiam
partem thuris pulverizati, ut vulneri caro incretceret,

℞. Pulv. supra præscript.

Thur. aua ʒss.

Vitell. ouor. q. s.

M. F. Vnguentum.

quo imbuatur turunda vulneri imponenda. A die 8. vsque ad 10. æger
perbellè habuit. Die 11. dixit se præteritâ nocte nihil dormivisse, bra-
chiumque propter insomnium graue huc & illuc mouisse, ita ut ex-
ternum foramen aliquid sanguinis denuò effudisset. Subsistente au-
tem firmiter sanguine, vulnus tractavi ut die præterito, patientique
ordinaui sequentem syrup. purgantem:

℞. Syrup. ros. sol. ʒiij.

Extract. Rhab. ʒiij.

Mag. Tart. ʒj.

Aq. ceras. nig. q. s.

M. F. Syrup. liquid.

Die 12. 13. & 14. æger optimè dormiuit, de nulloque amplius circa
flexuram dolore conquestus est, & foramen illud externum, quod
ob nimium brachij motum sanguinem funderet, generavit pus co-
ctum. Die 15. loco turundæ, foraminibus filamenta carpta & sic-
ca appolui, spongiamque nouam & ex vino rubro calido expressam
superligavi fascia duobus capitibus prædita. Die 19. foramina cica-
trice obduxi.

OBSERVATIO XCIII.

Excreſcentia in femore magna.

IOanni Ferher, Hamburgeni, militi Suecico circa vigefimum quatuor suæ ætatis annum, in dextri femoris interna parte, exortum est tuberculum, quod biennij spatio in tantum increvit, ut sua magnitudine facillimè tria capita humana æquaret, & ægri ingressum impediret. Hanc excreſcentiam empiricus quidam caustico corroſit, ut materiæ exitum procuraret, vlcus postmodum eputoticis consolidaturus, sed cum nullam inueneret materiam fluxilem, empiricus aufugit, & ægrum omni auxilio destitutum reliquit. Pateriens Anno 1634. Vlram venit, ibique Chirurghi Iohann. Georgij Bauleri operam implorauit, qui cum nullis medicamentis vlcus scdum consolidare potuisset, meo Georgijque Riedlini consilio, natam exulceratam & valdè dolentem forſice apprehendit, & cauterijs cultellaribus abſcidit, escharaque ablata vlcus cerato diuino ad cicatricem pulcherrimam perduxit. Vid. Tab. xxxv. Fig. II. fol. 43. Inspecta natæ reſectæ substantia, quæ omnino erat carnoſa ſuiſque venis & arterijs prædita, quæſiuimus ex patiente, an à natura tam macilentus fuerit; hic reſpondit, se ante huius natæ exortum & augmentum corpus habuisse medioeriter crassum. Ex qua reſponſione fuimus edocti, quod excreſcentia omne ferè alimentum, quo totum nutriti corpus debuisset, per venas & arterias obſeruatæ attraxerit. Reſtituto iamiam Vlma diſceſſuro conſului, ut moderato victu uteretur, ſinguliſque menſibus dorſo ſex cucurbitulas ſcarificatas adhiberet, donec corporis habitus paulatim iterum aſſueſceret ſanguinem ſibi aſſimilare, quem natura prius ad nutritionem tumoris tranſmittere conſuevit. Hoc conſilium iuuenis per ſeſtreſe diligenter obſeruauit, & poſt hac incolumis vixit vſque ad Ann. 1644. quo ſub exercitu Bauarico militans me viſitauit, & pro datis conſilijs magnas retulit gratias.

OBSERVATIO XCIV.

Vulnus ſclopæti cum fractura tibia.

ANNO 1644. Die 31. Maij hora 6. poſt meridiem Leonardus Denſeler, Bubalculus Vlmenſis, læſus eſt plumbea ſclopæti glande, quæ non ſolum ſiniſtram tibiã paulo infra genũ ſregit,

frēgit , vt os extra vulnus prominere ; verum etiam crus dextrum sine ossium læsione perforauit . Rebus ita habentibus , prima visitatione, partibus affectis (ob medicamentorum aliorum defectum) sequentia fuerunt adhibita . Dextro cruris vulnere oleum violarum, albumine oui mixtum , siphone inieci , turundasque exiguas & eodem medicamento imbutas imposui , desuper ceratum diapalmæ , cataplasma (ex farina hordei & maluarum , mica panis , & lacte paratum) & fasciā duobus capitibus præditam adhibui . Sinistram deinde tibiā , quantum possibile fuit , composui , & albumen oui oleo violato concussū infudi , & foramiuibus turundam ex filamentis aridis contortam inmisī , desuper diapalma , atque prædictum cataplasma applicui , pedemque fascijs serratis (Tabul. XXVII. Figur. I. & Tabul. XXVIII. Figur. X.) obligatum , in canalem ritè deposui , Die 1. Iunij, frustulum ossis , quod carnem & cutim pupugit , & ægrum tota nocte inquietum reddidit , forfice (Tabul. XX. Figur. I.) abscidi Osse abscisso , foraminum interstitium cutaneum syringotomo (Tabul. XIV. Figur. II.) incidī , vulnusque hac ratione dilatarum digestiuo repleui .

℞. Resin. Terebinth. lōr. in aq.

Plantag. ʒiij.

Olei lumbric. terrest. ʒis.

Vitell. oui j.

Mell. ros. col. q. s.

M. pro digestiuo.

℞. Rad. Aristol. rotund.

Irid. Flor. ana ʒj.

M. F. Puluis,

Ossibus aspersi puluerem , filamenta arida apposui , carui vero digestiuo oblita : deinde vulneris labia cerato diapalmæ obtexi , pedemque cataplasmate & fascijs serratis obligatum , denuò in suum canalem deposui . Interim patiens ob animi deliquium per interualla sumpsit cochlear vnum vel alterum sequentis aquæ cordialis :

℞. Aq. ceras. nigr.

ʒij.

Borrag.

Rosarum ana ʒj.

Cinam. ʒij.

V

Spir.

Spir. Cephal. Anhalt. \mathfrak{z} is.Mag. Corall. rubr. \mathfrak{z} ij.Man. Christ. perlat. \mathfrak{z} ß.

Misc.

Ad extinguendam sitim præscripti Syrupum refrigerantem:

 \mathfrak{R} . Syrup. Acetof. simpl. \mathfrak{z} ij.

Granar. acid.

Acetofitar. citr. ana \mathfrak{z} is.

quo miscuit aquam hordei pro potu ordinatam. Deinde propter præsentem dolorem, atque inflammationem imminentem, vñs est Enemate refrigerante & humectante: quo reiecto, Barbitonfor venam medianam dextri brachij incidit, & sex uncias sanguinis emisit. Die 2. Junij, æger aliquantulum melius habuit. Die 3. Junij, cum præterita nocte ob aliud ossis frustulum, quod carnosas partes maximè pupugit. inquietè dormiisset, illud modiolis ex-eidi, ossi reliquo pulverem præscriptum inspergens, & labijs digestium apponens. Æger eodem die, ob constipationem ventris, & maximum humorum ad partes læsas decursum assumpsit portionem medicam:

 \mathfrak{R} . Syrup. ros. sol. \mathfrak{z} ij.Elect. Lenitiu. \mathfrak{z} vj.de succ. ros. \mathfrak{z} is.

Decoct. fl. & fr. q. s.

M. & F. sec. art. potio.

à qua quinq̃ies deiecit biliosam & serosam materiam. Die 4. melius habuit, quam die præterito. Die 5. conquestus est de doloribus colicis, quare ipsi exhibui Ol. amygd. dulc. \mathfrak{z} ijss. cum brodio florum chamomillæ, à quo dolor cessauit. Die 6. cum alius denuò esset constipata, assumpsit potiunculam nuper præscriptam, à cuius operatione patiens optimè dormiuit. Die 7. post es-haræ casum, vulnus obligavi digestiuo sine oleo, & loco cataplasmatibus, ferè integrum crus cerato diapalinx perforato, & fascijs sestratis inuolui. Die 8. vulneribus imposui sequens digestiuum.

 \mathfrak{R} . Resin. Tereb. lot. in Aq.scord. \mathfrak{z} ijj.

Pulu. radic. irid. Flor.

Atistol. rot. ana \mathfrak{z} j.

Aloës.

Myrrh.

Thur.

Thur. mascul.

Bol. armen. præp. ana ʒj.

Balsam. Peruvian. ʒj.

Syrup. de ros. sicc. &

Mell. ros. col. ana q.s.

M. in form. linimenti.

Die 9. patiens, quod pedes attinet, benè habuit, sed iterum conquestus est de dolore colico, qui, post spontaneam biliosæ materiæ per aluum euacuationem, cessauit.

Propter vulneris sctorem siphone decoctum diuinum inieci. Die 10. æger benè habuit, & vulnus tibix sinistræ sudit pus coctum, sub tibia fracta obseruavi particulam ossis putridam, quam decocto diuino laui & puluere appropriato obtexi: dein vulnus linimento præscripto, & cerato diapalmæ obligavi. A die 15. æger benè habuit vsque ad trigesimum, quo sinistræ tibix os in superficie & externa sui parte sese desquamauit. Vulnus dextræ tibix ad cicatricem tendit. Die 17. Iulij, frustulum ossis separatim velsella extraxi. Vulnus tibix dextræ cicatrice fuit obductum. Die 15. propter inordinatam victus rationem conquestus est de insigni dolore sinistri pedis, duorum transuersorum digitorum supra genu. Religato vulnere, deprehendi abscessum, qui digiris pressus magnam puris quantitatem effudit. Die 16. patiens sumpsit pulcrem, propter amaritudinem oris.

℞. Rhab. elect. ʒj.

Mechoac. nigr. ʒj.

Crem Tart. ʒss.

M.F. Puluis.

à quo sæpius deiecit materiam biliosam & inde melius habuit. Die 25. Augusti extraxi frustulum ossis, quod longitudinem digiti minimi æquaret. Die 14. Septembris sub genu & circa anteriorem parallelè pattem alius apparuit sinus, quem, cum per foramen superius expurgari non potuisset, instrumenti Tab. XIV. Fig. V. cuspidè inccrato perforavi, & euacuata prius materia, spongia in viuo expressa, fasciæque duobus capitibus agglutinaui. Post agglutinationem sinus, vulnus paucissimis diebus cerati diuini opera cicatrice obdixi, ita ut patiens die 4. Octob. sine grallis ambulare, & mense Decembri suo citra impedimentum officio fungi cæperit.

OBSERVATIO XCV.

Fractura femoris.

ANno 1644. Die 24. Decembris *Ioanni* Ariesinger cauponi Grimelsingenſi, dum ligna ex ſyluis veheret, plauſtrum lignis onuſtum ſemur ſiniſtrum cum vulnere fregit. Ager rheda delatus eſt Vlmam, vbi chirurgi *Ioh. Medenried* & *Georgius Riedlen* ſemur vulneratum obligarunt. Die 27. ob maximum femoris dolorem atque inflammationem in ſubſidium vocatus, primo ad agrum ingreſſu quaſiui, vtrum vulnus ab oſſe factum, an verò à ſtipite proueniat. Patiens & chirurgi vulnus ſtipiti adſcripſerunt. Cum autem indicafſem, hoc plurimum ad curationem femoris facere, & ex femoralibus addiſci poſſe: ſi enim perforata fuerint, vulnus proficiſci ab extra; ſin minus, ab intra. In femoralibus autem nullum foramen inuenire potuerunt, ex quibus clarum fiebat, vulnus à fracto femore fuiſſe inſlictum. Itaque femoris extenſi fracturam compoſui, integrum ſemur tribus faſcijs perforatis (vt vulnus magnum quotidie expurgari poſſit) & medicamento idoneo (oleo ſcilicet roſarum, albumine ovi agitato, & aqua roſarum) ad inflammationem depellendam & dolorem nimium mitigandum inſuccatis obligami, & in ſuum canaleſ depoſui. Die 28. ob inquietam noctem, & amaritudinem oris ager uſus eſt ſyrupo liquido.

R. Syrup. roſ. ſol. ℥ij.

Extract. Rhab. ℥iv.

Diacarth. ℥ij.

Mag. Tart. ℥j.

Aq. cichor. q. s.

M. F. P. breu.

à quo aliquoties deiecit materiam bilioſam. Die 29. ſecta fuit vena mediana ſiniſtri brachij & eductus ſanguis ad ℥viij. Veſperi patiens ſumpſit hauſtum emulſionis ſyrupo violaceo edulcoratæ. Illam noctem quietiſſimè patiens tranſegit, & inflammatio cum dolore ceſſauit. Curata inflammatione, calli generationem ligaturis, medicamentis externis, & conuenienti victus ratione, procurauit: patiens tamen claudicat in hunc uſque diem, quoniam natura valdè iratus pedem canali impoſitum inquiete nunquam detinuit, ſed nunc huc nunc illuc mouit. Nec mirum eſt, quoniam, vt in fracturarum cura monui, aduſiores in femore fracti, etiamſi obe-

obedientissimi fuerint , rarissimè (& quidem tunc , quando semur beneficio instrumenti glossocomi Galeni Tabul. XXI. Figur. IV. seruetur extantum , si non per totum curationis tempus , saltem , dum excrementa alui deponit æger , aut ip si sternitur lectus) citra claudicationem curantur .

OBSERVATIO XCVI.

Tinea capitis , cubitus convulsus .

Virgo quædam Ulmenfis , anno suæ ætatis duodecimo , ob consuetam narium hæmorrhagiam suppressam , nimio mensium fluxu laboravit , coque restricto de horrenda capitis tinea & molestissima sinistri cubiti convulsione (quem extendere minimè potuit) valdè conquesta est . Purgato igitur corpore per pilulas de nitro Tralliani repetitis vicibus assumptas , & promotis iterum mēstruis , caput inunxi quotidie semel linimento de aniantho (quod ex historiæ lapidum & gemmarum Anselmi Boetij l. 2. c. 204. ipse paravi) cubitum verò bis vnguento Euxæ seu polychresto Spiegelij , cuius descriptio videatur supra Tab. XLIII. fol. 63. quibus vnguentis ægra brevi felicissimè curata fuit .

OBSERVATIO XCVII.

Lepra Græcorum .

ANNO 1641. Die 17. Decembris ego & Clariss. D. D. Ioan. Regulus Villinger , charissimus meus affinis , nobilem quandam Ulmensẽ visitauimus , adeo miseram & aspectu horrendam , vt verbis sufficienter exprimi nequeat . Primo enim non potuit stare pedibus , nisi à duabus ancillis firmata : facie pallida , fronte rugosa & squamosa , oculis concauis , glabris supercilijs , naribus internè à crustis totaliter obstructis , externè verò squamis obsitis , ore tumido & labijs liuidis ; inclinato capite , thorace incuruato , atrophiam laborante , & crassissimis crustis vndique obrecto , Sub axillis non aderant pili . Sic quoque dispositum fuit abdomen , seu infimus venter . Artus etiam macilentissimi , squamis crustisque omniundè cooperti . Apices digitorum , tam manuum quàm pedum , nullum habuerunt sensum , propter insignem erosionem & crustarum crassitiem . Vltimo totum corpus foetidissimum spirauit

uit odorem. His symptomatibus omnibus probè consideratis, affectum nobilis, non Elephantiasin, sed lepram Græcorum appellauimus, & de restitutione multum sperauimus, propterea quod sumptus hic non deessent, neque etiam de obedientia patientis, quæ sanitatem auidè expectijt, quicquàm dubitaretur. Quare ad purificandum sanguinem præscripsimus sequentem sacculum catharticum.

℞. Rad. Polyp. querc.

Enul. camp.

Cichor. ana ʒß.

Herb. Fumar.

Veronic.

Borrag.

Scolopend.

Dentis Leon.

Beton. ana p. j.

Fol. sen. Alex. s. st. ʒj.

Rhab. Elect. ʒß.

Agar. troch. ʒiij.

Mechoac. nigr. ʒij.

Rad. Helleb. nig. ʒis.

Semin. Carth. ʒiv.

Gingeb.

Cinam. acut. ana ʒj.

Incis. & contus. M. ad sacculum, qui per 24. horas infundatur in mensura maiori Mellicratis, de quo postea sumat mane 2. horis ante prandium ʒviij. per biduum: tertio die abstineat à medicamento purgante, & quatuor horis ante prandium, tribusque ante coenam sumat portionem conditi (quod

℞. Conferu. Borrag.

Enul. campan.

ana ʒvj.

Pulu. marg. præp.

coral. rub. præp. ana ʒjs.

Trochisc. de vip. ʒß.

Syr. corall. q. s. M. Pro Condit.)

& superbibat haustum seri lactis caprini optimè depurati. Post reiterationem sacculi purgantis, vsa est balneo aquæ dulcis (herbis alterato v. gr. Fumar. Malu. Veronic. Enulæ Campan.) per horam; postea, deteriso prius corpore se ipsam inunxit sequenti ynguento:

℞. Vng. Pomar ʒij.

Balsam. Perun. ʒij.

Flor.

Flor. sulphur. ʒijs.

Olei Tart. ʒij.

M.F. Vng.

Ab usu dictorum medicamentorum fætor ille magnus & pruritus totius corporis continuus aliquantulum remisit, & crustæ ab apicibus digitorum deciderunt. Ad carnis novæ generationem, quæ fuit erosa in apicibus, admouit vnguentum ex cerato citrino & oleo myrtino confectum. Dorsum ancillæ inunxerunt pinguedine viperina.

Pro potu ordinario bibit decoctum Chiræ. Hic posset aliquis obijcere, hæc patiens laboravit atrophiam totius corporis, cur vta est carne viperina? Respondemus, morbi totius substantiæ cum non curentur nisi medicamenti tota substantia seu occulta qualitate agentibus: Leptra Græcorum est talis morbus, Ergo non curabitur, nisi medicamenti occulta proprietate pugnantis, inter quæ caro viperina non infimum obtinet locum. Die 6. Ianuar. 1642. aperta fuit vena communis sinistri brachij, & vnciæ quatuor emissæ sanguinis, qui in superficie visus est albus, semiuiridis, & putridus, in fundo verò nigerrimus & minimè concretus. Addebat Barbitorios, qui venam incidit, se magnum fætozem percepisse, dum sanguinem emitteret. Hisce peractis, tertia vice vta est sacculo laxatiuo, & condito, in quo trochiscorum de vipertina carni quantitatē adauxit:

℞. Conseru. Borræg. ʒx.

Trochiscor. de vip. ʒiv.

Corall. rubr. præp.

Marg. præp. ana ʒis.

Syr. corall. q.s. pro cond.

quod materiam malignam à centro ad circumferentiam corporis efficacissimè expellit. Cum iam situs remisisset, & ægra dormire incepisset, post assumptionem conditi non amplius bibit serum caprinum deputatum. Spatio quatuordecim dierum bis vta est sequentibus pilulis:

℞. Mass. pilul. aurear. ʒij.

Extract. cochiar. ʒss.

Mag. mech. nigr. gr. vij.

Extra. Helleb. nigr. ʒss.

cum syrup. de beton.

℞. pill. n. xxj. deaurentur.

V 4

à qui-

à quibus decies deiecit. Post repetitum pilularum vsum, pili in supercilijs, sub axillis, & in pube recrescere cœperunt. Rebus ita se habentibus, ob instans mensium tempus, patienti vltiorem medicamentorum vsum interdiximus, & consulimus, vt in posterum menses diminutè fluentes, vel præter spem retardantes 3j. pilularum de Ammoniaco Magistralium promoueret.

℞. Extract. Aloës cum aq. End.

Gumm. Ammon. aceto.

Squillit. diss.

Myrrh. præp. ana 3j.

Mastich.

Spec. diatrion. sant. ana 3j.

Sal. absynth. 3j.

Syrup. de succ. ros. q. s.

M. F. Massa.

His remedijs ægra nobilis pristinæ sanitati fuit restituta.

OBSERVATIO XCVIII.

Inflammationes Erysipelatosa & Oedematosa.

IN inflammationibus Erysipelatosis & Oedematosis simul, quæ vt plurimum artus inuadunt, & magnam sæpè tam Medicis quàm Chirurgis negotium facessunt, nihil præstantius vnquam expertus sum sequenti remedio, quod Excellentissimo Spigelio Chirurgus quidam Germanus, pro summo secreto, vt certè est, communicauit:

℞. Lixiuij ex ciner. sarment. vit.

mediocr. ℥ j.

Nitr. 3js.

Salis commun. 3j.

Aceti ex vino optim. 3j.

F. Mixtura.

quæ, post vniuersalem curam, splenio duplici tepidè excepta, locoque affecto, fascijs strictè superligata, spatio trium dierum, vel ad summum quatuor, insignes tumores, qui etiam periculosam minantur gangrænam, mirè discutit, atque absorbet.

OBSERVATIO XCIX.

Os tibia corruptum & scalpris deraſum.

Milles quidam Gallus, laborauit gonorrhæa virulenta, eaque intempeſtiue per iniectiones ſuppreſſa, aliquando ex equo decidit in ſilices, & crus ſuperficialiter excoriauit. Vlcuſculum remedijs vulgaribus tractatum malignitatem acquirit, & os tibiæ corrodit. His perceptis curam ſudoriferam propoſui, eaque finita crus ſecundum longitudinem ſcalpello incidi, vulnus ſtegnoticis dilataui, os ſcalpro deraſum pulueribus cephalicis obtexi, vlcus vnguento citrino (*quod in ulceribus phagedenicis præſtantiffimum eſt, & mire operatur*) incarnauit, & cerato notiſſimo ad cicatricem perduxi. vid. Tabul. XLIII. ſub Litt. R. Obſeruat. Martini Ochmid, qui euſmodi quoque cruris & oſſis tibiæ corroſionem atque deraſionem felici ſucceſſu ſuſtinuit.

OBSERVATIO C.

Lepra ex eſu carniū leproſarum originem ſumens.

ANNO 1637. tempore Autumnali, Vlmensis Lanio, in medio ferme Viennensi itinere, à venefica quadam hospite, inque diuerſorio, demortui cuiusdam leproſi carnis coctis, menſæque appoſitis tractatus fuit, quarum eſu tota ipſius ſanguinea maſſa infecta, breui temporis interſtitio, proradici inſtar, malignas puſtulas cum defædatione capitis in primis, ad ſuperficiem corporis expulſit, & percepto rumore, quod ſceleſta illa femina, ob plura alia & varia delicta, publicè ſtammis combuſta fuerit, vultuoſus patiens de ſanitatſ ſuæ reſtitutione deſperate cœpit: Nihilominus tamen ne ſibi ipſi deeſſe videatur, chirurgum aliàs exercitarum in conſilium vocauit, qui re non ſatis ponderata ſolis externis vnguētis eundem, ſed inani ſpe, reſtituere attentauit, vſque dum, aliquoties in noſtris obſervationibus citatum, Clariffimum Dominum meum Collegam, Doctorem Iohannem Georgium Gockelium (ex cuius communicatione & hanc curationem habeo) ſummis precibus exorauit, vt hac in parte ſibi gratificari, & extrema renare velit.

Hic pro ſua humanitate, & ægro & chirurgo, ſolidis rationibus demonſtrans, abſque iuge internorum remediorum uſurpatione, ſauit.

sanguineæ massæ per præparantia, purgantia & venæ sectionem exacta depuratione; communicatæ malignitatis mediantibus sudoriferis discussione, hepatis corroboracione, & vel tandem, externorum debita inunctione, huic, etiam nondum radicato, malo, occurrere minimè posse. Quare catnario illi omnem in curando assiduitatem, & diligentiam promissit, modo patiens se in omnibus morigerum præstare velit, quod dum sanctè sponderet, curam sequenti methodo aggressus est.

I. Ordinata victus ratione, præscribendo videlicet cibos optimi nutrimenti, ac omni acredine destitutos, ut in morbi Gallici cura fieri debet; pro potu decoctum ligni Guiaci & sassafras cum seminibus anisi & feniculi debitè præparari curavit. *Primo, ad sudorem mouendum, reseruate, altero vero tanquam debiliori ad siccum compescendam concessit.*

II. Corpus per biduum digestiuo hoc ad expurgationem præparavit.

℞. Syrup. de duab. rad. ʒj.
Cell. ros. col. ʒss.
Crem. Tart. pulu. ʒjs.
Aq. Asparag.
Fumar. ana ʒij.

M. pro defi vna.

III. Vitiosam venticuli saburram, per sequens medicamentum, vino assumptum, remouit.

℞. Merc. opt. dulcif. ʒj.
Croc. metall. gr. vj.
Gut. Gamand. gr. vij.
M. F. Puluis.

VI. Hinc medianam dextri brachij primùm aperiri detractis ʒv. sanguinis, iussit.

V. Per aliquot dies concessa quiete, rursus ad corporis præparationem, quater in iusculo repetitam, accessit.

℞. Pulueris tartari vitriol. ʒss.

dentur doses quatuor & quælibet ad singularem chartam.

VI. Felicitissimè sanguinis mundificationem molitus est per appropinquas pilulas.

℞. Panchym. Crol. ʒij.
Mercur. dulcif. ʒj.
Gutt. Gamand. gr. vij.

cum

cum aq. ceraſ. nig.
Form. pilul. communes.
pro vna doſi.

VII. Acceſſit ad ſudoriſera , vbi æger maximè obediens quotidie in prioris decocti ſaſſaſfras hauſtu , doſin ſequentis hydropici accepit .

Rec. Sulpher. Aurat. diaphor. à gr. xij.
vſque ad gr. xv. F. puluis ad cartulam.

Quare ad quatuor ſeptimanas, tempore matutino ſolum, in lecto per binas horas commorando , largiſſimum ſudorem mouit , excepto ſeptimo quouis die , in quo ſuperius notatus pilulas reiterando aſſumpſit.

VIII. Siniftri hinc lateris vena tacta ſanguinis emanans priori longè purior inuentus eſt. IX. Sordium recrementa laconico abſterſa , & caput appropriatis , altero lixiuio , mundificatum fuit .

Rec. Radic. Byron. ʒj.
Lapat. acur. ʒſſ.
Herb. Marrub.
Menth. Crisp.
Origan.
Bethoniana M ſſ.
Flor. Chamomill.
Rad. Aſar. cum roſa ana
p. ii.
Agaric. crud. ʒſſ.

Crassiſculè la. concifa coquantur in lixiuio communi.

X. Remanentes quædam piſtulæ, in quibuſdam corporis partibus & capite, depulſæ, & omnia externa inquinamenta ſequenti vnguento in fine ſublata fuerunt .

Rec. Vnguent. alb. camphor. ʒi.
Mercur. dulc. ʒii.
Terendo probè M. ad vaſculum.

Sic diuino fauore, patiens mihi maximè notus, decem hebdomadibus feliciffimè reſtiturus , aliquandiu decoctum ſaſſaſfras pro potu ordinario vſurpauit , ita vt per dies vitæ non amplius malum hoc repullauerit.

316 TYPOGRAPHVS LECTORI.

Coronidis loco visum fuit hic adiungere descriptionem Noui Instrumenti Chirurgici pro Vvula abscindenda, quam vir doctissimus Thomas Bartholinus in *secūda sua Centuria Historiarum Anatomicarum rariorum* ante paucos annos publicauit, vnde de verbo ad verbum HISTORIAM LXXXVIII. huc transtulimus.

Incolis Norvegiæ familiaris est Catarrhus, qui hyemali tempestate ad fauces & vuulam destillans, hanc in tantam molem extendit, vt soffocationis periculum afferat, nisi maturè huic malo succurratur. Confugiunt verò medicamentis deficientibus ad manuum operam, forficique quocunque obuio tumentem prolapsamque vuulam abscindunt sine vlllo aut vitæ aut vocis dispendio. Sanguinem autem profluentem statim sedant pulte ex farina & aqua. Domestico morbo vt occurrant nihil non tentant. In quem vltum Rusticus quidam Norvegus Cauutus Thoberni in Diœcesi Bergensi, ingenio minimè plebeio, excogitauit nuper instrumentum singulare, magna celeritate & dexteritate nictu oculi vuulam tumidam excindens, quod ad *Vermium* nostrum magnum non ita pridem transmissum operæ duxi pretium & Lectorum oculis depictum exhibere & breuibus describere.

Lamina ferrea oblonga, & angusta unciarum vndecim longitudine, in extremo manubrio exornatur globulo ad firmiorem apprehensionem, paulatim deinde amplior circa medium fermè duarum unciarum latitudinem acquirit, hinc adscendens quadratam constituit capacitatem vnus vnciæ cum dimidia longitudine, cui inseritur lignum planum ad linguæ deprimendæ figuram efformatum, doctumque, tres circiter uncias longum, in extremitate rotundum. Per ambitum circularem rima præditum profunda pro ferro acuto & incuruo recipiendo, quod ferrum machinis quibusdam ab altera parte laminæ extendi & exseri pro libitu potest, ac vuulam abscindendam comprehendere inter ferri aciem & laminam ligneam. Altera huius instrumenti facies clauum habet mobilem, qui ferreum funiculum vna extremitate sibi annexum extendit vel retinet retractum donec laxari vsus postulat. Retinacula duo huic clauo adherent, quorum vnum extensum firmat clauum, alterum compressum laxat.

Interiori fasciæ machinæ bellicæ speciem refert, exteriore verò plana spatulæ similis, quæ nonnihil incurua & linguam deprimat & Chi-

& Chirurgi visum non impedit, imò regit subiectum machinæ clauum & retinacula, vt æger timidus nihil mali suspicari possit. Commodum omnino organon & his alijsque vsibus accommodum. Celsus' volsella vrebatur, cuius incommoda recenset *Aquapendens* in Oper. Chir. qui forficulam eligit. *Hildanus* Cen. 2. Obs. 21. onerosum instrumentum ad vuulam depinxit & descripsit, quo tardior fit operatio, ægro non ita iucunda, Chirurgo denique operanti molesta.

Modus applicandi hic est: Primò clauo sublato eleuatur quoque ferreus funiculus clauo alligatus, hinc funiculus sequax sursum pellitur, & ex extrema ligni rotundi rima protruditur, spatiumque relinquit pro excipienda vuula tumida. Hoc modo præparatum instrumentum aperto ore per Chirurgum linguæ superponitur, planà parte sursum vergente, aspera vero, ne machinas æger videat, deorsum spectante. In Fauces eo vsque protrudatur organon, donec vuula inter ferreum funiculum incuruum acutumque & ligneum circulum comprehendatur. Apprehensa vuula, digito tangendum est retinaculum secundum, vt in locum clauus redeat, retrahatque annexum funiculum ferreum. Dictum factum concidente clauo & retracto funiculo, acutus ille circulus rimam suam repetendo vuulam comprehensam rescindit.

Commodum instrumentum etiam alijs in corpore tumoribus, & verrucis extirpandis, quod incredibili celeritate, ægris nihil cogitantibus, timentibus nil, omnia absoluit breuissimè, nihil minus quàm rus olet.

Vt rudi penicillo adumbraretur, sculptorem ad vocaui. Prima figura instrumentum exhibet clauo adhuc laxato & in rima sua funiculo ferreo latente. Altera clauum eleuatum monstrat, funiculum sursum protrusum & ad excipiendam vuulam paratum. Singularum instrumenti particularum indicem signatæ litteræ edicunt.

aaaa Ferrea lamina.

bb Lignum rotundum.

cc Clauus machine.

ddddd Ferreus funiculus, circa laminam & lignum repens.

ee Ferreus funiculus circa clauum alligatus.

e Ferrei funiculi incurua pars, interius acuta.

f Spatium inter funiculum & lignum.

gggg Retinaculum clauo primum firmans.

hhhhh Retinaculum secundum retrahens.

ii Capulus organi ferreus.

kk Globulus extremus capulo appositus.

INDEX OBSERVATIONVM.

A.

A Ngina periculosa curatio.	fol. 213
Annus non satis perforatus.	281
Antracis pestilentis ab interioribus reuocatio.	42
Apoplexia fortis ex dentitione.	221
Atheroma in fronte excisum.	120
Atheroma in femore separatum.	295

C.

Caluaria lamina, exteriori integra, interiore fissa.	108
Caluaria fissura capillaris, quam natura ampliauit.	99
Cancer labiorum per per cipem male abscissus.	161. E.
Cancer mamilla exulceratus felicissime resectus.	255
Cancer mamilla occultus in puerpera male excisus.	261
Cancer mamma parvus & occultus pharmaca curatus.	262
Cancer coli & uteri incurabilis.	271
Caruncula in meatu urinario extirpatio.	150
Catarrha consummata depositio.	111
Concussio cerebri.	298
Contusio capitis puella topico curata.	105
Contusio capitis centesimo die mortem inferens.	191
Contusio capitis, cum vertigine & Apoplexia.	196
Contusio cerebri nona septimana lethalis.	193
Contusio capitis instante nouilunio totius conuulsiones inducens.	200
Contusio occipitis scalpri deversa.	228
Conuulsio oculi ex concussione cerebri.	205
Conuulsio cubiti.	309
Cubitus rigidus.	167
Cubiti os corruptum.	62
Crus ex ganglio in genu contractum.	164. C. & 165

D.

Dolor dentium periodicus.	214. & 220
Dolor digiti maioris post abscissionem pedis.	67
Dolor	

Index Observationum.

<i>Dolor cancri mitigatus.</i>	<u>163</u>
<i>Dolor Ischiaticus foniculo in sura curatus.</i>	<u>170</u>

318

E.

<i>Enterocoeles expertissima cura.</i>	<u>142</u>
<i>Empyema thoracis apertione curatum.</i>	<u>143</u>
<i>Empyematis materia diureticis expurgata.</i>	<u>143. & 152</u>
<i>Erosiones ventriculi curata.</i>	<u>183</u>
<i>Erysipelata partium extremarum.</i>	<u>275</u>
<i>Erysipelas utriusque pedis exulceratum.</i>	<u>276</u>
<i>Excrecentia carnis in palato.</i>	<u>213</u>
<i>Excrecentia carnis in naribus Gallica.</i>	<u>215</u>
<i>Excrecentia carniarum in digitis.</i>	<u>288</u>
<i>Excrecentia in femore magna.</i>	<u>304</u>
<i>Exulceratio pectoris foniculo pedis curata.</i>	<u>163</u>

F.

<i>Facies pulvere tormentario ambusta.</i>	<u>214</u>
<i>Fissura in cranio capillaris.</i>	<u>227</u>
<i>Fistula thoracis cum erosione clavicula.</i>	<u>228</u>
<i>Fistula thoracis subcutanea, acu pertusa.</i>	<u>242</u>
<i>Fistula thoracis excedentibus curata.</i>	<u>245</u>
<i>Fistula mamma dextra.</i>	<u>280</u>
<i>Fœtus mortuieductio.</i>	<u>282</u>
<i>Fractura fibula & tibia cum deperditione substantia.</i>	<u>88</u>
<i>Fractura & depressio cranij, lamina exteriore salva.</i>	<u>108. & 199</u>
<i>Fractura femoris cum vulnere.</i>	<u>190</u>
<i>Fractura cruris cum vulnere.</i>	<u>293</u>

G.

<i>Gonorrhœa virulenta.</i>	<u>282</u>
<i>Gumma Gallicum chirurgia curatum.</i>	<u>274</u>
<i>Gusta serena fetaceo depulsa.</i>	<u>224</u>
<i>Gusta serena incurabilis.</i>	<u>226</u>

H.

<i>Hæmorrhagia natium enormis.</i>	<u>104</u>
<i>Hæmorrhagia post emulsionem dentis.</i>	<u>104</u>
<i>Hæmorrhoidum nimius fluxus chirurgia suppressus.</i>	<u>158</u>
<i>Hæmorrhoidum dolor recidiuus exusu sol. sena & schammonij.</i>	<u>281</u>
<i>Hæmia carnosae cura.</i>	<u>279</u>
<i>Herpes miliaris & excedens.</i>	<u>276</u>

Inter

INDEX OBSERVATIONVM.

A.

A Ngina periculosa curatio.	fol. 213
Annus non satis perforatus.	281
Antracis pestilentis ab interioribus renuatio.	43
Apoplexia fortis ex dentitione.	221
Atheroma in fronte excisum.	120
Atheroma in femore separatum.	295

C.

Caluaria lamina, exterioris integra, interioris fissa.	108
Caluaria fissura capillaris, quam natura ampliavit.	99
Cancer labiorum per forcipem male abscissus.	161. A.
Cancer mamilla exulceratus felicissime resectus.	255
Cancer mamilla occultus in puerpera male excisus.	261
Cancer mamma parvus & occultus pharmaca curatus.	262
Cancer coli & uteri incurabilis.	271
Caruncula in meatu urinario extirpatio.	150
Cataracla consummata depositio.	111
Concussio cerebri.	298
Contusio capitis puella topico curata.	105
Contusio capitis centesimo die mortem inferens.	191
Contusio capitis, cum vertigine & Apoplexia.	196
Contusio cerebri nona septimana lethalis.	193
Contusio capitis instante nouilunio totius convulsiones indugens.	200
Contusio occipitis scalpris derafa.	228
Convulsio oculi ex concussione cerebri.	205
Convulsio cubiti.	309
Cubitus rigidus.	167
Cubiti os corruptum.	62
Crus ex ganglio in genu contractum.	164. C. & 165

D.

Dolor dentium periodicus.	214. & 220
Dolor digiti maioris post abscissionem pedis.	67
	Dolor

Index Observationum.

Dolor cancri mitigatus.
Dolor Ischiaticus fonticulo in sura curatus.

163

170

318

E.

Enterocelos expertissima cura.
Empyema thoracis apertione curatum.
Empyematis materia diureticis expurgata.
Erosiones ventriculi curata.
Erysipelata partium extremarum.
Erysipelas utriusque pedis exulceratum.
Excrescentia carnis in palato.
Excrescentia carnis in naribus Gallia.
Excrescentia carnum in digitis.
Excrescentia in femore magna.
Exulceratio peitoris fonticulo pedis curata.

142

143

143. & 152

183

275

276

213

225

288

304

163

F.

Facies pulvere tormentario ambusta.
Fissura in cranio capillaris.
Fistula thoracis cum erosione clavicula.
Fistula thoracis subcutanea, acu perforata.
Fistula thoracis excedentibus curata.
Fistula mamma dextra.
Fœtus mortuieductio.
Fractura fibula & tibia cum deperditione substantia.
Fractura & depressio cranij, lamina exteriore salva.
Fractura femoris cum vulnere.
Fractura cruris cum vulnere.

224

227

228

242

245

280

282

88

108. & 199

290

293

G.

Gonorrhœa virulenta.
Gumma Gallicum chirurgia curatum.
Gutta serena fetaceo depulsa.
Gutta serena incurabilis.

282

274

224

226

H.

Hæmorrhagia narium enormis.
Hæmorrhagia post euulsionem dentis.
Hæmorrhoidum nimius fluxus chirurgia suppressus.
Hæmorrhoidum dolor recidiuus exusu sol. sena & schammonij.
Hæxnia carnosa cura.
Herpes miliaris & excedens.

104

104

158

281

279

276

Inter

Index Observationum.

I.

<i>Interrigo ilium.</i>	263
<i>Introcessio cranij & punctura dura matris interimens.</i>	125
<i>Introcessio cranij mollioris in adulta minimè fissi.</i>	227
<i>Inflammationes Erysipelatosa & adematosa.</i>	312

L.

<i>Lapillus è meatu urinario citra scalpelli aut specilli operam exemptus.</i>	273
<i>Lepra Gracorum.</i>	309
<i>Lepra ex esu carniū leprosarum.</i>	313

M.

<i>Meliceris in humero & genu resoluta.</i>	274
<i>Manus ob spinam ventosam amputata.</i>	301

N.

<i>Nervi punctim vulnerati.</i>	273
---------------------------------	-----

O.

<i>Oxana Gallica cum corruptione ossis.</i>	129
<i>Oxana Gallica citra corruptionem ossis.</i>	129. & 215

P.

<i>Partus tres monstrosi.</i>	160
<i>Palpebra relaxata propter glutinum contractio.</i>	123
<i>Palati citra malignitatem corruptio.</i>	213
<i>Palatum virulentia Gallica erosum.</i>	126
<i>Penis extirpatio.</i>	271
<i>Perniones exulcerati.</i>	289
<i>Punctura cranij vitramque laminam penetrans.</i>	202

S.

<i>Scapula corruptio.</i>	272
<i>Scrofula collum occupantes.</i>	222
<i>Spina ventosa.</i>	292. & 301
<i>Steatomata utriusque manus.</i>	289
<i>Sterilitas ex male reposita hernia.</i>	275
<i>Sinus in femore forcipe deceptorie male incisus.</i>	167. E.
<i>Sinus palati callosus.</i>	214

T

<i>Tibia corrupta.</i>	172. R. 283. & 284
<i>Tumor in collo pendulus setaceo auricula inusto diminutus.</i>	117
<i>Tumor cum folliculo excisus in maxilla superiore.</i>	209. & 215
<i>Tumor</i>	

Index Observationum.

319

Tumores cedemasosi.

178

Tinea capitis.

322

V.

Varicum sectio infelix.

172 Os

Vertigo ex abscessu cerebri.

195

Vinculum lingua unguibus & phlebotomo periculosè disruptum.

221

Vmbilici prominentia monstrosa.

118

Vomitus sanguineus lethalis.

278

Wula corrupta amputatio.

27

Vulnus capitis cum depressione & rima cranij.

176

Vulnus capitis cum inflammatione petitrani & fissura calvaria.

180

Vulnus capitis os frontis diuidens.

183

Vulnus capitis cum fissura cranij maxima.

187. & 284

Vulnus capitis cum incisione facis lethale.

197

Vulnus capitis 29. septimana per trepani operam curatum.

198

Vulnus capitis ex potu vini lethale.

199

Vulnus capitis cum dedolatione cranij.

201

Vulnus capitis cum duobus sanguis lethale.

202

Vulnus carpi cum lisione arteria.

296

Vulnus oculi ex infixo fuso aculeo.

205

Vulnus & fractura nasi.

207

Vulnus sclopeti in maxilla inferiore.

218

Vulnus sclopeti cum fractura pedis.

219

Vulnus sclopeti in inguine & pene.

258

Vulnus sclopeti in dorso.

264

Vulnus sclopeti in humero cum gangrana.

275

Vulnus sepi transversum & ventriculi.

244

Vulnus thoracis cum fractura costae.

230

Vulnus thoracis periculosum.

233

Vulnus thoracis paracentesi non requirens.

238

Vulnera thoracis scalpello dilatata.

246

Vulnus thoracis lethale.

269

X

IN.

INDEX RERVM.

A.

- A**gilopis cura. Tab. 33. Fig. 3. & 5.
 An inspectio Tab. 41. Fig. 6.
 Anus recens natus oclusus perforatur. Tab. 41. Fig. 6.
 Aneyloblepharic cura. Tab. 33. Fig. 2.
 Apparatus ad vultum capitis dilatanda. Tab. 30. & 31.
 Apparatus ad cranium trepano perforandum. Tab. 31. Fig. 1.
 Apparatus ad parandum fonticulum in sinu caronali. Tab. 30.
 Fig. 1. & 7.
 Aqua calcis nobilissima. fol. 278.
 Aqua herdei Magistralis. fol. 234.
 Aqua socialis. fol. 114.
 Arder urina mitigatur. Tab. 40. Fig. 4.
 Arteria aspera perforatur. Tab. 34. Fig. 3. 4. 5.
 Articuli elongatio. fol. 76.
 Ascia in circulum adducenda. Tab. 28. Fig. 10. in crura.
 Ascia in circulum adducta. Tab. 27. Fig. 10.
 Ascia in cruce adducenda. Tab. 27. Fig. 1.
 Ascia in cruce adducta. Tab. 28. Fig. 10. in femora.
 Astraguli luxati restitutio. Tab. 25. Fig. 1.
 Atheromata in fronte exciso. Tab. 35. Fig. 2. & 4.

C.

- Calculus in vesica exploratur. Tab. 40. Fig. 1. & 2.
 Calculus à mentu urinario eximitur. Tab. 40. Fig. 3.
 Calli circa partes fractas generatio. fol. 82.
 Caruncula mentus urinarij extirpatur. Tab. 40. Fig. 5.
 Cataplasma Escharoticum. fol. 43.
 Cataplasma contra ophthalmias expertissimum. fol. 209.
 Cataplasma ad gangranam mirabile. fol. 276.
 Ceratum con Rivetium. fol. 144.
 Ceratum diosynapios. fol. 165.
 Ceratum citrinum. fol. 166.
 Ceratum ad gummata Gallica. fol. 274.
 Ceratum dinum. fol. 190.
 Ceratum Hippocrasacum. fol. 70.
 Ceratum oxelaum. fol. 256.

Chia

- Chloridis auct. diminutio.* Tab. 41. Fig. 1.
Cauterem ipse patiens applicat. Tab. 42. Fig. 8.
Contusum capitis varia species. fol. 105. 106. 107. & 108.
*Contusio capitis sine laceratione cutis, introessione cranij & suspi-
 cione alicuius fissura.* fol. 105.
*Contusio capitis cum depreffione, sed sine rima cranij, sub integra cu-
 te in adultis.* fol. 107.
*Contusio capitis in adultis cum depreffione cranij & fractura lami-
 na interna, citra vulnus cutis & rimam lamina externam.* fol.
 108.
Contra fissura cranij. fol. 110.
Cranij per modiolos perforatio. Tab. 31. Fig. 5.
Cranij depreffi eleuatio. Tab. 32. Fig. 2. & 7.
Cranij fissi vel trofi derasio. Tab. 30. Fig. 10.
Cruis fracti compositio. fol. 37.
Cruis fracti deligatio. Tab. 29.
Cubiti luxati restitutio. Tab. 23. Fig. 2. & Tab. 24. Fig. 1.

D.

- Decoctum diuinum.* fol.
Decoctum Magistr. fol. 162.
Dedolatio cranij. fol. 110.
Deligatio partis mutilata. Tab. 28. Fig. 1. 2. & 3.
Dentium extractio. fol. 11.
Dentis carioli adustio. Tab. 36. Fig. 1.
Dentis buccam offendentis excisio. Tab. 36. Fig. 2.
Dentis constrictorum diductio. Tab. 36. Fig. 6.
Depressio cranij simplex sub integra cute in pueris. fol. 106.

E.

- Emplastrum ad hemorrhagiam narium.* fol. 104.
Extensiones infracturis & luxationibus requisita. fol. 68. & 77.
Emplastrum ad hernias carnosas. fol. 279.
Electuarium dentifricium. fol. 278.
Electuarium ad scrofulas. fol. 90. & 222.
Electuarium ad Hernias intestinales & umbilicales probatissimum
fol.

F.

- Fascia fonticuli in capite.* Tab. 30. Fig. 6. in brachio. fol. 116. H. in se-

Index Rerum

more & fura sol. 70. L.

- Faucibus iurare. n. m. exemplo. Tab. 36. Fig. 9.
 Femoris luxati restitutio. Tab. 23. Fig. 4.
 Femoris fractu compositio. Tab. 26. Fig. 1.
 Ferularum qualitate. fol. 79.
 Fecula quando usurpanda. fol. 81.
 Figura media totius brachij & pedis. Tab. 26. Fig. 2. & 3.
 Fistula thoracis subter costas reptans in fundo perforatio. Tab. 38. Fig. 5.
 Fistula tho. acis externa inciditur. Tab. 39. Fig. 2.
 Fistulæ cum ani cura penetrantium. fol. 155.
 Fistularum ani non penetrantium curatio. fol. 156.
 Fœtus mortui extractio. Tab. 41. Fig. 5.
 Fonticuli in capite locus. Tab. 32. Fig. 2.
 Fonticuli in brachio locus. Tab. 43. E.
 Fonticuli in femore locus. Tab. 43. I.
 Fonticulus in fura. Tab. 43. K.
 Fracturarum generalis curatio. fol. 76.
 Fractura simplex, transversa & obliqua. ibidem.
 Fractura confirmatio. fol. 78.
 Fractura reposita conservatio per deligationem. ibidem.
 Fracti membri depositio. fol. 81.
 Fracta partis religatio. ibidem.
 Fractura simplex. s. s. s. fol. 84.
 Fractura cum vulnere simplici. fol. 85.
 Fractura cum vulnere ossi minime nudata, ossis tamen sensulum expectatur. fol. 86.
 Fractura eadem, in qua magna ossis portio abscessura est. fol. 86.
 Fractus ac cum vulnere & osse simplici nudato. fol. 88.
 Fractura cum vulnere & osse prominente. fol. 88.

G.

- Gargarismus ad anginam. fol. 123.
 Genu luxati restitutio. fol. 9.
 Globulorum à vulneribus extractio. Tab. 43. N.
 Gummatum Gallica curandi modus. fol. 174.

H.

- Hernia intestinalis chirurgia Nursinorum. Tab. 40. à Fig. 8. usque ad 14.

Her-

Index Rerum

3

- Hernia intestinalis cura mitior. Tab. 39. Fig. 6. 7. & 8.
 Hernia umbilicalis chirurgia Celſi. Tab. 38. Fig. 7.
 Hernia umbilicalis cura mitior Fabrij. Tab. 38. Fig. 8. & Tab. 39. Fig. 1.
 Hamorrhoides tumentes manuali opera curantur. fol. 157.
 Hamorrhoidum nimium fluentium curatio. fol. 158.
 Hamorrhoides exulcerata ſervamenti ſanantur. fol. 160.
 Hymen integrum inciditur. Tab. 40. Fig. 15. & 16.
 Humeri prolapſi reſtitutio. Tab. 21. Fig. 7. & Tab. 23. Fig. 3.
 Humeri fracti compoſitio. Tab. 23. Fig. 1.

I.

- Iuguli laxati reſtitutio. Tab. 24. Fig. 3.
 Inteftini recti reſpoſitio. Tab. 41. Fig. 7.
 Iniectiones aurium periculofa. Tab. 36. Fig. 5.
 Infundibuli applicatio. Tab. 36. Fig. 3.
 Introceſſio cranij cum rima in medio depreſſionis lata. fol. 109.
 Introceſſio cranij cum rima in medio anguſta. ibid.
 Introceſſio cranij cum rima ad latus lata & anguſta. ibid.
 Interſtitium duorum foraminum ſerrula verſatili incurvatur.
 Tab. 32. Fig. 1.

L.

- Linimentum ad carunculas in meatu urinario egrogium. fol. 150.
 Linimentum ad ambuſta. fol. 224.
 Linimentum ſimplex. fol. 256.
 Linimentum ad perſiones exulceratos. fol. 289.
 Luxationum cura generalis. fol. 68.
 Luxatio ſimplex. ibid.
 Luxatorum extenſio. ibid.
 Luxatorum Reſpoſitio. fol. 69.
 Luxatorum deligatio. 70.
 Luxatorum depoſitio. 71.
 Luxatorum religatio. ibid.
 Luxatio cum inflammatione. fol. 72.
 Luxatio cum vulnere & offe detracto. 73.
 Luxatio cum conuulſione. 74.
 Luxatio cum callo. ibid.
 Luxatio recidivans. 76.

Index Rerum .

M.

Manus luxata restitutio Tab. 24. Fig. 2.

Mamma carcinomate affecta absconditur. [Tab. 38. Fig. 1.](#)

Matriæ inspectio. Tab. 41. Fig. 4.

Hic beneuolum lectorem etiam atque etiam rogo , vt errorem , qui ex descriptione huius figuræ elucescet , amica mente corrigere velit.

Maxilla inferioris depressio. Tab. 36. Fig. 7.

N.

Narium in ōzana & post excisionem polypi, adustio. [Tab. 37. Fig. 1.](#)

O.

Occipitis inuulsio. Tab. 34. Fig. 7.

Oculus formatur. Tab. 33. Fig. 6.

Olenum Logadorum. fol. 222.

Oris leporini correctio. Tab. 35. Fig. 8.

Ora seraminis trepano facti lanigantur. [Tab. 31. Fig. 7.](#)

Osicula cerebri membranas pungentia forcipibus abtrumpuntur.
Tab. 32. Fig. 3. 4. 5. & 8.

P.

Palpebra superioris relaxata curatio. Tab. 35. Fig. 3.

Palpebra superioris contracta cura. Tab. 35. Fig. 4.

Paracentesis abdominis. Tab. 39. Fig. 2. & 3.

Paracentesis thoracis. Tab. 37. Fig. 2. 3 & 4.

Papilla lactantium occulta prouocantur. [Tab. 37. Fig. 6.](#)

Penis oclusus perforatur. [Tab. 40. Fig. 6.](#)

Pilula Herlicij ad dolorem dentium. fol. 220.

Pilula, qua menses promouent. fol.

Pili oculos irritantes euelluntur. [Tab. 35. Fig. 2.](#)

Polypi excisio. Tab. 33. Fig. 7.

Pterygij cura. Tab. 35. Fig. 6.

Pulsis ad interriginem expertus. fol. 263.

Pulsis ad excrescentias carnis optimus. fol. 288.

Pulsis dentifricius. ibid.

Punctura cranij. fol. 110. abraditur. Tab. 33. Fig. 1.

Pulsis in Hernijs puerorum gratus. fol. 145.

R.

- Resectio manus extrema.* Tab. 27. Fig. 11. & 12.
Resectio pedis extremi. Tab. 27. Fig. 15.
Resectio pollicis. Tab. 28. Fig. 12.
Repositio membri vel luxati vel fracti in canalem. Tabula 34. Fig. 2. & 3.

S.

- Setaceum auricula lobo inuritur.* Tab. 34. Fig. 6.
Setaceum nucha inuritur. Tab. 34. Fig. 8. 9. 10.
Sparadrappum ad conservandos fonticulos. fol. 171.
Spiritus Mastichinus. fol. 216.
Spina ad exteriora prolapsa restitutio. Tab. 25. Fig. 2.
Spleniorum qualitates. fol. 78.
Sutura coronalis & sagittalis concursus quomodo inveniatur. Tab. 30. Fig. 2.
Suffusio perfecta. Tab. 33. Fig. 3. acm deponitur. Tab. 33. Fig. 4.
Staphylomatis cura. Tab. 35. Fig. 5.
Symptomatum fracturis supervenientium correctio. fol. 83.
Symptomatum Hernia intestinali supervenientium correctio. fol. 142.

T.

- Tibia deraiso.* fol. 172. R. ubi notandum quod vulneris labia linteolis cooperiri debeant, velut in deraisione & perforatione cranij.
 Tab. 31. Fig. 5.
Trochisci pectorales cum Ambr & Mosch. fol. 237.
Tumor tunicatus adamantis ruptus. Tab. 33. Fig. 7.
Tumorum tunicatorum & excrescentiarum magnarum generalis curatio. fol. 121.

V.

- Vasorum temporalium exploratio.* Tab. 33. Fig. 2.
Verruca penis venerea. Tab. 40. Fig. 7.
Vlcera intestini recti cannulis excisuntur. Tab. 41. Fig. 2.
Urina suppressa educitur. Tab. 39. Fig. 9.
Unguentum de Tussa. fol. 163.
Unguentum Eua. fol. 166.

Index Rerum

- Vnguentum de Bethonica* fol. 189.
Vnguentum calli generationem prohibens. fol. 246.
Vnguentum callos fissurarum exedens. ibid.
Vnguentum ad nervos pudicium vulneratos. fol. 274.
Vnguentum citrinum. fol. 276.
Vulnervm abdominis species. fol. 136.
Vulnera abdominis dilatantur. Tab. 37. Fig. 5.
Vulnera abdominis consuuntur. Tab. 39. Fig. 5.
Vulnera intestinorum consuuntur. Tab. 37. Fig. 6.
Vulnera capitis dilatantur vel in triangulum. Tab. 31. Fig. 2. vel in
 crucem. Tab. 30. Fig. 9.
Vetus prolapsus repantur. Tab. 40. Fig. 18.
Vetri insectiones sunt Metrenchyta. Tab. 42. Fig. 2.
Vulnervm capitis omnes species. fol. 95. &c.
Vulnus capitis simplicissimum. ibid.
Vulnus capitis cum offensione solius pericranij. fol. 96.
Vulnus capitis cum alteratione cranij. ibid.
Vulnus capitis cum rima capillari non penetrante. fol. 98.
Vulnus capitis cum rima capillari penetrante. fol. 99.
Vulnus capitis cum rima penetrante & eidente cranij, sed angusta.
 fol. 100.
Vulnus capitis cum fissura cranij penetrante & satis hianse. fol. 101.
Vulnus capitis cum lisione dura maris. fol. 103.
Vulnus capitis cum lasso e pia matris & cerebri. ibid.
Vulnus musculi temporalis cum lasso e pericranij & vasorum. ibid.
Vulnus musculi temporalis superficialis. fol. 104.
Vulnus musculi temporalis cum cranij rima angusta. fol. 105.
Vulnus musculi temporalis cum rima cranij satis patente. ibid.
Vulnervm Thoracis species. fol. 135.
Vulnus Thoracis dilatatur. Tab. 37. Fig. 5. E.
Vulneris in femore per fibulas adductio. Tab. 43. P.
Vulnus gena Emplasticeis unitum. Tab. 35. Fig. 8.
Vulva clausa aperitur. Tab. 40. Fig. 17.
Vulva corrupta absconditur. Tab. 34. Fig. 1. 2.

F I N I S.





PANDIMIGLIO

APR. 1971

LEGATORIA - FOMA

